

Redazione | Pubblicità | Contatti

quotidianosanità.it

Cronache

Quotidiano on line
di informazione sanitaria
Venerdì 20 OTTOBRE 2023

QS

Home | Cronache | Governo e Parlamento | Regioni e Asl | Lavoro e Professioni | Scienza e Farmaci | Studi e Analisi | Archivio

COMUNICA AL TUO TARGET



CON 34 MEDICAL MAGAZINE DI PATOLOGIA

SICS


POPULAR SCIENCE

segui **quotidianosanità.it**

Tweet | Condividi | Condividi 0 | stampa

Osteoporosi. Le fratture da fragilità colpiscono in Italia 1 donna su 3 e 1 uomo su 5 tra gli over 50

Il dato rilanciato dalla Siot (Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia) in occasione della Giornata mondiale per l'osteoporosi che si celebra oggi. "Fondamentale la diagnosi precoce con visite specialistiche per donne over 50 e uomini over 65".



20 OTT - Nel nostro Paese le fratture da fragilità colpiscono 1 donna su tre e 1 uomo su cinque tra gli over 50enni e, sebbene siano più frequenti tra le persone anziane, si stima che il 20% delle fratture avvenga in età di prepensionamento, come attestano le recenti [Linee Guida "Diagnosi, stratificazione del rischio e continuità assistenziale delle Fratture da Fragilità"](#) dell'Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con Sito (Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia) e altre Società scientifiche. A rilanciare i dati è proprio la Siot, in occasione della Giornata Mondiale dell'Osteoporosi che si celebra oggi e nell'ambito della quale la Siot ribadisce l'importanza della diagnosi precoce per il trattamento dell'osteoporosi e raccomanda visite specialistiche alle donne over 50 e agli uomini dai 65 anni in su per valutare lo stato della propria salute ossea e prevenire la comparsa di fratture.

"Come emerge nelle Linee Guida - spiega la Società di Ortopedia e traumatologia) è stato stimato che le fratture da fragilità siano responsabili di più di 9 milioni di fratture ogni anno in tutto il mondo (Curtis, 2017a; Elvey, 2014). Nel 2017, sempre secondo i dati, sono state stimate a livello mondiale 2,7 milioni di nuove fratture da fragilità, equivalenti a 7.332 fratture al giorno, 305 all'ora (Borgström, 2020). Nelle donne si è verificato quasi il doppio delle fratture (66%) e, in generale, le fratture del femore prossimale (collo del femore), delle vertebre e del polso/omero prossimale (spalla) hanno rappresentato rispettivamente il 19,6%,

15,5% e 17,9% di tutte le fratture".
"L'identificazione della fragilità scheletrica - dichiara **Alberto Momoli**, presidente Siot e Direttore UOC Ortopedia e Traumatologia Ospedale San Bortolo, Vicenza - è fondamentale per identificare il rischio di frattura del soggetto e applicare interventi terapeutici mirati e prevenire il peggioramento del quadro clinico. Per una valutazione del rischio di fragilità è fondamentale un'accurata anamnesi del paziente utile a identificare ulteriori fattori compromettenti la salute delle ossa: terapie farmacologiche o ulteriori patologie, possono compromettere la resistenza scheletrica peggiorando la fragilità dell'osso con inevitabile aumento del rischio di frattura".

Se la protezione della salute delle ossa inizia sin dall'infanzia con una corretta alimentazione, ricca di calcio e vitamina D e uno stile di vita attivo che comprenda un'adeguata attività fisica, le stesse indicazioni, sottolinea la Siot, valgono anche da adulti: mantenere una buona densità ossea e prevenire il rischio di fratture soprattutto nell'età considerata più a rischio, in menopausa e post menopausa per le donne e senile per gli uomini. In tarda età un giusto movimento, uno sport aerobico leggero e un allenamento propriocettivo, insieme ad una corretta alimentazione possono intervenire a beneficio della perdita di forza muscolare, ridotta coordinazione dei movimenti e inevitabile rischio di caduta. In Italia, secondo le Linee Guida si stima che la prevalenza dei soggetti con osteoporosi ultra 50enni corrisponda al 23,1% nelle donne - il cui numero è aumentato del 14,3% dal 2010 al 2020 (Piscitelli, 2014) - e al 7,0% negli uomini (International Osteoporosis Foundation, 2018b).

"Una corretta valutazione della fragilità ossea attraverso specifici esami del sangue e la mineralometria ossea computerizzata, MOC - prosegue Alberto Momoli - permette quindi di identificare precocemente i

RIPRENDI ARIA
L'Aria che respiri è Pulita?
SCOPRILO COMPILANDO IL QUESTIONARIO: BASTANO POCHI MINUTI!
VAI AL QUESTIONARIO →

QSnewsletter

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di Quotidiano Sanità.

OBBLIGO ECM

"Non ci saranno altre proroghe, invitiamo i professionisti a fare Corsi di Formazione per evitare le sanzioni previste dalla Legge"
QS, 12 ottobre 2023

ECM SMART clicca qui
dove e quando vuoi

MED-CAST
IL POD-CAST IN MEDICINA

QS gli speciali

Manovra. Nel 2024 il Fondo sanitario toccherà quota 134,1 miliardi. Dalle liste d'attesa al personale fino ai farmaci e al tetto di spesa per i privati. Ecco le misure previste per la sanità

tutti gli speciali

iPiùLetti [7 giorni] [30 giorni]

- 1 Assistenza sanitaria ai cittadini extra comunitari. Ecco cosa cambia con la manovra
- 2 La manovra stanza più soldi per Medici e Infermieri. Era ora

sogetti ad alto rischio di sviluppare esiti negativi, consentendo l'implementazione tempestiva di contromisure preventive/terapeutiche. Inoltre, ci sono diverse condizioni, come quelle infiammatorie o il trattamento con farmaci glucocorticoidi, che risultano essere molto importanti nella valutazione della fragilità ossea, in quanto riducono la forza ossea e aumentano il rischio di frattura. Riguardo il trattamento, esistono diverse opzioni terapeutiche efficaci che possono variare a seconda della gravità del caso, dei fattori di rischio e della presenza di altre patologie. È importante rivolgersi sempre a uno specialista, che saprà indicare il trattamento più adatto per ogni singolo individuo".

I fattori di rischio dell'osteoporosi però non sono solo l'età e il sesso, anche una precedente frattura da fragilità è, per entrambi i sessi, un importante campanello d'allarme per ulteriori fratture. Gli individui che hanno già subito una frattura da fragilità sono maggiormente a rischio di ulteriori fratture sia nello stesso sito che in un altro sito osseo; inoltre, il rischio aumenta al crescere del numero e della severità delle precedenti fratture. In generale, le donne dai 50 agli 80 anni, a seguito di una prima frattura da fragilità, hanno un maggior rischio di sviluppare una seconda frattura cinque volte maggiore entro l'anno rispetto a coloro che non hanno avuto una precedente frattura (van Geel, 2009) o nei due anni successivi (International Osteoporosis Foundation, 2018a). Nonostante ciò, il 60-85% delle donne over 50 con osteoporosi non riceve un trattamento.

“La prevenzione delle rifratture da fragilità – evidenza Umberto Tarantino, coordinatore della Commissione Siot per la Fragilità Ossea e Professore Ordinario di Malattie Apparato Locomotore; U.O.C. Ortopedia e Traumatologia, Policlinico Tor Vergata - inizia con l'identificazione dei pazienti a cui è stata diagnosticata una prima frattura. Infatti, conoscere l'anamnesi del paziente, la diagnosi appropriata e la procedura terapeutica risulta essenziale per il trattamento della fragilità ossea e, di conseguenza, per ridurre il rischio di ulteriori fratture. Spesso, tuttavia, i pazienti non ricevono né un corretto inquadramento diagnostico, né un adeguato trattamento farmacologico tanto che una consistente porzione di individui dopo un anno dalla diagnosi di frattura da fragilità presenta un'aderenza alla terapia non superiore al 50%. Per questo è importante che gli stessi pazienti conoscano l'effettivo rischio di rifrattura in modo da migliorare l'aderenza al trattamento”.

20 ottobre 2023

© Riproduzione riservata

Altri articoli in Cronache



Autismo. Angsa: “Sos Sportelli Scuole, mancano leggi e soldi”



Guerra Israele-Palestina. Ostetriche: “Donne, neonati e bambini i più vulnerabili. Siano rispettati i diritti umani”



Guerra Israele-Palestina. Oms: “Danni a 19 strutture sanitarie e 20 ambulanze”



Salute mentale. People In Mind: con l'arte la sofferenza si trasforma in bellezza



Diete e detox. Croce rossa italiana scende in campo contro fake news e disinformazione



Vino. I carabinieri del Nas sequestrano 300 mila litri di prodotti irregolari

- 3 Salute Mentale. La presa in carico può essere garantita solo da centralità del servizio pubblico
- 4 Insiediata la nuova Commissione ECM: in agenda gestione del triennio in scadenza (sanzioni e crediti compensativi) e futuro della formazione
- 5 Obbligo Ecm. “Non ci saranno altre proroghe, invitiamo i professionisti a fare corsi di formazione per evitare le sanzioni previste dalla legge”.
Intervista al Ministro Schillaci
- 6 I medici non scappano dal Ssn solo per i soldi
- 7 Tutto quello che il governo non dice sui conti della sanità pubblica
- 8 Monitoraggio Covid. Nuovi casi in calo (-6%) ma salgono ricoveri anche se l'impatto è ancora basso. Vaia: “Parametri confortanti”
- 9 Medicina territoriale. Una rivoluzione di restaurazione
- 10 Manovra. Schillaci: “Per il personale uno stanziamento straordinario. I medici a spanne guadagneranno mille euro in più al mese”

Quotidianosanità.it

Quotidiano online
d'informazione sanitaria.
QS Edizioni srl
P.I. 12298601001

Sede legale:
Via Giacomo Peroni, 400

Direttore responsabile

Luciano Fassari

Direttore editoriale

Francesco Maria Avitto

Presidente

Ernesto Rodriguez

Tel. (+39) 06.89.27.28.41

info@qsedizioni.it

redazione@qsedizioni.it

Coordinamento Pubblicità

commerciale@qsedizioni.it

Joint Venture

- SICS srl
- Edizioni Health Communication srl

Copyright 2013 © QS Edizioni srl.

Tutti i diritti sono riservati

- P.I. 12298601001

- iscrizione al ROC n. 23387

- iscrizione Tribunale di Roma n.

115/3013 del 22/05/2013

Riproduzione riservata.

Chi sceglie di proseguire nella navigazione su questo sito oppure di chiudere questo banner, esprime il consenso all'uso dei cookie.

[Privacy Policy](#)

Prosegui