

CRITERI PER LA DONAZIONE DEL SANGUE

MALATTIE 	Tubercolosi Febbre reumatica	2 anni dopo la completa guarigione
	Malattie autoimmuni	In caso di malattie autoimmuni mono-organo e previa valutazione dei farmaci somministrati
	Toxoplasmosi Mononucleosi infettiva	6 mesi dopo la guarigione
	Affezioni di tipo influenzale	2 settimane dopo il termine dei sintomi
VIAGGI E MALATTIE TROPICALI 	Malattia di Chagas	Per donare è necessario uno specifico test per donatori: - nati o trasfusi nei Paesi dove la malattia è endemica; - con madre nata nei Paesi dove la malattia è endemica; - che hanno soggiornato in tali Paesi.
	Malattie tropicali	6 mesi dal rientro dalle aree tropicali
	Soggiorno per più di 6 mesi cumulativi nel Regno Unito nel periodo 1980-1996	Esclusione permanente
	Soggiorno in zone malariche*	I donatori che hanno vissuto per 6 mesi continuativi in zone malariche devono attendere 6 mesi dopo l'ultimo soggiorno ed effettuare uno specifico test immunologico. I donatori che hanno visitato zone malariche e non hanno sofferto di sintomatologia compatibile con la diagnosi di malaria devono attendere: - 6 mesi dopo l'ultima visita e se risultati negativi a specifico test, o - 12 mesi dopo l'ultima visita (se non sottoposti a specifico test).
	Soggetti che hanno sofferto di malaria o di episodi febbrili non diagnosticati compatibili con la diagnosi di malaria*	Devono attendere 6 mesi dalla cessazione dei sintomi e dalla sospensione della terapia e risultare negativi a specifico test.
*I criteri per la MALARIA NON SI APPLICANO in caso di donazioni di plasma destinato alla produzione di medicinali		
CURE MEDICHE 	Esami endoscopici Trasfusioni di emocomponenti Trapianto di tessuti o cellule	4 mesi
	Agopuntura (se non eseguita con ago usa e getta)	4 mesi
	Cure odontoiatriche	
	Minore entità	48 ore
	Estrazione, devitalizzazione, ecc.	1 settimana
	Innesto di tessuto osseo	4 mesi
	Intervento chirurgico minore	1 settimana
Intervento chirurgico maggiore (cavità toracica, addominale o app. scheletrico)	4 mesi	
Vaccini	A seconda della tipologia da un minimo di 48 ore ad un massimo di 4 settimane	
ALTRO	Tatuaggi Piercing	4 mesi
	Gravidanza	6 mesi dopo il parto o dopo l'interruzione della gravidanza

Criteria di esclusione **PERMANENTE**

- epatite B
- epatite C
- sieropositività per HIV
- sifilide

- malattie autoimmuni (Nel caso coinvolgano più distretti)

- malattie cardiovascolari (Terapia con Beta Bloccanti)
- malattie organiche del sistema nervoso centrale (Sono esclusi tutti i soggetti)
- Diatesi emorragiche, coagulopatie (Sono esclusi i soggetti con tendenza anomala all'emorragia, o con diagnosi di coagulopatia su base congenita o acquisita)
- neoplasie o malattie maligne (Storia di neoplasie maligne, ematologiche, neoplasie associate a condizioni viremiche. **Possano essere accettati** soggetti con storia di carcinoma basocellulare o carcinoma in situ della cervice uterina dopo la rimozione della neoplasia. **NOTA BENE: E' FONDAMENTALE PORTARE IN VISIONE IL REFERTO ISTOLOGICO.**)
- crisi di svenimenti o convulsioni (Convulsioni, Diagnosi di Epilessia in trattamento anticonvulsivante, o con storia clinica di crisi lipotimiche e convulsive. **Possano essere accettati** soggetti con pregresse convulsioni febbrili infantili o forme di epilessia per le quali sono trascorsi 3 anni dalla cessazione della terapia anticonvulsivante senza ricadute.)
- affezioni gastrointestinali, epatiche, urogenitali, ematologiche, immunologiche, renali, metaboliche o respiratorie (Sono esclusi i soggetti con malattia attiva, cronica recidivante, o che abbiamo permanenti danni d'organo causati dalle affezioni indicate. **Possano essere accettati** i portatori eterozigoti di tratto beta o alfa talassemico, **secondo i seguenti criteri:** Hb pre donazione > **13 gr/dl** per gli uomini e >**12 gr/dl** per le donne.)
- alcolismo cronico
- assunzione di sostanze farmacologiche non prescritte (steroidi od ormoni a scopo di culturismo)
- comportamento sessuale (Sono esclusi i soggetti il cui comportamento sessuale abituale e reiterato li esponga ad elevato rischio di contrarre gravi malattie infettive trasmissibili con il sangue)