

## MODULO PREPARAZIONE BIOPSIA PROSTATICA

*Alla cortese attenzione del Paziente e del Medico di Medicina Generale*

Gentilissimo Signore,  
per l'esecuzione della procedura di biopsia prostatica transperineale, si richiede l'esecuzione di alcuni esami che riportiamo in elenco.

1. Salvo allergie, assumere antibiotico **Fosfomicina 3 gr.** (Monuril, Urofos, al) la sera prima e 12 ore dopo la biopsia.
2. **NON** è necessario il digiuno, anzi si raccomanda di fare colazione
3. **NON** necessaria la sospensione dell'abituale terapia domiciliare, fatta eccezione dei punti 4 e 5
4. sospensione della terapia antiaggregante (cardioaspirina, cardirene, ecc...) 7 giorni prima della biopsia e solo se assunta a scopo profilattico; se assunta a scopo terapeutico (es. stent coronarici) **NON** necessaria la sospensione.
5. sostituzione della terapia anticoagulante orale (Coumadin) con EBPM (es. Clexane) secondo schema del centro della coagulazione di riferimento - idem per la ripresa della stessa
6. **Recare in visione al momento della biopsia:** ECG (già refertato), esami ematici (emocromo, PT, PTT, HbsAg (antigene australia quantitativo), HCV anticorpi e urinocoltura)
7. Se il paziente è cardiopatico/vasculopatico dovrà allegare inoltre recente visita specialistica che ne attesti la stabilità clinica
8. Si raccomanda di venire **accompagnati**
9. Portare eventuale dischetto e referto della **RM prostatica multiparametrica**

Cordiali saluti.