

MODULO PREPARAZIONE CISTOSCOPIA

Alla cortese attenzione del Paziente e del Medico di Medicina Generale

Gentilissimo Signore,
per l'esecuzione della procedura di CISTOSCOPIA, si richiede l'esecuzione di alcuni esami che riportiamo in elenco.

1. Salvo allergie, assumere antibiotico **Fosfomicina 3 gr.** (Monuril, Urofos, al) la sera prima e 12 ore dopo la procedura.
2. **NON** è necessario il digiuno
3. **NON** necessaria la sospensione dell'abituale terapia domiciliare, fatta eccezione dei punti 4 e 5
4. sospensione della terapia antiaggregante (cardioaspirina, cardirene, ecc...) 7 giorni prima della cistoscopia e solo se assunta a scopo profilattico; se assunta a scopo terapeutico (es. stent coronarici) **NON** necessaria la sospensione.
5. sostituzione della terapia anticoagulante orale (Coumadin) con EBPM (es. Clexane) secondo schema del centro della coagulazione di riferimento - idem per la ripresa della stessa.
6. **Recare in visione al momento della cistoscopia:** esami ematici (emocromo, PT, PTT, HbsAg (antigene australia quantitativo), HCV anticorpi e urinocoltura con ABG)
7. Si raccomanda di venire **accompagnati**
8. Portare la documentazione sanitaria per cui viene indicata la cistoscopia.

Cordiali saluti.