

unv floran

ALL. 5

PROVA SCRITTA n. 1

Quesito n. 1:

TECNICHE DI STUDIO IMMUNOFENOTIPICO
NEL TRAPIANTO DI RENE

Quesito n. 2:

LIQUIDI DI PERFUSIONE PER LA
PRESERVAZIONE DEGLI ORGANI A SCOPO
TRAPIANTO

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

PROVA SCRITTA n. 2

Quesito n. 1:

OSLO E FONG CRITERIA PER TRAPIANTO DI FEGATO

Quesito n. 2:

TECNICA CHIRURGICA PER EFFETTUARE TRAPIANTO DI FEGATO IN ASSENZA DI ISCHEMIA FREDDA

Alc. 3

Alc. 3

Alc. 3

Alc. 3

Alc. 3

PROVA SCRITTA n. 3

Quesito n. 1:

PROTOCOLLI PER TRAPIANTO DI FEGATO NEL
TUMORE DI KLATSKIN

Quesito n. 2:

INDICAZIONE A TRAPIANTO DI FEGATO DOPO
INTERVENTO DI FONTAN

f. 2000

10/10

for

10/10

10/10

Alcun GSA
ACC. 8

PROVA PRATICA n. 1

Quesito n. 1:

Opzioni terapeutiche per paziente iperimmune candidato a trapianto di rene

Quesito n. 2:

Uomo di 49 anni (peso corporeo 70 kg; altezza 1,71 m.; BMI 24 kg/m²) con un punteggio MELD di 26 è stato sottoposto a trapianto di fegato per cirrosi alcolica.

Il donatore era un maschio (peso corporeo 120 kg.; altezza 1,78 m.; BMI 38 kg/m²) ed il GRWR era del 3%.


Al trapianto è stata eseguita un'epatectomia totale con un'anastomosi cavale secondo "classical piggy-back technique". Nel post-operatorio presenza di ascite refrattaria.

Descrivere management diagnostico-terapeutico del paziente.

PROVA PRATICA n. 2

Quesito n. 1:

Uomo di 60 anni con cirrosi epatica NASH-relata Child-Pugh score C e sindrome di Dunbar: strategie chirurgiche per trapianto di fegato.

Quesito n. 2:

Paziente di 65 anni sottoposto a trapianto di fegato con split graft (extended-right graft) da donatore DBD di 35 anni con GRWR di 1.1%.

In 6^a giornata post-operatoria il paziente presenta encefalopatia severa, bilirubina totale 10 mg/dl, INR 1.9, ALT 600 UI/l, AST 750 UI/l e ascite refrattaria.

Valutazione clinica e management terapeutico.



PROVA PRATICA n. 3

Quesito n. 1:

Trapianto di fegato in paziente con reperto intraoperatorio di trombosi portale Yerdel IV: strategie chirurgiche.

Quesito n. 2:

Paziente di 60 anni, affetto da insufficienza renale cronica terminale da glomerulosclerosi focale e segmentaria, è sottoposto a trapianto di rene da donatore DBD di 65 anni.

Al trapianto, mismatch 1-0-0, senza Donor specific antibody (DSA). Nell'immediato post-trapianto buona funzionalità del graft (creatinina 1.5 mg/dl), in terapia con Tacrolimus, MMF, prednisolone e induzione con Basiliximab. Dopo 3 mesi dal trapianto, il paziente presenta creatinina 4 mg/dl, edemi periferici ed ipertensione arteriosa.

Discutere management diagnostico-terapeutico del paziente.

[Signature]

ELENCO DOMANDE PROVA ORALE

1	Iter diagnostico terapeutico del colangiocarcinoma
2	Intervento di pancreasectomia distale laparoscopica: indicazioni e tecnica chirurgica
3	Intervento di Whipple per adenocarcinoma del pancreas
4	Iter diagnostico terapeutico dell'adenocarcinoma del pancreas
5	Epatectomia destra per metastasi epatiche
6	Valutazione del paziente con epatopatia cronica candidato a resezione epatica maggiore
7	Tumori neuroendocrini del pancreas
8	Iter diagnostico terapeutico del tumore della colecisti
9	Criteri di staging dell'epatocarcinoma per il trapianto di fegato
10	Tecniche di downstaging e bridging per paziente con l'epatocarcinoma in attesa di trapianto di fegato
11	Complicanze post-operatorie nel trapianto di fegato
12	Tecniche chirurgiche per trapianto di fegato
13	Indicazione al trapianto di fegato per metastasi epatiche da tumore del colon - retto
14	Indicazioni e valutazione pre-operatoria del candidato a trapianto di rene
15	Tecnica chirurgica di trapianto di rene
16	Complicanze post-operatorie nel trapianto di rene
17	Diagnosi e trattamento del rigetto acuto nel trapianto di rene
18	Indicazioni e tecnica chirurgica per trapianto combinato di rene - pancreas
19	Valutazione pre-operatoria del donatore vivente di rene a scopo trapianto
20	Tecniche chirurgiche per nefrectomia a scopo donazione di rene