

Id	Quesito	Risp_esatta	Risp_errata_1	Risp_errata_2	Risp_errata_3
1	Se un Oss ha accidentalmente rovesciato una brocca d'acqua nel corridoio dell'unità operativa, per ridurre il rischio di cadute, qual è il primo intervento che si dovrebbe attuare ?	Restare dov'è avvenuto l'incidente e mandare qualcun altro a chiamare il personale delle pulizie per fare asciugare	Andare a prendere degli asciugamani o qualcos'altro per asciugare	Riempire di nuovo la brocca d'acqua e portarla al paziente, quindi tornare ad asciugare	Chiamare il personale delle pulizie dalla postazione più vicina per asciugare
2	RIVELAZIONE DEL POLSO - Prima di procedere, è opportuno invitare la persona ad assumere la posizione supina e a posizionare l'avambraccio sul torace o lungo il fianco con il polso:	esteso e il palmo verso il basso	e la mano nella posizione preferita dall'assistito	esteso e il palmo verso l'alto	flesso e la mano chiusa
3	Qual è il primo parametro da rilevare, in caso di dispnea?	La difficoltà respiratoria	L'utilizzo dei muscoli accessori	La difficoltà ad effettuare attività	Il colorito cutaneo e la presenza di cianosi o pallore
4	I compiti forniti dall'infermiere devono essere eseguiti sempre e comunque dall'OSS?	Solo se rientrano nelle mansioni previste dal profilo OSS	Solo se espressi in maniera scritta nel registro delle consegne	Sì, sempre e comunque	Sì, se espressi in maniera chiara
5	Nell'aiuto al paziente durante la vestizione, che cosa deve fare l'OSS?	L'OSS deve rispettare i tempi della persona	L'OSS deve assistere altri pazienti, disinteressandosi	L'OSS deve essere veloce per evitare colpi di freddo	L'OSS deve agire sempre molto lentamente
6	L'assunzione di alimenti, per un paziente portatore di sondino naso-gastrico può avvenire:	sia con il sondino, sia per os	solo tramite sondino	solo per os	solo con semi-solidi
7	Cos'è necessario per evitare che l'anziano posizionato su un seggiolone polifunzionale scivoli in avanti con il sedere?	L'Oss bascula la carrozzina evitando di inclinare lo schienale oltre i novanta gradi	L'Oss posiziona una cintura addominale	L'Oss bascula la carrozzina e inclina lo schienale più che può	L'Oss inclina lo schienale della carrozzina
8	Quale tra queste azioni NON deve compiere l'Oss nel rifacimento del letto?	Scuotere la biancheria usata con vigore	Maneggiare il meno possibile la biancheria usata	Piegare con cura la biancheria pulita	Posizionare il campanello di chiamata a portata della persona
9	Su cosa si basa il modello di lavoro "per équipe"?	Distribuzione delle responsabilità in funzione delle competenze della condivisione di obiettivi e decisioni	Turnazione del lavoro	Tendenziale deresponsabilizzazione dei membri dell'équipe	Ripetività delle mansioni affidate ai membri dell'équipe
10	Come avviene il confezionamento, nel caso di biancheria infetta?	Separatamente attraverso un sacco interno idrosolubile e un sacco esterno in polietilene	Insieme a tutta la biancheria piana	Nessuna delle altre risposte è corretta	Separatamente attraverso un sacco in polietilene
11	Quale affermazione NON è corretta in riferimento al lavaggio delle mani.	Non è obbligatorio prima delle manovre assistenziali	Può essere effettuato anche senza l'utilizzo di acqua corrente	È la misura più importante per la prevenzione delle infezioni ospedaliere	Può essere sociale, antisettico, chirurgico
12	In quale dei seguenti casi, un paziente emette radiazioni ionizzanti strumentalmente?	Quando ha effettuato un esame scintigrafico	Quando ha effettuato un esame TAC	Quando ha effettuato una RMN	Quando ha effettuato un'ecografia
13	(Raccolta di campioni di urine nelle ventiquattro ore) L'urina della prima minzione:	non deve essere tenuta	a discrezione della persona	deve essere tenuta	può essere tenuta
14	_____ non è considerato un elemento che permette di distinguere una confezione sterile.	La presenza di indicatori di viraggio	Il colore del materiale con il quale viene realizzato il confezionamento	L'integrità della confezione	La descrizione del contenuto, la data di preparazione e di scadenza
15	Quando va eseguita l'igiene del cavo orale?	Dopo ogni pasto o almeno tre volte al giorno	Una volta al giorno	Due volte al giorno	Tre volte al giorno
16	Come si esegue la detersione di una ulcera da pressione?	Va eseguita con soluzione fisiologica	Va eseguita con antisettici a base di iodio	Va eseguita con soluzioni a base di ipoclorito di sodio	Va eseguita con clorexidina gluconato
17	Quale tra i seguenti interventi NON va attuato davanti ad una persona con improvviso malore?	Posizionare a letto e aspettare che si riprenda	Controllare il respiro e circolo	Verificare lo stato di coscienza	Distendere la persona in posizione antishock
18	Quale tra i seguenti interventi NON va attuato in caso di caduta di un paziente?	Posizionare dei cuscini sotto la testa e/o gli arti per diminuire il dolore e farlo stare più comodo	Mettere in posizione di sicurezza se incosciente	Rilevare lo stato di coscienza e la presenza di circolo	Lasciare la persona a terra fino all'arrivo di infermiere o medico
19	Quale tra i seguenti parametri NON va controllato in un paziente in terapia diuretica?	La frequenza cardiaca	L'assunzione di liquidi nelle ventiquattro ore	La presenza di edemi	La diuresi nelle ventiquattro ore
20	Come deve essere smaltito un bendaggio usato, senza pomata e non contaminato?	Come rifiuto sanitario non pericoloso assimilato agli urbani	Come rifiuto sanitario che prevede particolari sistemi di gestione	Come rifiuto sanitario pericoloso a rischio infettivo	Come rifiuto sanitario pericoloso a rischio non infettivo
21	_____ non è un principio di corretta sanificazione.	Disinfettare quotidianamente il pavimento delle stanze di degenza	Scegliere detergenti differenziati in base allo sporco	Spolverare con un panno pulito e umido	Adoperare panni monouso differenziati
22	Quale posizione è più opportuna da far assumere al paziente per la somministrazione dell'enteroclisma?	La posizione decubito laterale sinistro con ginocchio destro flesso	La posizione prona	La posizione di Cromwell	La posizione decubito destro con ginocchio flesso
23	Qual è la corretta modalità di raccolta di un campione di urina per urinocoltura?	Pulizia dei genitali, mani lavate, contenitore sterile, mitto intermedio	Pulizia dei genitali, mani lavate, contenitore pulito, mitto intermedio	Pulizia dei genitali, mani lavate, contenitore non sterile, mitto iniziale	Pulizia dei genitali, digiuno, contenitore pulito, mitto intermedio
24	Nel caso di contatto accidentale con materiale biologico, l'Oss deve effettuare il _____.	lavaggio antisettico	nessun lavaggio particolare	lavaggio sociale	lavaggio di routine
25	Qu'affermazione NON è corretta riguardo l'assistenza nel paziente portatore di catetere vescicale.	Il sacchetto in mancanza di supporto può stare a terra	Il sacchetto deve essere sistemato nell'apposito supporto	Il sistema di raccolta deve essere sterile	Il sacchetto deve stare in basso rispetto al bacino

26	In che modo l'Oss deve sistemare il piano, dovendo posizionare un paziente nella posizione laterale destra?	L'Oss deve sistemare il piano in posizione orizzontale	L'Oss deve sistemare il piano a 45 gradi	L'Oss deve sistemare il piano a 90 gradi	L'Oss deve sistemare il piano a 30 gradi
27	Nell'assistenza alla persona disfagica che cosa è importante?	Rispettare i tempi di somministrazione del pasto	Posizionare la persona con il capo leggermente reclinato indietro	Somministrare una dieta a doppia consistenza	Adoperare la cannuccia per la somministrazione delle bevande
28	Come deve essere posizionato il paziente che abbia un episodio ipotensivo?	Deve essere posizionato disteso supino con i piedi sollevati	Deve essere posizionato nella posizione di sicurezza	Deve essere posizionato disteso supino con capo sollevato	Deve essere posizionato nella posizione semiseduta
29	Durante l'assistenza di una persona affetta da disfagia di grado moderato è importante:	rispettare i tempi nella somministrazione del pasto	posizionare la persona con il capo leggermente reclinato indietro	somministrare una dieta a doppia consistenza	adoperare la cannuccia per la somministrazione delle bevande
30	Assistendo una persona con diarrea è importante prevedere:	l'integrazione di liquidi	il controllo della cute	l'introduzione di alimenti ricchi di fibre	l'integrazione di alimenti ricchi di zuccheri
31	Nella gestione di un paziente con catetere vescicale per ridurre il rischio di infezione delle vie urinarie è importante:	favorire l'idratazione	sostituire la sacca di raccolta delle urine una volta ogni ventiquattro ore	igiene perineale accurata e quotidiana con disinfettante	appoggiare la sacca di raccolta di urina sopra il livello del materasso
32	I bisogni del malato sono:	bisogni fisiologici, bisogni di stima e autorealizzazione, bisogni di sicurezza e bisogni di appartenenza	bisogni fisiologici (mangiare, dormire, respirare, muoversi, ...) e bisogni di autorealizzazione	bisogni di sicurezza per reazione a paura, insicurezza, ansia e bisogni di autorealizzazione	bisogni di amore e di appartenenza e bisogni di autorealizzazione e bisogni fisiologici (mangiare, dormire, respirare, muoversi, ...)
33	In caso di dieta a basso residuo di scorie si deve evitare:	verdura, legumi, patate, frutta secca	fritti	un secondo a base di carne	latte e yogurt
34	Il triage è un sistema per:	dare priorità assistenziali ai pazienti	identificare i pazienti per mezzo della malattia	conteggiare i pazienti che sono in attesa di cure	assegnare i pazienti ai vari reparti
35	Uno dei principi della comunicazione afferma che "Non si può non comunicare". Questo significa che:	qualsiasi nostro atteggiamento comunica qualcosa agli altri	nessuna delle altre risposte è corretta	bisogna sempre rispondere alle domande che ci vengono poste	ogni comunicatore sostiene solo il proprio punto di vista
36	Nel concetto di relazione di aiuto sono implicati:	operatore-utente	utente-operatore-amministrazione (intesa come struttura)	operatore-utente-colleghi	tutte le altre risposte sono corrette
37	Per lesioni da decubito si intende:	una lesione del tessuto cutaneo dovuta a compressione e/o stramento e/o frizione	un'alterazione degli stati superficiali della cute dovuta ad eccesso di tessuto adiposo	una lesione cutanea dovuta ad allergia agli ausili antidecubito	una lesione delle prominenze ossee
38	In un paziente disfagico non si somministrano:	bevande calde	bevande addensate	alimenti semiliquidi	alimenti freddi
39	La confezione vuota di un detergente classificato come corrosivo va classificata come rifiuto sanitario:	pericoloso a rischio non infettivo	non pericoloso assimilato agli urbani	che prevede particolari sistemi di gestione	pericoloso a rischio infettivo
40	Se un disinfettante va diluito al 0,2% in due litri di acqua ne devo mettere _____ ml.	4	40	0,4	0,20
41	La scheda di Barthel viene utilizzata per valutare:	l'autonomia nelle ADL e nella mobilità	i disturbi del comportamento	il rischio di caduta	lo stato cognitivo
42	Per sterilizzazione si intende:	distruzione di tutti i microrganismi sia in forma vegetativa sia sporigena	asportazione di sostanze estranee	distruzione dei microrganismi patogeni	uccidere i vettori di germi patogeni, gli insetti e i piccoli animali
43	Per ventilazione si intende:	il movimento dell'aria dall'esterno ai polmoni e viceversa	il trasporto di ossigeno e anidride carbonica	l'aria che arriva agli alveoli	la quantità di ossigeno che attraversa le membrane alveolari
44	La medicazione secca significa:	la protezione di una lesione	l'applicazione di etere	l'applicazione di un impacco sulla cute	la detersione e disinfezione di lesioni di continuo
45	Se un disinfettante va diluito allo 0,3% in 3 litri di acqua bisogna mettere _____ ml	9	90	0,9	0,90
46	La flora residente sulla cute della mano è:	non patogena	nessuna delle altre risposte è corretta	patogena	inesistente (non sono presenti i batteri)
47	I microrganismi saprofiti sono:	organismi eterofili che si nutrono di sostanze morte di cui provocano e accelerano la decomposizione	organismi in grado di sintetizzare molecole organiche complesse partendo da molecole inorganiche semplicissime	nessuna delle altre risposte è corretta	organismi che traggono il proprio nutrimento sfruttando altri organismi viventi detti ospiti che vengono da loro lentamente danneggiati
48	I parametri che maggiormente influenzano la sterilizzazione a vapore sono:	temperatura, pressione, tempo di esposizione	temperatura di esercizio, vuoto, vapore	temperatura, vapore, vuoto	vapore, temperatura, umidità
49	Indicare la caratteristica che non deve avere una consegna scritta.	Schematicità	Precisione	Veridicità	Tempestività
50	La resilienza è la capacità di:	riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà	orientare le proprie abilità cognitive, sociali, emozionali e comportamentali in maniera efficiente per raggiungere i propri obiettivi	gestire positivamente il conflitto	esprimere in modo chiaro ed efficace le proprie emozioni e opinioni
51	I meccanismi di difesa sono:	processi psicologici che intervengono per proteggere l'io	reazioni della persona all'istituzionalizzazione	agenti di barriera per prevenire le infezioni	procedure da attuare in caso di eventi catastrofici
52	Per empatia si intende:	mettersi nei panni dell'altro	simpatia	immedesimazione	la percezione dei sentimenti dell'altro
53	Il termine "stipsi" significa:	mancata evacuazione ogni 2/3 giorni	mancata evacuazione quotidiana	mancata evacuazione ogni 6/7 giorni	forti scariche di diarrea
54	Come si chiama una forte angoscia invincibile ed immotivata per situazioni, azioni ed oggetti?	Fobia	Obsessione	Paura	Reazione

55	Quando si aiuta una persona a deambulare si deve:	sostenere sotto l'ascella, far guardare la posizione dei piedi, farsi aiutare da un familiare	nessuna delle altre risposte è corretta	fare indossare scarpe allacciate, sostenere da sotto l'ascella, far guardare in avanti	sostenere la persona, obbligandola a puntare lo sguardo in alto e facendole indossare degli elastici restringenti alle cosce
56	Per U.V.M. si intende:	Unità di valutazione multidisciplinare	Unità di valutazione mista	Unione di valle per minoranze	Ultra violetto monitor
57	Per sanificazione ambientale si intende la pulizia fatta:	con i detergenti	senz'acqua e comunque con sistemi ad umido	con i disinfettanti	nessuna delle altre risposte è corretta
58	Le fasi fondamentali di una procedura assistenziale sono:	fase informativa, fase organizzativa, fase esecutiva, fase valutativa	fase preparatoria, fase organizzativa, fase esecutiva, fase informativa	fase valutativa, fase organizzativa, fase esecutiva, fase informativa	nessuna delle altre risposte è corretta
59	Quando viene prescritta ad un paziente una dieta priva di scorie, la persona non potrà assumere:	fibre	grassi	zuccheri	sale
60	Quale delle seguenti definizioni si avvicina maggiormente alla parola "spossatezza"?	Estrema debolezza	Grande felicità	Estrema forza	Grave infezione non localizzata
61	Le infezioni ospedaliere cosiddette "crociate" sono:	quelle che si originano e si diffondono all'interno di un singolo ospedale	quelle per combattere le quali è necessario il ricovero ospedaliero	quelle che non si sviluppano mai in ospedale	nessuna delle altre risposte è corretta
62	Dopo un ciclo di sterilizzazione l'OSS si accorge che alcune confezioni di garze si presentano umide, quale accorgimento mette in atto?	Esegue un nuovo confezionamento e un nuovo ciclo di sterilizzazione	Esegue un nuovo ciclo di sterilizzazione	Denuncia l'accaduto alle forze di vigilanza	Aspetta che le confezioni si asciughino prima di utilizzarle
63	La scala di Maslow individua:	le necessità e i bisogni dell'uomo	il rischio di insorgenza di lesioni da decubito	valuta lo stato di coscienza	la pulizia delle stanze
64	Un soggetto inappetente è una persona che:	non ha appetito	mangia troppo	mangia in modo disordinato	mangia solo cibi proteici
65	Lo stato di coscienza di una persona si rileva attraverso:	risposta alla chiamata o dopo manovre di scuotimento	informazioni raccolte dai testimoni dell'evento	verifica dell'attività respiratoria	lo sfigmomanometro a cristalli liquidi
66	Il processo di assistenza ha come finalità:	lavorare per obiettivi	lavorare per compiti	standardizzare l'assistenza	nessuna delle altre risposte è corretta
67	Con l'autoclave non è possibile sterilizzare:	fibre ottiche	materiale tessile	ferri chirurgici	nessuna delle altre risposte è corretta
68	Nella relazione di aiuto, l'ascolto attivo significa:	prestare attenzione ed interesse a ciò che la persona ci dice	chiedere spiegazioni con domande dirette e precise	orientare la persona su un contenuto comunicativo particolare	nessuna delle altre risposte è corretta
69	La pulizia della cute peristomale, in una persona con colostomia, di norma va eseguita con:	acqua e sapone neutro	soluzione fisiologica sterile	soluzione fisiologica sterile e poi antisettica	nessuna delle altre risposte è corretta
70	Tra le fasi di preparazione della persona assistita allettata che deve essere alimentata è importante:	informarsi se vi sono problemi di deglutizione e masticazione	controllare che letto e biancheria siano puliti	eseguire sempre il test di Marlow per capire cosa servire	eseguire il test di Conley per verificare lo stato di digestione
71	L'igiene di una salma viene effettuata preferibilmente:	prima della comparsa del rigor mortis	è indifferente	dopo la comparsa del rigor mortis	qualche settimana dopo la morte
72	Per protesi si intende:	un presidio per sostituire una funzione fisiologica	un presidio per compensare una funzione fisiologica	un presidio ortopedico per compensare una funzione fisiologica	nessuna delle altre risposte è corretta
73	Per campione statistico si intende:	una parte della popolazione scelta casualmente	il numero di soggetti che si presentano allo studio	deve essere di almeno 100 persone	deve essere di almeno 200 persone
74	Nei soggetti con morbo di Crohn in fase di riacutizzazione la dieta deve essere:	a basso contenuto di fibre	prevalentemente liquida	ad alto contenuto di fibre	nessuna delle altre risposte è corretta
75	Per il trattamento della stipsi l'Oss può collaborare con l'infermiere per:	preparare clistere	elaborazione di una dieta equilibrata	somministrazione di farmaci lassativi	nessuna delle altre risposte è corretta
76	Per confusione mentale si intende:	stato di obnubilamento della coscienza	stato di disorientamento esclusivamente spaziale	stato di disorientamento esclusivamente temporale	nessuna delle altre risposte è corretta
77	Un bambino si è incrinato il perone. Pertanto:	Sarà compromessa la sua attività motoria	Non potrà masticare	Sarà compromessa la sua attività digestiva	Non potrà parlare
78	Per "orchite" si intende:	L'infiammazione del testicolo	Il tumore del testicolo	Una forma molto grave di teratogenesi	L'infiammazione della lingua
79	Per "difterite" si intende:	Una malattia infettiva	Un difetto della valvola atriale	Un disturbo della respirazione	L'infiammazione gastrointestinale
80	Per "mastite" si intende:	L'infiammazione delle mammelle	La masticazione dolorosa	La malattia epidermica	Una malattia infettiva
81	Nella saliva vi è la presenza di sostanza ad attività:	Antibatterica	Antispastica	Emulsionante	Emolitica
82	L'attività cardiaca è misurata attraverso:	L'elettrocardiogramma	La radiografia	I manometri	L'elettroencefalogramma
83	"_____ " fa parte dell'apparato respiratorio:	La trachea	L'esofago	Lo stomaco	L'intestino
84	La cirrosi:	E' una condizione patologica a carico del fegato	E' una condizione patologica a carico dell'apparato riproduttore	Coplisce solo le donne	Coplisce solo gli uomini
85	Per assuefazione a una sostanza si intende:	La necessità di aumentare il dosaggio della sostanza per ottenere gli stessi effetti	Una causa di astinenza	Una sensazione puramente psichica di abitudine a fattori stressanti	Un sinonimo di dipendenza
86	La deglutizione può essere divisa in più fasi. La fase volontaria avviene in:	Bocca	Faringe	Esofago	Stomaco
87	"_____ " è una caratteristica del circolo polmonare:	La bassa pressione ed alto flusso	La bassa pressione e basso flusso	L'alta pressione e basso flusso	L'alta pressione ed alto flusso
88	Per capnometria si intende:	La misura della CO ₂ a livello delle vie respiratorie	Una misura del consumo di ossigeno a riposo	Una recente tecnica di biologia molecolare	Una tecnica sperimentale
89	L'obesità non è un fattore di rischio per:	L'ipotiroidismo	Il diabete mellito	L'ipertrigliceridemia	L'ipertensione
90	Per impanto si intende:	Un qualsiasi materiale biologico	Un innesto di tessuto prelevato da un altro specie	Il trasferimento di un lembo da un individuo ad un altro	Un materiale utilizzato all'interno dell'organismo, ma estraneo ad esso

91	Il termine ausilio significa:	Qualunque prodotto, strumento, tecnologia usato per prevenire, compensare, alleviare o neutralizzare la disabilità e migliorare l'autonomia e la qualità della vita delle persone	Qualsiasi intervento effettuato da OSS o infermieri finalizzato a sostituire in parte o in tutto l'autonomia del paziente	Qualunque prodotto usato per sostituire parti del corpo mancanti	Tutte le altre risposte sono corrette
92	Di fronte ad un paziente con dispnea, mantenere:	La posizione semiseduta nel letto	La posizione distesa nel letto in posizione prona	La posizione distesa nel letto in posizione supina	Qualunque posizione
93	In caso di ipotensione con un sospetto stato di shock il paziente va posizionato:	Disteso supino con i piedi sollevati	Disteso supino col capo sollevato	Nella posizione semiseduta	Nella posizione laterale
94	I professionisti, che devono essere sempre presenti nel nucleo centrale dell'Unità di Valutazione Geriatrica, sono:	Geriatra, infermiere, assistente sociale	Geriatra, fisiatra, assistente sociale	Geriatra, psicologo, medico di base	Geriatra, OSS, assistente sociale
95	"_____ " NON rientra fra le misure preventive per evitare la formazione delle piaghe da decubito.	Il massaggiare le prominente ossee	Lo stimolare la circolazione	Il decomprimere cambiando frequentemente la posizione dell'assistito	L'abbagliare il paziente con fibre naturali
96	La sindrome da immobilizzazione può essere contraddistinta da:	Tutte le altre risposte sono corrette	Irrigidimento delle articolazioni ed osteoporosi da disuso	Accorciamento dei tendini e dei corpi muscolari	Perdita di azione antigravitaria dei muscoli
97	Nella patogenesi delle lesioni da decubito rientrano:	Tutte le altre risposte sono corrette	Lo sfregamento	La forza di torsione e lo stiramento	L'alimentazione normo-calorica
98	L'urgenza è:	Direttamente proporzionata al pericolo di vita dell'infortunato	Indipendente dal pericolo di vita dell'infortunato	Indirettamente proporzionata al pericolo di vita dell'infortunato	Relativa ai codici bianchi
99	Per una adeguata assistenza a una persona che vomita è necessario:	Indossare i guanti, procurarsi una bacinella e traverse di cotone, quindi cambiare la biancheria del letto e del paziente, controllare l'aspetto del vomito e riferire all'infermiere	Cambiare solo la biancheria del letto	Procurarsi bacinella e asciugamani	Esclusivamente controllare l'aspetto del vomito e riferire all'infermiere
100	Gli elementi che caratterizzano il rapporto supportivo sono:	Fiducia ed empatia	Solidarietà e amicizia	Distacco e austerità	Fiducia e distacco
101	In un paziente epatopatico "_____ " sono da abolire.	Le bevande alcoliche	Il pesce e la carne	I succhi di frutta	La pasta ed il riso
102	Per Problem Solving si intende:	Una metodologia scientifica per la risoluzione dei problemi	Un metodo scientifico specifico per la psicologia	Un metodo scientifico per l'assistenza infermieristica	Il processo di assistenza infermieristica
103	Per "primary nurse" si intende:	Un processo assistenziale individualizzato atto a garantire la continuità nella presa in carico	Una modalità interdisciplinare di presa in carico	Uno strumento organizzativo	Nessuna delle altre risposte è corretta
104	Per "case manager" si intende:	Un operatore che gestisce dei casi in un percorso predefinito	Un operatore che gestisce dei casi	Un modello funzionale	Uno strumento organizzativo
105	La standardizzazione può essere descritta come:	Ogni attività eseguibile con sequenze ripetitive e "protocollabili"	Insieme di attività finalizzate alla produzione di un servizio	Insieme di attività finalizzate alla produzione ed erogazione di un servizio	Indicazioni di comportamento clinico prodotte attraverso un processo sistematico allo scopo di assistere i pazienti e i professionisti per garantire le modalità assistenziali più appropriate
106	La fase di pianificazione riguarda:	La prelevazione di un piano assistenziale che stabilisca le proprietà assistenziali, programmi e che coordini le attività dell'equipe nell'erogazione dell'assistenza	La raccolta sistematica di dati soggettivi e obiettivi	La rilevazione e la risoluzione dei problemi della persona	L'identificazione dei problemi assistenziali prioritari
107	Per "day hospital" si intende:	Una modalità assistenziale per effettuare cure, esami, terapie	Una clinica che funziona un solo giorno	Una analisi diagnostica specialistica	Una terapia della durata specifica di 24 ore
108	Il processo di assistenza serve per:	Lavorare per obiettivi	Standardizzare l'assistenza	Adoperare le procedure	Lavorare per compiti
109	L'operatore socio-sanitario è:	Una figura di supporto all'assistenza sanitaria e sociale	L'operatore tecnico ausiliario	Il nuovo infermiere generico	Il nuovo ausiliario socio-sanitario
110	Gli ambiti di azione delle figure di supporto si declinano in interventi di:	Carattere igienico-sanitario, di tipo domestico-alberghiero, di tipo sociale e di assistenza diretta	Carattere igienico-sanitario, di tipo domestico-alberghiero e di tipo sociale	Carattere igienico-sanitario e di tipo domestico-alberghiero	Nessuna delle altre risposte è corretta
111	L'OSS può comunicare ai parenti notizie:	Generali sulla struttura	Sanitarie del paziente	Sulla situazione sociale del paziente	Tutte le altre risposte sono corrette
112	Il day hospital geriatrico è una forma:	Di ospedalizzazione diurna che non richiede a degenza dei pazienti anziani	Di ospedalizzazione effettuata a casa del paziente anziano	Di ricovero dei pazienti anziani in casa di riposo	Di ricovero in struttura RSA
113	Per ADI si intende:	Assistenza Domiciliare Integrata	Assistenza Domiciliare Infermieristica	Assistenza Dinamiche Indipendenti	Nessuna delle altre risposte è corretta
114	Le fibre alimentari:	Sono indigeribili	Hanno potere nutritivo	Sono contenute nella carne	Nessuna delle altre risposte è corretta
115	L'obiettivo dell'assistenza domiciliare integrata è:	Assicurare un complesso coordinato di prestazioni rivolte a persone affette da patologie acute o riacutizzate o bisognose di un trattamento riabilitativo perché portatrici di problemi a carattere cronico o infermità invalidanti	Fare compagnia agli anziani	Assistere i bambini che hanno i genitori che lavorano	Nessuna delle altre risposte è corretta
116	Il deambulatore ha sempre:	Quattro piedi con o senza rotelle	Il sostegno ascellare	Le rotelle	Le bratelle
117	La movimentazione manuale dei carichi può provocare:	Patologie a livello dorso-lombare	Patologia alla cervicale	Patologia alla vista	Patologie dermatologiche
118	Nella sindrome di allattamento:	La circolazione è fortemente deficitaria	I muscoli sono tonici	Il paziente respira bene	Nessuna delle altre risposte è corretta
119	Per il malato cambiare spesso posizione nel letto è importante:	Per favorire la circolazione	Per evitare cali di pressione	Per evitare dolori articolari	Per evitare cefalea

120	L'OSS ha competenze atte a:	Controllare e assistere alla somministrazione delle diete	Richiedere una dieta speciale	Elaborare diete semplici	Nessuna delle altre risposte è corretta
121	Il termine "triage" indica:	Il metodo di valutazione e selezione immediata usato per assegnare il grado di priorità per il trattamento quando si è in presenza di molti pazienti	La lista dei pazienti che devono pagare il ticket	Solo i pazienti che arrivano in pronto soccorso in codice rosso	La lista dei pazienti che sono esenti da ticket
122	Il servizio di Continuità Assistenziale:	E' l'ex Guardia Medica	E' l'ex consultorio familiare	Indica case di cura psichiatriche	Indica la dialisi domiciliare
123	L'eliminazione dei liquidi avviene:	Sia attraverso urine e feci, sia attraverso pelle e polmoni	Esclusivamente attraverso urine	Esclusivamente attraverso feci	Esclusivamente attraverso pelle
124	"_____ " rappresenta un fattore di rischio di malnutrizione.	La compromissione della deglutizione	La compromissione della mobilità	La stipsi	L'incontinenza fecale
125	L'attività dell'OSS è indirizzata a:	Sia favorire l'autonomia dell'utente, sia soddisfare i bisogni primari secondo le proprie competenze in un contesto sia sociale sia sanitario	Favorire l'autonomia dell'utente	Soddisfare i bisogni primari secondo le proprie competenze in un contesto sia sociale sia sanitario	Rispondere ai bisogni di assistenza della persona negli ambiti di cura ospedaliero
126	Le feci formate sono:	Feci solide	Feci semiliquide	Feci color giallo-marrone	Feci color grigio
127	Indica i livelli di operatività dell'OSS in ospedale:	Tutte le altre risposte sono corrette	L'OSS opera in autonomia quando è autorizzato per attività pertinenti al proprio profilo	L'OSS opera in cooperazione diretta con l'infermiere per attività assistenziali complesse	L'OSS opera su prescrizione solo su precise attribuzioni dell'infermiere
128	Si "attribuisce" un compito assistenziale ad un OSS in base:	Alle capacità e competenze del singolo OSS	All'opportunità operativa	Alla consuetudine organizzativa	Allo staff infermieristico in turno
129	Un paziente portatore di catetere vescicale da alcune ore ha il sacchetto per raccolta urine vuoto, l'OSS deve:	Avvertire l'infermiere	Eseguire urinocultura	Introdurre una soluzione sterile attraverso il catetere	Somministrare dei liquidi per infusione
130	Indicare l'intervento riguardante l'assistenza ad un paziente affetto da demenza (che presenta crisi di disorientamento e confusione specie notturne) che risulta meno adeguato rispetto agli altri presentati:	Applicare mezzi di contenzione al letto del paziente	Mantenere anche durante la notte un minimo di livello di illuminazione	Informare i pazienti dei letti vicini sulle condizioni del paziente	Assegnare al paziente una stanza lontana da scale e usci
131	Un paziente ha subito un intervento chirurgico a livello addominale: "_____ " è indicato il cateterismo vescicale a permanenza:	In caso di necessità controllo diuresi	In caso di incontinenza vescicale	In caso di persona anziana	In caso di necessità controllo della glicemia
132	La dieta "_____ " è indicata in un paziente affetto da cirrosi epatica:	Iperglucidica e iperproteica	Iperglucidica e ipoproteica	Ipsodica e ipoproteica	Iperlipidica e ipocalorica
133	La nutrizione enterale viene adoperata:	Quando il paziente non è in grado di ingerire i cibi e quando il tratto gastrointestinale superiore è danneggiato	In caso di obesità	Quando c'è inappetenza	Quando la persona è diabetica
134	Il rispetto della privacy del paziente all'interno della struttura ospedaliera è obbligatorio:	Per rispettare una legge della Repubblica	Nel rispetto del Codice deontologico	Solo in casi particolari decisi dal responsabile dell'Unità Operativa	Nel rispetto del Codice etico
135	In caso di assenza di peristalsi nel periodo post operatorio è opportuno:	Evitare che il paziente assuma cibi e bevande	Evitare l'assunzione di liquidi sia per os che endovena	Incoraggiare l'assunzione di cibi semisolidi per favorire la ripresa della peristalsi	Evitare l'assunzione di liquidi endovena
136	Una persona ha accidentalmente ingerito un acido, da evitare di:	Provocare il vomito	Posizionare un sondino nasogastrico	Effettuare la lavanda gastrica	Tutte le altre risposte sono corrette
137	Indicare la affermazione errata relativa alla medicazione di una ferita chirurgica:	La tecnica asettica si basa sul solo uso di materiali monouso	Il corretto lavaggio delle mani è il fondamento della tecnica asettica	La medicazione deve essere effettuata in ambiente a carica batterica controllata	Nessuna delle altre risposte è corretta
138	"_____ " è indicata in un soggetto anziano sottoposto ad intervento di protesi d'anca.	Il bastone canadese	La carrozzina elettrica	Il tripode	Sia la carrozzina elettrica che il bastone canadese
139	La sonda di Sengstaken-Blakemore si usa per:	Il tamponamento nella rottura delle varici esofagee	La dialisi peritoneale	Il monitoraggio invasivo della pressione arteriosa	Misurare la pressione arteriosa
140	La curva termica si definisce "_____ " quando una persona nell'arco delle 24 ore alterna periodi di ipertensione e di ipotensione.	Intermittente	Remittente	Continua	Ricorrente
141	Dopo un prelievo di midollo eseguito sulla cresta iliaca si:	Effettua una prolungata compressione	Pratica un lieve massaggio	Applica una pomata antibiotica	Tampona per circa 20 secondi
142	L'Evidence based medicine è:	Un approccio alle problematiche sanitarie che considera sia i dati della letteratura scientifica che le esperienze dirette degli operatori	Una tecnica per valutare statisticamente i risultati complessivi di più studi epidemiologici che mettano in relazione un fattore di rischio ad una malattia	Una tecnica per valutare statisticamente i risultati complessivi di diverse sperimentazioni cliniche non controllate	Un approccio alle problematiche sanitarie che esclude il ricorso alla letteratura scientifica ufficiale
143	Indicare la affermazione corretta riguardante la persona diabetica insulina dipendente:	La dieta adeguata da sola, nella maggior parte dei casi, non risolve i problemi del paziente	Ogni 2 ore deve essere eseguito un accurato controllo della glicemia	Dopo ogni pasto deve essere eseguito un accurato controllo della glicemia	La somministrazione di insulina esclude la dieta ipoglicidica
144	In genere la relazione di aiuto nei confronti del paziente si realizza:	Quando attraverso la comunicazione nasce un clima di fiducia e di rispetto	Quando si informa il paziente su procedimenti diagnostici e terapeutici che lo riguardano	Ogni volta che l'OSS si sotituisce al paziente per risolvere le sue esigenze cliniche	Nessuna delle altre risposte è corretta
145	Nel "_____ " NON è contenuta la vitamina D.	Peperone	Burro	Tuorlo d'uovo	Formaggio

146	Per riabilitazione si intende l'intervento specifico da attuare nei confronti:	Del disabile. Tale intervento ha come obiettivo l'educazione o la rieducazione delle funzioni fisiche e/o mentali generate da uno stato di invalidità fisica, psichica o sensoriale	Delle barriere architettoniche. Tale intervento ha come obiettivo l'educazione o la rieducazione delle funzioni fisiche e/o mentali generate da uno stato di invalidità fisica, psichica o sensoriale	Delle patologie di cui è affetto il paziente	Del disabile. Tale intervento è fine a sé stesso
147	Il flussimetro:	Regola il flusso di gas in litri al minuto	Misura la velocità dell'aria	Diminuisce la pressione di uscita di gas da una bombola	Definisce la quantità di gas residuo della bombola
148	"_____ " non sono segni e sintomi di emorragia esterna.	La diminuzione della frequenza cardiaca	Il rigonfiamento dell'area della lesione	La tensione e indurimento della zona lesa percepibile alla palpazione	I segni di contusione, non accompagnati da continuità della cute
149	La "_____ " non è un parametro incluso nella Glasgow Coma Scale.	Termoregolazione	Apertura occhi	Risposta verbale	Risposta motoria
150	La sede più utilizzata per il rilievo della temperatura corporea con termometri elettronici è quella:	Auricolare	Orale	Ascellare	Nasale
151	La procedura è una successione:	Logica di ore, espressa in forma scritta, con lo scopo di eseguire un intervento secondo criteri di correttezza	Logica di ore, espressa in forma orale o scritta, con lo scopo di eseguire un intervento come viene svolto nella realtà lavorativa	Logica di ore, espressa in forma orale, con lo scopo di eseguire un intervento come viene comunemente svolto	Di azioni, con lo scopo di riprodurre in forma scritta, come un intervento viene svolto nella realtà lavorativa
152	Per "anticipazione" nel processo di comunicazione si intende:	Il verbalizzare le conclusioni o i contenuti del discorso altrui prima che l'altro abbia terminato di parlare	Il sottolineare verbalmente un livello di superiorità	Il sottolineare non verbalmente un livello di superiorità	Lo sfuggire alla comunicazione su argomenti sui quali non ci si vuole confrontare
153	Per cure igieniche totali si intende:	Bagno a letto, in vasca o in doccia	Lavaggio di mani	Lavaggio di piedi	Lavaggio, bidet e torace
154	Per empatia si intende la capacità di:	Comprendere ciò che l'altro vive	Dimostrare simpatia verso l'altro	Fingere interessamento verso l'altro	Sottolineare verbalmente un livello di superiorità
155	Nell'aiuto alla vestizione e svestizione della persona, l'OSS deve sempre:	Rispettare i tempi della persona	Essere veloce per non far prendere freddo al paziente	Svolgere l'attività sempre con un collega	Svolgere l'attività sempre con l'infermiere
156	Per qualità si intende:	Insieme delle caratteristiche di un prodotto o servizio che soddisfano le aspettative di un utente	Insieme delle caratteristiche di un prodotto o servizio che non soddisfano le aspettative di un utente	Ogni elemento disponibile e/o attivabile per il raggiungimento degli obiettivi di servizio	Il livello prestabilito di una prestazione per un operatore sanitario, una organizzazione, in rapporto a un indicatore specifico della qualità e/o dell'appropriatezza di un aspetto importante dell'assistenza
157	Per rilevare lo stato di disidratazione di un paziente si osserva:	Lo stato di cute e mucose	L'attività respiratoria	L'attività cardiocircolatoria	L'attività intellettuale
158	La misurazione della pressione arteriosa è importante per trasmettere informazioni in merito allo:	Stato della cute, delle arterie, sulla resistenza vascolare e della gittata cardiaca di un individuo	Stato della cute, delle vene, della capacità polmonare di un individuo	Apparato respiratorio	Apparato urinario
159	"_____ " è indicato somministrare la terapia orale.	In pazienti coscienti	In pazienti intubati	In pazienti con vomito	Nessuna delle altre risposte è corretta
160	Quando un paziente è incontinente è controindicato:	Consigliare di bere poco e posizionare il catetere vescicale	Unso di pannolini, igiene perinatale frequente	Controllo accurato dell'integrità della cute perinatale	Tutte le altre risposte sono corrette
161	Ad un anziano con disturbi neurocognitivi, si deve rivolgere:	Parlandogli normalmente guardando in viso	Parlandogli a voce alta nell'orecchio	Parlandogli sottovoce per non irritarlo	Utilizzando solo il linguaggio binario
162	Un paziente che lamenta stranguria riferisce all'OSS che:	Ha dolore e bruciore durante la minzione	Urina molto, circa 3000 ml nelle 24 ore	Si alza di notte per urinare e ha le gambe gonfie	Urina poco, circa 500 ml nelle 24 ore
163	"_____ " è a maggior rischio di "ab ingestis".	L'ospite affetto da disfagia	L'ospite privo di dentatura	L'ospite con insufficienza renale	L'ospite diabetico
164	L'OSS che assiste una persona con problemi di deambulazione deve assicurarsi che:	Ci sia la possibilità di fare sedere l'utente	La famiglia dell'assistito sia informata dell'attività svolta	L'utente sia collaboratore	L'utente sia consenziente
165	In un paziente ipoteso i valori pressori che si possono riscontrare sono "_____ " mmHg.	90\60	170\95	120\70	140\70
166	Una buona comunicazione con il paziente si ottiene:	Mantenendo il contatto visivo con il paziente	Usando termini difficili al fine di ottenere la fiducia mostrando competenza	Con domande brevi per guadagnare tempo	Evitando di rispondere chiaramente alle sue domande
167	Il modo migliore per tranquillizzare una persona è:	Informarlo di ogni cosa	Ignorare le sue domande	Dirgli di stare calmo	Parlare d'altro
168	"_____ " è ritenuta correlata alla morte improvvisa del lattante.	La posizione prona	L'uso del succhietto	La tossicosi gravidica	La postmaturità
169	Nell'assistenza alla persona morente, l'OSS deve:	Alleggerire l'ansia e il dolore del paziente aiutando i familiari a sopperire alla perdita	Sostare accanto al letto del paziente in attesa del decesso	Controllare i parametri vitali del paziente ogni 30 minuti e comunicarli ai familiari	Nessuna delle altre risposte è corretta
170	I farmaci sono sotto controllo del:	Coordinatore	Primario	Infermiere	Fisioterapista
171	La formazione della crosta:	E' indice di reazione vitale	E' di tipo linfatico nelle escoriazioni di V grado	Si verifica anche nel cadavere	E' di colore rosso-cupo nelle escoriazioni di I grado
172	Il fabbisogno giornaliero di acqua in un uomo adulto è:	2,5 litri	4 litri	3 litri	1 litro
173	L'unità di degenza è:	L'insieme di spazi e mobili a disposizione di ciascun malato	La permanenza del malato nella struttura ospedaliera	Il ciclo completo delle terapie previste	Il presidio ospedaliero
174	Le spondine del letto servono:	A impedire che il paziente possa cadere	A trattenere le lenzuola	A impedire il contatto di piaghe e ferite con le lenzuola	Ad appoggiare gli strumenti politici
175	La "_____ " è la posizione più idonea per un paziente che presenta difficoltà respiratoria.	Posizione semiseduta	Posizione supina	Posizione di Trendelenburg	Posizione genu-pettorale

176	La posizione " _____ " è la posizione migliore per un paziente che presenta una grave emorragia acuta.	Di Trendelenburg	Prona	Semiseduta	Supina
177	" _____ " è la disciplina che si propone di studiare la distribuzione degli eventi legati alle malattie e ai problemi sanitari nelle popolazioni umane.	L'epidemiologia	La sociologia	La statistica biomedica	La statistica sanitaria
178	Il cateterismo vescicale è:	Il prelievo dell'urina contenuta nella vescica	L'eliminazione delle feci presenti del retto	L'applicazione di una cannula a una vena	Il posizionamento di un tubicino nel quale iniettare farmaci
179	Il clistere viene adoperato per:	Svuotare l'ultimo tratto di intestino	Somministrare farmaci per via rettale	Effettuare una lavanda gastrica	Raccogliere l'urina a scopo diagnostico
180	Il momento migliore per praticare la pulizia mattutina del malato è:	Prima di colazione	Dopo colazione	Prima di pranzo	Indifferente
181	La temperatura ottimale dell'acqua impiegata per il bagno del paziente è di:	38 °C	25 °C	30 °C	28 °C
182	La pressione sistolica misura la:	Forza con cui il cuore pompa il sangue alla fine della contrazione	Pressione nelle vene tra un battito e l'altro	Forza con cui il cuore pompa il sangue all'inizio della contrazione	Pressione nelle arterie fra un battito e l'altro
183	Il SUEM è il:	Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica	Sistema Informativo Sanitario	Settore Unitario Emergenze Territoriale	Sistema di Rete dei Piani Sanitari
184	L'acronimo ABC ricorrente nella pratica del massaggio cardiaco significa:	Airway (pervietà delle vie aeree); Breathing (respirazione artificiale); Circulation (massaggio cardiaco)	Assicurare Buona Circolazione sanguigna	Associazione Bimbi Cardiopatici	Non esiste in campo medico-infermieristico tale acronimo
185	Le ASP forniscono:	Servizi assistenziali alla persona	Consulenza alle aziende in materia di sicurezza sul lavoro	Informazioni utili alla prevenzione degli incidenti domestici	Accoglienza secondaria permanente
186	Nell'avvelenamento da " _____ " è consigliabile provocare il rigetto della sostanza ingerita.	Cibo scaduto	Acidi	Alcali forti	Benzina
187	In caso di folgorazione bisogna:	Staccare il cavo e togliere la spina con l'ausilio di materiale isolante	Staccare l'infortunato subito dalla corrente a mani nude	Separare l'infortunato dal cavo utilizzando una mazza metallica	Staccare il cavo e coprire l'infortunato con materiale isolante
188	In caso di incidente stradale, per soccorrere un ferito è necessario:	Non spostare né sollevare il ferito	Dargli da bere per evitare ostruzioni alla bocca	Sollevarlo, spostandolo subito dal luogo dell'incidente	Non sganciare la cintura di sicurezza
189	Un ematoma si verifica in seguito ad:	Un eccessivo accumulo di sangue	Un eccessivo gonfiore del muscolo	Una sovrapposizione delle ossa	Una sovrapposizione dei muscoli
190	Lo sfigmomanometro viene adoperato per:	La pressione arteriosa	La temperatura corporea	Il peso	La velocità del sangue
191	La manovra di Heimlich è:	Un movimento che consente l'espulsione di un corpo estraneo che ostruisce le vie respiratorie	Una tecnica per potenziare i muscoli dei pettorali	Una tecnica per potenziare le capacità motorie in soggetti che hanno subito delle lesioni	Un movimento che consente di placare le convulsioni durante una crisi epilettica
192	" _____ " non è utile praticare la respirazione artificiale.	Nell'avvelenamento	Negli incidenti stradali	Nell'annegamento	Nella folgorazione
193	In caso di avvelenamento da morso di serpente compare\compaiono:	Emorragia a chiazze	Vesciche intorno alla parte colpita	Svenimento immediato	Nessuna delle altre risposte è corretta
194	Il sangue durante l'emorragia arteriosa fuoriesce:	Rosso vivo e a getto vivace e intermittente	Rosso chiaro e a getto lento	In piccole quantità e di un colore quasi neso	Rosso vivo, lentamente e continuamente
195	Il laccio emostatico si usa per:	Eseguire il prelievo ematico	Mantenere le ossa fratturate	Riparare i danni delle commozioni	Arrestare una talalgia
196	Prima di raccogliere l'espettorato, il paziente:	Non deve far colazione	Può far colazione se assume cibi liquidi	Può far colazione se assume una dieta ipoproteica	Deve eseguire una buona igiene del cavo orale
197	Nel mal di fegato si accusa dolore:	Al fianco destro	Al fianco sinistro	All'addome	Alla bocca dello stomaco
198	In caso di frattura della colonna vertebrale, la persona è impossibilitata a muovere:	I piedi o le dita dei piedi	Le mani	Le braccia	Le dita delle mani
199	" _____ " non è\sono indispensabile\i in una cassetta di Pronto Soccorso.	Una bottiglietta d'acqua	I pacchetti di garza sterili	Le polveri disinfettanti	Le stecche per fratture
200	Nei traumi chiusi addominali, l'organo più frequentemente interessato è:	La milza	Il fegato	Lo stomaco	Il pancreas
201	I segni vitali sono:	Tutte le altre risposte sono corrette	Temperatura corporea	Frequenza cardiaca e polso	Pressione del sangue
202	In caso di vomito violento, il rischio maggiore per il paziente è:	Rottura spontanea dell'esofago	Rottura del diaframma	Ernia diaframmatica	Ipertensione portale
203	Non è consigliabile ricorrere al bagno terapeutico:	In caso di malattie arteriose che generano riduzione del flusso sanguigno	Per eliminare residui di preparati ad uso locale precedentemente applicati sulla cute del paziente	Per alleviare sensazioni di fastidio alla cute come prurito o irritazione	Per rimuovere le croste di ferite in via di guarigione
204	Il semicupio è:	Il bagno terapeutico praticato per una particolare area del corpo (area perinale o vaginale) ed in particolare condizioni (presenza di emorroidi o avvenuto parto)	Il bagno terapeutico praticato per alleviare irritazioni della cute o ridurre gonfiore o edemi	La pratica per rilevare la regolarità della pulsazione arteriosa	La pratica della applicazione locale di caldo e di freddo
205	Il bagno terapeutico caldo è consigliabile a temperatura:	Non superiore a 45\46 °C	Non inferiore a 30 °C	Tra i 28 °C e 30 °C	A seconda della richiesta del paziente
206	L'impacco medicale è:	Un bagno terapeutico a cui viene aggiunta una sostanza farmacologica	Un bendaggio di contenzione	Una medicazione di tipo preventivo	Un pacco di medicinali
207	La medicazione " _____ " non è una tipologia di medicazione.	Di mobilitazione	Protettiva	Curativa	Di copertura
208	L'essudato è:	Il liquido purulento che fuoriesce dalle ferite infette	La sudorazione del paziente in stato febbrile acuto	L'eritema che si definisce in corrispondenza dei bordi della ferita infetta	La pratica in uso per la prevenzione e il controllo delle infezioni ospedaliere

209	I parametri vitali sono:	I segni vitali di un organismo	I dati che definiscono l'anamnesi di un paziente	I dati anagrafici raccolti all'atto del ricovero ospedaliero	Le reazioni ad una somministrazione farmacologica
210	"_____" non è sede dei parametri vitali.	Il plesso solare	Il polso	Il respiro	La temperatura
211	La frequenza respiratoria di un neonato è di "_____" respiri al minuto.	30\60	22\34	12\20	5\10
212	"_____" viene misurata la temperatura corporea.	Dalle due alle quattro volte al giorno	Una volta al giorno	Dalle tre alle sei volte al giorno	Ogni volta che ci sono tremori
213	Le preparazioni galeniche officinali sono:	I medicinali preparati secondo le indicazioni del farmacista	I vaccini	I medicinali omeopatici	I farmaci veterinari
214	Per i medicinali di automedicazione:	Non è necessaria la ricetta	E' necessaria la ricetta sempre	E' necessaria la ricetta solo quando siano richiesti in applicazione terapeutica a forme di dipendenza (es. tossicodipendenza, alcoolodipendenza)	Non esiste tale tipologia di farmaci
215	Una protesi acustica serve a:	Porre un soggetto nelle migliori condizioni possibili di ascolto	Accelerare i tempi per far sì che un soggetto sordo impari a parlare più presto	Adoperare meglio i messaggi sonori	Coprire gravi deficit uditivi
216	I sordomuti necessitano di rieducazione:	Audio-fonetica	Prettamente fonetica	Audio-tattile	Prettamente tattile
217	In caso di paziente allettato "_____" provvede alla mobilizzazione.	L'operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria	Il medico fisiatra	Il fisioterapista della riabilitazione	L'infermiere
218	"_____" non costituisce uno degli scopi per i quali è stato creato il servizio pubblico di assistenza alla famiglia e alla maternità.	La produzione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia in ordine alla procreazione responsabile	La tutela della salute fisica della donna	La tutela del prodotto del concepimento	L'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla paternità responsabile
219	I servizi territoriali per l'assistenza all'anziano sono:	Assistenza domiciliare, residenze sanitarie assistite (RSA), centro diurno	Assistenza ospedaliera, RSA, centri ricreativi	Centri ospedalieri, ambulatori, RSA	Ospedale di comunità, day hospital (dH), centri diurni
220	La coprocultura fornisce informazioni sulla presenza nelle feci di:	Microrganismi atipici	Sangue	Urina	Microrganismi atipici e sangue
221	Quando si toglie la padella al paziente allettato bisogna:	Tutte le altre risposte sono corrette	Osservare le feci	Provvedere all'igiene della regione	Riferire all'infermiere eventuali alterazioni
222	L'eccessiva macerazione cutanea è un fattore favorente:	Le lesioni da compressione	L'infezione da candida	Gli ematomi	Il prurito
223	L'assistenza "_____" è assegnata all'OSS.	Di base	Di tipo sociale	Di tipo sanitario	Delegata dall'infermiere
224	Indicare l'affermazione errata relativa al calibro del materiale da sutura.	Più piccola è la misura, più resistente è il filo	E' espresso in decimi di millimetro	E' espresso con numeri-simboli degli zero	Va adattato al tessuto su cui si agisce
225	La "_____" può condizionare l'insorgenza delle lesioni da compressione.	Malnutrizione	Ipotensione	Età inferiore a 65 anni	Presenza di catetere vestitale
226	Nell'alimentazione di un soggetto diabetico bisogna:	Verificare l'assunzione dell'intero pasto	Registrare la quantità di liquidi assunti nelle 24 ore	Somministrare solo tre pasti al giorno	In sostituzione dei dolci, proporgli biscotti aprotici
227	L'OSS svolge attività finalizzate a:	Tutte le altre risposte sono corrette	Soddisfare i bisogni primari della persona	Favorire il benessere dell'assistito	Mantenere l'autonomia del soggetto
228	Un prolungato allettamento della persona porta a conseguenze sul sistema:	Tutte le altre risposte sono corrette	Respiratorio	Scheletrico e muscolare	Cutaneo, nelle zone sottoposte a pressione
229	Il bastone adoperato come ausilio alla deambulazione deve avere:	Altezza 4 dita sopra la linea del polso, impugnatura comoda, gomma antiscivolo all'estremità	Gomma antiscivolo all'estremità inferiore, impugnatura in metallo, altezza a metà della coscia	Impugnatura di gomma, altezza a livello del torace, gomma antiscivolo all'estremità inferiore	Nessuna delle altre risposte è corretta
230	Prima di alimentare una persona non collaborante, l'OSS deve valutare:	Presenza di dentiera	Capacità di deglutire	Disponibilità di posate e tovagliolo	Eventuale terapia ai pasti
231	In una persona operata di protesi d'anca si deve evitare:	Incrocio degli arti inferiori	La flessione della gamba	Posizione semiseduta	Estensione del collo del femore
232	Boel è un test:	Per l'udito	Per il tatto	Per l'olfatto	Psicologico
233	Ogni cambiamento organizzativo prevede sempre:	Il coinvolgimento di tutti gli operatori	La negoziazione delle risorse necessarie al cambiamento	L'esecuzione degli ordini impartiti dal responsabile	L'ampliamento delle proprie responsabilità
234	Nell'assistenza domiciliare a un soggetto anziano disidratato, l'OSS consiglia di:	Bere regolarmente, soprattutto acqua, anche se non ha sete	Mantenere la cute elastica con creme idratanti	Mangiare soprattutto verdura, pane integrale, minestrone	Bere sporadicamente e lontano dai pasti
235	Quando per un paziente è prevista una dieta a basso residuo di scorie si deve evitare:	Contorni a base di verdure	Yogurt	Un secondo a base di carne	Oli e grassi in genere
236	I rifiuti taglienti si smaltiscono:	In un contenitore rigido posto successivamente nel sacco dei rifiuti speciali	In un contenitore rigido posto successivamente nel sacco dei rifiuti urbani	Direttamente nel sacco dei rifiuti speciali da inviare all'inceneritore	Nei contenitori dei rifiuti tossici e nocivi
237	A un paziente con sondino nasogastrico si:	Può far assumere cibo e acqua sia con il sondino sia per os	Deve far assumere acqua e cibo solo attraverso il sondino	Deve far assumere il cibo solo attraverso il sondino	Può far assumere acqua anche per os
238	Il lavaggio sociale delle mani è corretto:	Prima di fare i letti	Prima di eseguire una medicazione	Dopo aver vuotato i sacchetti delle urine	Prima di collaborare all'inserimento di un catetere vescicale
239	L'accudimento della persona in RSA può essere affidato all'OSS dopo valutazione del:	Coordinatore infermieristico/infermiere responsabile	Responsabile medico di distretto	Educatore professionale	La cooperativa appaltatrice
240	Il primo soccorso è:	L'aiuto prestato a una persona coinvolta in un incidente o colta da malore in attesa di personale qualificato	L'intervento immediato che mira a risolvere problemi di salute urgenti	L'intervento di personale sanitario in ambito ospedaliero	L'intervento svolto da personale sanitario in tutto il territorio di loro riferimento assegnato

241	La posizione in letto che più favorisce l'espansione della gabbia toracica nell'anziano è:	Posizione seduta	Decubito laterale con sostegno di cuscini	Posizione supina con gambe flesse	Decubito laterale destro
242	"_____ " è una responsabilità attribuibile all'OSS.	La medicazione di lesioni cutanee	La somministrazione di ossigeno	La somministrazione della terapia intramuscolare	L'inserimento del sondino nasogastrico
243	A livello ascellare il termometro deve rimanere in sede "___" minuti.	9	2	15	3
244	"_____ " influenza la defecazione.	Tutte le altre risposte sono corrette	La quantità dei liquidi assunti nelle 24 ore	La qualità degli alimenti	I fattori psicologici
245	Indicare l'affermazione corretta.	La frutta dovrebbe essere mangiata 3 porzioni al giorno, in qualsiasi momento della giornata	La carne andrebbe mangiata almeno una volta al giorno	Il formaggio dovrebbe completare ogni pasto	Il pesce non va mangiato più di una volta la settimana
246	Nelle funzioni dell'OSS sono comprese:	Tutte le attività di base rivolte alla persona	Le attività sociali di animazione	Tutte le mansioni che non comportano contatti con la persona	Le attività di socializzazione precedentemente proprie dell'educatore
247	Nell'anziano si può incrementare l'apporto proteico aggiungendo:	Carne, pesce, prosciutto alla minestra	Zucchero alla frutta cotta	Integratori alle bibite	Latte sgrassato alla colazione
248	Se si mobilita una persona allettata passando dalla posizione supina a quella seduta o semiseduta in letto si:	Migliora l'espansione toracica della persona	Favorisce il ritorno del sangue venoso al cuore	Aiuta la persona a soddisfare il bisogno di eliminazione fecale	Aiuta la persona a soddisfare il bisogno di eliminazione urinaria
249	Prima di trasportare l'assistito in sala operatoria di deve verificare che la:	Tutte le altre risposte sono corrette	Persona non abbia smalto sulle unghie delle mani	Cartella clinica segua l'assistito	Persona abbia indossato il camice
250	Nel caso in cui l'infermiere chieda aiuto per gestire la somministrazione dei farmaci agli assistiti, l'OSS può:	Aiutare l'assistito ad assumere il farmaco per via orale	Aiutare l'assistito ad assumere il farmaco per via orale solo in presenza dell'infermiere	Effettuare l'iniezione sottocutanea in presenza dell'infermiere	Sorvegliare l'infusione avviata dall'infermiere
251	Il termometro si definisce "a massima" in quanto:	Il mercurio rimane fermo nel punto massimo di espansione che coincide con la massima temperatura corporea rilevata	Consente la "massima" rilevazione della temperatura corporea	Consente la massima precisione	Consente di valutare la temperatura corporea massima registrata dal paziente in giornata
252	"_____ " non condiziona la diuresi.	L'alterazione del ritmo sonno-veglia	L'introduzione dei liquidi	La temperatura ambientale	Il consumo di frutta
253	L'OSS può svolgere prestazioni informative a favore dell'utente:	Per gli ambiti di sua competenza	Solo se si trova a operare in ospedale	In nessun caso, in quanto sono di competenza infermieristica	In qualsiasi ambito operi
254	La mobilitazione passiva consiste:	Nel movimento di parti del corpo senza contrazione volontaria dei muscoli da parte del paziente	Nel movimento dell'utente a letto	Nel movimento di piedi, gambe, braccia con contrazione volontaria dei muscoli da parte del paziente	Nella ginnastica effettuata dal fisioterapista
255	La riduzione della diuresi può essere influenzata da:	Tutte le altre risposte sono corrette	Scarsa assunzione di liquidi	Profusa sudorazione	Ritenzione idrica
256	E' opportuno controllare il peso di un soggetto con problemi cardiaci (soggetto a edemi):	Con lo stesso abbigliamento e la stessa bilancia	Tutti i giorni al mattino a digiuno	Sempre a vescica vuota	Nessuna delle altre risposte è corretta
257	Nella posizione semiseduta la testata del letto deve essere sollevata a:	45°	30°	60°	90°
258	Il materasso "_____ " è più idoneo per la prevenzione delle lesioni da compressione.	Ad aria	Di pura lana	Di gommapiuma	Di prodotti biologici
259	"_____ " non è una complicanza dell'allettamento prolungato nell'anziano.	La gastrite	La tromboflebite	La polmonite	La decalcificazione ossea
260	L'infermiere ha assegnato i pazienti in coma alla coppia A di OSS e i pazienti con esiti di ictus alla coppia B di OSS. La registrazione dell'assistenza di base effettuata a questi due gruppi di pazienti deve essere svolta:	Per ambedue i gruppi dalle rispettive coppie di OSS	Dal coordinatore	Per la coppia che segue i pazienti in coma (coppia A) dall'infermiere, per la coppia che segue i pazienti con esiti di ictus (coppia B) dagli OSS	Per ambedue i gruppi dall'infermiere
261	La sudorazione eccessiva va controllata attentamente specialmente in:	Neonati e anziani	Persone adulte	Adolescenti	Persone disabili
262	La stipsi si ha quando le:	Evacuazioni avvengono meno di tre volte la settimana	Evacuazioni sono inferiori a una scarica al giorno	Feci sono dure	Feci non sono formate
263	"_____ " dà un particolare apporto di proteine.	Le frattaglie fresche	Il pane	I grassi da condimento	I dolci freschi
264	La postura più corretta in poltrona per evitare lo scivolamento del sacro è con la seduta:	Leggermente basculata indietro, schienale a 90°	Leggermente basculata in avanti	Parallela al terreno, schienale reclinato all'indietro di 20°	A 90°
265	"_____ " sono ricomprese nelle funzioni dell'OSS.	Le funzioni di ausiliario specializzato e OTA	Tutte le attività rivolte alla persona	Tutte le mansioni che non comportano contatti con la persona	Il comfort alberghiero e tutte le prestazioni non rivolte alla persona
266	In caso di emergenza, il polso non va rilevato:	Tutte le altre risposte sono corrette	A livello radiale	A livello tibiale	A livello apicale
267	Nella dieta iposodica non (indicare l'affermazione errata):	Aggiungere zucchero al caffè	Aggiungere sale all'insalata	Aggiungere sale all'acqua per la pasta	Assumere affettati
268	La "_____ " influenza la diuresi.	Tutte le altre risposte sono corrette	Ingestione di liquidi	Febbre	Diarrea
269	Sono effetti della contenzione fisica tutti i seguenti, eccetto:	Infezioni urinarie	Alterazione psichica	Abrasioni	Contratture
270	Le frizioni in zone del corpo arrossate:	Non devono essere attuate in alcun caso	Sono attuate su richiesta del paziente	Sono attuate per dare una sensazione di sollievo	Sono attuate per migliorare l'irrorazione capillare
271	Le zone a rischio per lesioni da compressione nella posizione laterale sono:	Orecchio, parte laterale della spalla, coste, trocantere, malleolo	Orecchio, tallone, trocantere, coste, ginocchio interno, vertebre	Malleolo interno, polpacci, sacro, spalla, orecchio, coste, guance	Dorso del piede e caviglia, ginocchio, trocantere, spalla, guance, orecchio

272	I parametri vitali devono essere registrati:	Sempre	Quando sono alterati rispetto alla norma	Su indicazione dell'infermiere	Quando sono alterati rispetto ai valori consueti della persona
273	"_____ " da\ danno un particolare apporti di glicidi.	Il pane e la pasta	Il pesce	La frattaglia fresca	I grassi da condimento
274	Gli impacchi freddi determinano:	Tutte le altre risposte sono corrette	Riduzione della circolazione sanguigna locale	Riduzione dell'ossigenazione della zona	Prevenzione della formazione di edemi
275	Nel posizionamento di una persona allettata l'OSS deve attuarlo:	In base ai protocolli del servizio	In base alle condizioni individuali dell'assistito	Secondo le indicazioni del fisioterapista	Nel rispetto dei bisogni della persona
276	La posizione di Trendelenburg consiste in:	Posizionare la testa più in basso delle gambe	Posizione semiseduta con gambe flesse	Posizionare la testa più in alto delle gambe	Nessuna delle altre risposte è corretta
277	La "compliance" del paziente è:	Il grado di adesione della persona assistita al programma terapeutico prescritto	La difficoltà da parte della persona assistita ad assumere i farmaci per os	La difficoltà da parte della persona assistita ad eseguire i farmaci intramuscolo	La difficoltà da parte del caregiver a seguire la persona assistita
278	L'OSS deve "_____ " per prevenire il rischio di cadute nell'anziano.	Predisporre un ambiente idoneo	Informare la persona	Educare la famiglia e favorire la sua vicinanza all'assistito	Coinvolgere il volontario
279	Dopo avere alimentato una persona, l'OSS deve riferire all'infermiere:	Risultato ottenuto e/o difficoltà incoronate	Quantità e qualità del pasto	Necessità di una dieta speciale	Presenza di protesi dentali
280	Per gli incidenti domestici, la zona maggiormente a rischio è:	La cucina	Il balcone o giardino	La camera da letto	Il bagno
281	In corso di ossigenoterapia:	La soluzione dell'umidificatore deve essere sterile	L'ossigeno va regolato fra 2 e 4 ml/orari	La mascherina va sostituita quotidianamente	La bombola deve essere sempre piena almeno per metà
282	Per prevenire e per trattare la stitichezza cronica è importante aumentare l'assunzione:	Di liquidi, frutta e verdura	Solo di liquidi	Solo di frutta	Solo di verdura
283	Il lavoro di équipe favorisce:	Il raggiungimento degli obiettivi	Il risparmio di risorse economiche	La valutazione dei superiori	La distribuzione di compiti
284	"_____ " sono le complicanze più frequenti nel paziente portatore di catetere vescicale.	L'infezione delle vie urinarie, la perdita di urina, le lesioni da decubito e i traumatismi uretrali	L'aritmia e l'anemia	Esclusivamente l'infezione delle vie urinarie e la perdita di urina	La dispnea e l'orchite
285	Per le persone che non si alimentano da sole, bisogna:	Fornire alla persona incoraggiamento e sostegno	Informare i familiari affinché venga portato del cibo da casa	Esortare con insistenza la persona ad assumere il cibo	Dire alla persona che verrà informato il medico del suo rifiuto del cibo
286	La prolungata immobilizzazione provoca nel sistema osteo-articolare:	Rigidità	Osteoporosi	Calcificazione	Ipertonia muscolare
287	L'infermiere può avvalersi dell'OSS per garantire la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche per l'effettuazione:	Di rilevazione della temperatura corporea	Di fleboclisi	Di prelievi ematici	Dell'inserimento del catetere
288	Indicare il suggerimento non adeguato nella dieta iposodica:	Non aggiungere zucchero al caffè	Non aggiungere sale all'insalata	Non aggiungere sale all'acqua per la pasta	Non aggiungere sale sulla carne
289	Gli obiettivi dell'aspirazione delle vie aeree sono:	Rimuovere le secrezioni, liberare le vie aeree, aumentare la ventilazione respiratoria, diminuire la frequenza respiratoria, aumentare l'ossigenazione tissutale	Favorire un aumento dell'apporto di ossigeno in un distretto corporeo	Aumentare la frequenza cardiaca, aumentare la frequenza respiratoria, liberare le vie aeree, aumentare la ventilazione respiratoria	Favorire un aumento della frequenza respiratoria
290	Per valutare lo stato di coscienza in una persona caduta a terra si:	Chiama a voce alta e si scuote per le spalle	Scuote per vedere le sue reazioni	Controlla lo stato delle pupille	Danno dei pizzicotti sulle braccia e si chiama
291	Per salvaguardare la sicurezza dell'OSS, è consigliabile:	Tutte le altre risposte sono corrette	Indossare calzature allacciate con calzini	Effettuare una doccia all'uscita dal servizio	Lavare le mani all'ingresso e all'uscita dal servizio
292	L'ortesi è un presidio:	Ortopedico per compensare funzioni dell'apparato locomotore	Ortopedico per garantire un'adeguata autonomia al paziente	Ortopedico per sostituire organi e parti mancanti	Per disabili
293	Un accoglimento organizzato della persona in una struttura garantisce:	L'efficace inserimento dell'ospite nel servizio	L'identificazione da parte dell'assistito delle funzioni degli operatori	L'organizzazione delle cure mediche	L'organizzazione delle cure infermieristiche e di base
294	"_____ " può condizionare la defecazione.	L'idratazione	La difficoltà a comunicare	La temperatura ambientale	L'alterazione del ritmo sonno-veglia
295	Una buona pulizia perinale contribuisce a:	Prevenire le infezioni	Migliorare l'aspetto fisico	Favorire una corretta diuresi	Migliorare la termogenesi
296	Le zone a rischio per lesioni da compressione in posizione supina sono:	Scapola, sacro, talloni, gomiti	Orecchio, sacro, tallone, gomiti	Nuca, sacro, talloni, trocantere	Trocantere, sacro, malleolo interno
297	In un anziano disfagico, durante il pasto, è indicato controllare la comparsa di:	Tosse	Voce gorgogliante	Pallore	Tachicardia
298	In presenza di traumi vertebrali per spostare il paziente bisogna:	Fare la manovra in 3-4 soccorritori, mantenendo la colonna in posizione orizzontale	Valutare prima la sensibilità e la funzione motoria degli arti superiori e inferiori	Non mettere in posizione laterale e seduta	Applicare un tutore per qualsiasi spostamento, così da mantenere in allineamento le parti del corpo
299	Quando la persona non è presente, il pasto va:	Conservato in frigorifero in appositi contenitori	Rimandato in cucina centrale	Lasciato sul comodino avendo cura di coprire i piatti	Conservato in cucina in contenitori coperti
300	Un'alimentazione equilibrata in una persona sana deve essere:	Normocalorica e variata	Normocalorica e ricca di lipidi	Normocalorica e ricca di proteine	Ipercalorica con prevalenza di glicidi
301	La contenzione fisica può essere prevista nel caso il paziente:	Non sappia gestire autonomamente la propria incolumità	Sia interdetto	Sia privo di coscienza	Sia privo di parenti
302	Gli atti respiratori si rilevano:	Quando la persona è a riposo	Dopo aver deambulato	In base alle indicazioni del medico	In qualsiasi momento della giornata e attività
303	Dopo un pasto abbondante a base di pane, i prodotti finali più rilevanti che provengono dalla digestione sono:	Monosaccaridi	Polisaccaridi	Anidride carbonica e acqua	Tetrasaccaridi

304	" _____ " da un particolare apporto di lipidi.	Tutte le altre risposte sono corrette	Il lardo	L'olio di oliva	Il pomodoro
305	" _____ " è un sintomo\segno tipico della lipotimia.	Il pallore	Il colorito cianotico	Il colpo di sole	L'ipercromatosi
306	" _____ " è la zona più a rischio per la formazione delle lesioni da pressione.	Il sacro	Il ginocchio interno	La scapola	Il piede
307	Gli impacchi caldi provocano:	Aumento del flusso ematico	Riduzione del flusso ematico	Crampi	Vasocostrizione
308	Il vomito durante la gravidanza:	Ha causa multifattoriale	E' normalmente ematico	E' normalmente biliare	Tutte le altre risposte sono corrette
309	" _____ " è un contraccettivo di barriera.	Tutte le altre risposte sono corrette	Il profilattico	Il diaframma	Lo IUD
310	" _____ " può favorire il sonno notturno di una persona.	Regolare la temperatura della stanza fra i 22 e i 24 °C	Alla sera dopo cena, leggere un libro	Alla sera somministrare un pasto leggero	Alla sera dopo cena, guardare la televisione
311	" _____ " sono le principali funzioni dell'OSS.	Assistenza diretta e aiuto domestico\alberghiero, intervento igienico sanitario e di carattere sociale, supporto gestionale, organizzativo e formativo	Assistenza indiretta, intervento igienico e di carattere sociale, supporto gestionale, organizzativo e formativo, aiuto domestico	Assistenza diretta, intervento igienico, supporto gestionale, organizzativo e formativo, aiuto domestico	Assistenza diretta e aiuto ospedaliero, intervento a carattere sociale e supporto terapeutico, supporto gestionale, organizzativo e formativo
312	Nell'eliminazione in letto è appropriato:	Non tenere la persona sulla padella più del necessario	Mostrare all'infermiere il materiale raccolto in padella	Agire sempre in due operatori	Posizionare la persona semiseduta
313	" _____ " non è necessario per eseguire un bagno a letto.	Il disinfettante	L'asciugamano	Il detergente	La manopola monouso
314	Quando si allaccia un camice sterile in sala operatoria si:	Deve toccare solo con la parte interna	Deve toccare solo la parte esterna	Devono usare guanti sterili	Devono usare guanti monouso e poi sotituirli
315	Individuare quale affermazione non è corretta.	TAC: Tomografia Assiale Comparativa	EEG: Elettroencefalografia	DSA: Disturbi Specifici di Apprendimento	VES: Velocità di Eritrosedimentazione
316	Lo stato funzionale di una persona si può valutare:	Con l'impiego di scale di valutazione specifiche	Esclusivamente con l'osservazione della persona assistita	Con la percezione della persona assistita	Esclusivamente con la scala di Norton
317	Nello svolgimento di un esame invasivo, l'OSS può:	Tutte le altre risposte sono corrette	Collaborare col medico nelle manovre	Preparare il materiale	Controllare le reazioni della persona
318	Lo stimolo alla minzione è dato da:	Dilatazione delle pareti della vescica	Incremento di liquidi in circolo	Variazioni della postura	Filtrazione renale
319	Indica l'affermazione errata.	L'uso dei guanti non sterili evita il lavaggio delle mani	Occorre indossare i guanti sterili per il tempo strettamente necessario	Occorre indossare i guanti non sterili per il tempo strettamente necessario	Occorre cambiare i guanti non sterili con la stessa frequenza con cui si lavano le mani
320	L'ipotensione ortostatica si può presentare quando la persona:	Allettata da molto tempo, si alza in piedi	Esegue uno sforzo eccessivo	Malata viene fatta alzare in piedi	Malata si corica
321	Con " _____ " è obbligatorio indossare i guanti.	I pazienti per i quali vi è rischio di contatto con materiale biologico	Tutti i pazienti contagiosi	Tutti i pazienti infetti	I pazienti che hanno malattie trasmissibili per via aerea
322	" _____ " può maggiormente aiutare l'assistito ad accettare la perdita della propria indipendenza a causa di una malattia.	Il coinvolgere la persona nella cura di sé, aiutandola a valorizzare le proprie risorse	Il sostituirsi alla persona con tatto e gentilezza nelle attività che non è in grado di compiere	Il far sì che la persona possa ricercare da sola la soluzione più adeguata ai suoi problemi	Il rieducare la persona all'indipendenza, in modo graduale ma con modi decisi
323	Le linee guida dell'Istituto nazionale della nutrizione, a garanzia di una sana ed equilibrata alimentazione, raccomandano di:	Tutte le altre risposte sono corrette	Mantenere nei limiti il peso corporeo	Controllare l'assunzione di zuccheri e dolci	Limitare l'assunzione di grassi e colesterolo
324	La professionalità deve includere:	La persona, l'organizzazione e il ruolo	Il carattere della persona	Esclusivamente l'organizzazione	Esclusivamente la persona
325	Le calze antitrombo vengono utilizzate per:	Ridurre l'incidenza di trombosi venosa profonda	Mantenere più calda la cute dell'utente	Ridurre l'incidenza di lesioni da pressione	Conservare una buona tonicità muscolare
326	Le conseguenze di un prolungato allettamento si riflettono su diversi organi e apparati, eccetto:	Stomaco	Cuore	Apparato circolatorio	Apparato muscolo-scheletrico
327	L'assunzione di posture scorrette e gli sforzi eccessivi da parte dell'operatore durante l'attività di mobilizzazione è causa di patologie a carico:	Della colonna vertebrale, del ginocchio, della spalla	Del bacino, del ginocchio, della spalla	Della colonna vertebrale, del bacino, della spalla	Della spalla, del braccio, del ginocchio
328	" _____ " non è un segno o sintomo di emorragia esterna.	La diminuzione della frequenza cardiaca e aumento della pressione arteriosa	Il rigonfiamento dell'area della lesione	La tensione e indurimento della zona lesa, percettibile alla palpazione	La diminuzione della pressione arteriosa e segni di contusione (ematoma)
329	" _____ " non è un segno o sintomo di frattura.	L'assenza di dolore	Il gonfiore	L'impotenza funzionale	La deformazione della zona colpita
330	" _____ " non sono inclusi tra i mezzi di contenzione.	I bracciali che impediscono la flessione del braccio durante un'infusione venosa, dispositivi di allarme al letto e alle porte, spondine che proteggono metà o tre quarti del letto	I bracciali per polsi e caviglie, cinture di sicurezza per il letto, bracciali che impediscono la flessione del braccio durante un'infusione venosa	La cintura per carrozzina o sedia, bracciali per caviglie, spondine che proteggono metà o tre quarti del letto	I bracciali per caviglie e dispositivi di allarme al letto e alle porte
331	Sono da considerarsi favorevoli all'organismo temperature tra i:	18 e i 20 °C	20 e i 22 °C	15 e i 20 °C	17 e i 21 °C
332	La resistenza al cambiamento è una:	Reazione emotiva e/o comportamentale a fatti reali o immaginari che minacciano lo status quo	Diminuzione delle risorse economiche su cui è basata l'organizzazione	Diminuzione delle risorse umane su cui è basata l'organizzazione	Reazione comportamentale psicologica agli agenti stressanti
333	L'assistenza funzionale è contraddistinta dalla:	Assegnazione dei compiti agli operatori componenti l'équipe assistenziale	Alta professionalità degli operatori componenti l'équipe assistenziale	Composizione multidisciplinare degli operatori dell'équipe assistenziale	Personalizzazione dell'assistenza a cura case-manager
334	Il modello del Case Management si sviluppa:	Nessuna delle altre risposte è corretta	Nei settori di area critica	Nei settori di area critica per indirizzare le persone con bisogni sociali	Nel settore delle cure domiciliari oncologiche
335	Tra le attività previste per l'operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria vi è la rilevazione e l'annotazione di frequenza:	Cardiaca, frequenza respiratoria, temperatura	Cardiaca, frequenza respiratoria, pressione arteriosa	Cardiaca, temperatura, pressione arteriosa	Respiratoria, temperatura, pressione arteriosa

336	Le medicazioni " _____ " possono essere affidate all'OSS.	Tutte le altre risposte sono corrette	Di lesioni da compressione al I stadio	Di ferite chirurgiche prive di sutura e cicatrizzate	Di lesioni da compressione II stadio
337	Attribuire il corretto ordine cronologico alle seguenti operazioni concernenti la procedura di assistenza assunzione farmaci: 1) Attuare la prescritta modalità di preparazione del farmaco 2) Aiutare il paziente all'assunzione del farmaco e fargli assumere una posizione consona all'azione da svolgere, prestando particolare attenzione ai soggetti con disfagia 3) Identificare il paziente e informarlo della procedura 4) Lavarsi le mani	4-3-1-2	2-1-3-4	3-2-4-1	1-2-3-4
338	Attribuire la corretta sequenza cronologica alle seguenti operazioni concernenti la procedura di cure igieniche in bagno (dopo aver già informato il paziente, essersi lavati le mani e aver indossato i guanti monouso): 1) Permettere all'assistito tutto ciò che riesce a fare da solo, aiutandolo, e all'occorrenza, vigilando sulla sua sicurezza. Là dove è possibile, salvo controindicazioni, rispettare sempre le sue abitudini 2) Fargli indossare la biancheria scelta aiutandolo se necessario 3) Sollevare l'assistito e accompagnarlo in bagno dopo aver controllato l'adeguatezza del microclima 4) A igiene conclusa, nel momento in cui si esce dal bagno, aiutare la persona a raccogliere le proprie cose 5) Riaccompagnare il paziente alla propria unità riordinata, accostandogli il comodino e il sistema di chiamata 6) Cooperare con l'assistito all'igiene del viso (orecchie, naso e occhi), denti, collo, mani, ascelle, torace, schiena e igiene intima 7) Far sedere il paziente sulla sedia dopo averla protetta con una traversa, davanti al lavandino 8) Togliersi i guanti e lavarsi le mani	3-7-1-6-2-4-8-5	5-6-3-2-1-8-4-7	3-6-5-1-2-8-4-7	3-6-2-54-7-1-8
339	Indicare la corretta sequenza cronologica alle seguenti operazioni concernenti la procedura di assistenza al paziente in caso di vomito nel caso di paziente vigile: 1) Supportare l'assistito nell'igiene personale e della bocca 2) Aiutare la persona a cambiare gli indumenti se necessario 3) Togliersi i guanti, igienizzarsi le mani, indossare guanti puliti 4) Pulire a terra se necessario o avvisare chi di competenza 5) Procurarsi rapidamente una bacinella e i teli per proteggere il letto e l'assistito 6) Cambiare la biancheria del letto, se sporca 7) Controllare l'aspetto e la quantità del vomito 8) Invitare la persona a stare tranquilla e a fare respiri profondi possibilmente dal naso 9) Nel caso in cui il paziente abbia una ferita chirurgica, contenere la ferita durante i conati di vomito 10) Se il paziente non può stare seduto posizionarlo su un fianco	5-10-8-9-7-1-3-2-6-4	10-2-1-8-9-4-5-7-6-3	4-9-7-5-3-1-10-2-6-8	4-9-7-1-3-5-10-2-6-8

340	<p>Indicare la corretta sequenza cronologica alle seguenti operazioni concernenti la procedura di gestione dei disinfettanti, con particolare riferimento alla disinfezione dei presidi sanitari e dispositivi medici:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Detergere il presidio 2) Disinfettare, accertandosi sempre riguardo all'appropriatezza del disinfettante, della concentrazione e del rispetto dei tempi 3) Lasciare asciugare lentamente, o impiegare carta monouso, i presidi sanitari e le superfici ambientali (unità dell'assistito, padella, catino ecc.) 4) Risciacquare 5) Risciacquare con acqua sterile i dispositivi medici semicritici (laringoscopio, cannula tracheostomica, endoscopio) e con acqua corrente\distillata quelli non critici (termometro) 6) Proteggersi con i DPI 7) Asciugare con accuratezza 	6-1-4-7-2-3-5	3-2-6-5-1-7-4	6-1-5-7-3-2-4	5-1-7-6-2-4-3
341	<p>Indicare la corretta sequenza cronologica alle seguenti operazioni concernenti la procedura di lavaggio e preparazione del materiale per la sterilizzazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Asciugare il materiale 2) Dopo l'uso, immergere i dispositivi riutilizzabili nella soluzione decontaminante e lasciarli in immersione secondo le indicazioni della ditta produttrice del prodotto 3) Provvedere al trasporto presso la centrale di sterilizzazione 4) Indossare i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) 5) Registrarlo nella bolla di accompagnamento alla centrale di sterilizzazione 6) Sciacquare in acqua corrente ed eseguire le operazioni di lavaggio con detergente enzimatico (qualora non fosse previsto il lavaggio automatico in centrale di sterilizzazione) 7) Preparare la soluzione decontaminante 8) Controllare che sia pulito, integro, funzionante e riporlo nelle apposite buste 	4-7-2-6-1-8-5-3	6-8-2-3-4-5-1-7	7-5-4-8-3-2-6-1	7-8-5-4-3-6-1-2

342	<p>Indicare la corretta sequenza cronologica alle seguenti operazioni concernenti la procedura di somministrazione del cibo e assistenza ai pasti nel caso di paziente parzialmente autosufficiente e costretto a letto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Spiegare quali alimenti si stanno offrendo 2) Verificare lo stato del cavo orale con o senza protesi dentaria 3) Compiere tutte le azioni utili a favorire il riposo postprandiale 4) Consentire al malato di assumere una posizione comoda, alzando la testata del letto o servendosi dei cuscini 5) Porgere all'assistito tutto l'occorrente per le cure igieniche del cavo orale 6) Posizionare il tavolino ad altezza dell'assistito, sistemandogli il vassoio a portata di mano 7) Rimuovere i residui alimentari e provvedere alla pulizia delle posate 8) Aiutare il paziente a lavarsi le mani 9) Fare in modo da rendere il momento del pasto il più piacevole possibile 10) Scoprire i piatti, aprire i contenitori e assistere la persona secondo le sue condizioni 	4-8-2-6-10-1-9-5-7-3	5-7-3-10-1-4-2-8-6-9	8-3-1-2-6-9-4-10-7-5	Nessuna delle altre risposte è corretta
343	<p>Indicare la corretta sequenza cronologica alle seguenti operazioni concernenti la procedura di lavaggio sociale delle mani dell'operatore:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Frizionare accuratamente le mani per almeno 40 secondi, con particolare attenzione per gli spazi interdigitali, i palmi, i dorsi, i polsi e gli avambracci 2) Nel caso in cui il lavandino fosse sprovvisto di rubinetto a gomito o a pedale, chiuderlo con la salvietta già adoperata per l'asciugatura 3) Raccogliere nell'apposito distributore la necessaria quantità di sapone liquido (attenendosi alle indicazioni fornite dalla Ditta produttrice) 4) Accertarsi di essersi asciugati completamente con le salviette di carta monouso, tamponando per non irritare la cute 5) Bagnare mani e avambracci con l'acqua 6) Smaltire la salvietta utilizzata gettandola nell'apposito cestino 7) Risciacquare con acqua corrente, badando di tenere sempre le mani più in alto dei gomiti (ad opportuna distanza dalla divisa) 	5-3-1-7-4-2-6	3-5-1-2-4-7-6	4-5-3-7-1-6-2	3-7-1-2-6-5-4
344	<p>Mettere in ordine la procedura di assistenza di valutazione del paziente con dolore:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Valutare la percezione del dolore nel paziente 2) Se necessario, controllare le parti del corpo dolenti 3) Lavarsi le mani 4) Valutare la risposta fisiologica al dolore. Annotare la pressione sanguigna, la frequenza cardiaca e respiratoria, il colorito della cute e la presenza di diaforesi 5) Provvedere alla riservatezza del paziente 6) Documentare le rilevazioni effettuate per l'accertamento del dolore, includendo gli interventi eseguiti e la risposta del paziente 	3-5-1-4-2-6	4-2-5-1-3-6	3-1-2-6-5-4	1-2-5-4-3-6

345	<p>Indicare la corretta sequenza cronologica alle seguenti operazioni concernenti la procedura di lavaggio antisettico delle mani:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Risciacquare le mani e i polsi con abbondante acqua corrente e asciugare adeguatamente tamponando le zone interessate con salviette monouso 2) Nel caso in cui il lavandino fosse sprovvisto di rubinetto a gomito o a pedale, chiudendo con una delle salviette già adoperate 3) Bagnare con acqua le mani e i polsi 4) Smaltire le salviette utilizzate gettandole nell'apposito cestino 5) Applicare alle mani quantità di antisettico raccomandata dalla ditta produttrice e frizionare vigorosamente le mani fra loro per almeno un minuto, coprendo l'intera superficie delle mani stesse e delle dita con particolare attenzione agli spazi interdigitali, le estremità delle dita e la zona periungueale 	3-5-1-2-4	3-4-1-2-5	2-5-1-4-3	2-3-5-4-1
346	<p>Indicare la corretta sequenza cronologica alle seguenti operazioni concernenti la procedura di svuotamento della sacca per la raccolta delle urine (dopo aver già sistemato il materiale su un carrello pulito, aver informato il paziente, essersi lavate le mani ed aver indossato i guanti monouso):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sollevare la sacca sterile e aprire il rubinetto 2) Richiudere il rubinetto e riposizionarlo nell'apposito dispositivo di raccolta 3) Prendere visione della quantità di urine 4) Applicare la sacca nell'apposito supporto 5) Eliminare le urine, considerando eventuali raccolte diuresi nelle 24 ore 6) Registrare e riferire 7) Riaprire il circuito del catetere vescicale 8) Posizionare il contenitore per la raccolta delle urine o la sacca a terra, raccordata al rubinetto della sacca sterile 9) Togliersi i guanti e levarsi le mani 10) Chiudere il circuito della sacca 	3-10-8-1-2-4-7-5-9-6	4-3-2-5-6-8-1-10-7-9	8-9-5-6-2-1-10-7-3-4	10-3-2-7-4-8-5-6-1-9

347	<p>Indicare la corretta sequenza cronologica alle seguenti operazioni concernenti la procedura dello spostamento di un paziente nel letto in posizione laterale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Valutare il livello di dolore del paziente durante gli spostamenti 2) Posizionare tutti i dispositivi e i tubi in modo sicuro 3) Controllare la presenza di tubi o dispositivi che potrebbero essere d'ostacolo o tirati o dislocati durante lo spostamento del paziente 4) Arrotolare la traversa quanto più vicino al corpo del paziente e togliergli il lenzuolo 5) Mentre si fa scivolare il paziente verso di sé, spostare il peso del proprio corpo dal piede più vicino al letto sull'altro piede, tenendo un piede in avanti e uno all'indietro 6) Lavarsi le mani e seguire le precauzioni standard 7) Girare il paziente verso di sé, spostando il peso del proprio corpo dal piede antistante su quello retrostante 8) Determinare il grado di assistenza richiesto dal paziente, valutandone: capacità di movimento, forza, mobilità, condizioni cliniche, peso, capacità e volontà di seguire le istruzioni 9) Per evitare fratture del paziente, non riposizionarlo direttamente sul femore o sulla spalla sottostante, ma spostare leggermente in avanti l'anca e la spalla del paziente 10) Porre una mano sulla spalla del paziente e l'altra sul bacino 	8-3-2-1-6-4-5-10-7-9	6-4-5-10-7-9-8-3-2-1	5-10-7-9-6-4-1-2-3-8	4-1-2-3-8-5-10-7-9-6
348	<p>Indicare la corretta sequenza cronologica alle seguenti operazioni concernenti la procedura dell'applicazione di calze elastiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lavare e asciugare le gambe e idratare la cute del paziente 2) Mettere il paziente in posizione supina almeno 30 minuti prima dell'applicazione 3) Lavarsi le mani e seguire le precauzioni standard 4) Tirare la calza lungo la gamba fino a che non sia completamente srotolata 5) Controllare che non ci siano grinze o pieghe all'estremità della calza che possano limitare la circolazione a livello dell'arto inferiore 6) Iniziare ad arrotolare la calza tirando all'interno e all'esterno in direzione della zona della caviglia 7) Misurare la lunghezza di entrambe le gambe dal tallone alla zona poplitea per le calze al ginocchio, misurare la circonferenza di entrambi i polpacci e le cosce 8) Arrotolare la parte restante della calza sulla caviglia 9) Assicurarsi che il supporto per l'interno coscia sia posizionato sull'interno coscia del paziente 10) Mantenendo la calza ai due lati della regione della caviglia, posizionarla sulle dita del piede e sul tallone del paziente 11) Assicurarsi che la calza non sia troppo stretta sulla punta delle dita dei piedi 	3-1-2-7-6-10-8-4-9-5-11	4-1-2-3-8-5-10-7-9-6-11	7-6-10-8-3-1-2-4-9-5-11	8-4-9-5-11-3-1-2-7-6-10

349	Indicare l'ordine della procedura per la raccolta dell'espettorato per coltura: A) Far inalare profondamente e far tossire il paziente, se il paziente produce espettorato farlo sputare nel contenitore B) Posizionare il paziente in posizione semi-fowler, far tossire e soffiare il naso al paziente e lavare la bocca C) Effettuare il lavaggio delle mani ed indossare guanti e occhiali D) Identificare il paziente, informarlo e spiegargli la procedura, preparare il materiale, garantire la privacy E) Chiudere il coperchio del contenitore e aiutare il paziente nell'igiene orale, rimuovere guanti ed occhiali, effettuare il lavaggio delle mani, etichettare il campione ed inviarlo in laboratorio	D-C-B-A-E	E-A-B-C-D	D-C-E-B-A	A-E-B-D-C
350	Indicare la corretta sequenza cronologica alle seguenti operazioni concernenti la procedura di aiuto nella deambulazione (paziente già fornito di presidio indicato dal fisioterapista): 1) Riaccompagnare l'assistito nella sua camera 2) Sostenere l'assistito al livello del braccio libero. In caso di paziente emiplegico, porsi dal lato plegico 3) Non affaticare il paziente 4) Accertarsi che le scarpe siano ben chiuse e allacciate 5) Aiutare il paziente a sedersi sulla poltrona o sul letto 6) Prevedere delle pause 7) Far guardare il paziente dritto davanti a sè	4-7-2-6-3-1-5	1-3-2-4-7-6-5	3-2-1-4-5-6-7	2-6-3-1-4-7-5
351	Indicare l'ordine della tecnica di rilievo del polso periferico. A) Selezionare il sito periferico più appropriato in base ai dati accertati, esporre il sito individuato B) Posizionare indice, medio e anulare sopra l'arteria, comprimere leggermente l'arteria in modo da poter percepire e contare le pulsazioni C) Coprire l'utente ed aiutarlo ad assumere una posizione confortevole; eseguire il lavaggio delle mani D) Identificare la persona, garantire la privacy, eseguire il lavaggio delle mani E) Utilizzando un orologio da polso con i secondi, contare il numero delle pulsazioni percepite per 30 secondi; moltiplicare il risultato per due calcolando così la frequenza di un minuto; qualora la frequenza fosse irregolare contare le pulsazioni per uno o più minuti di seguito	D-C-A-B-E	E-B-A-C-D	C-A-B-E-D	B-E-A-C-D
352	Mettere in ordine la procedura di assistenza ad un paziente nell'uso del pappagallo. 1) Posizionare il pappagallo tra le gambe del paziente 2) Tirare la tenda intorno al letto o chiudere la porta della stanza e indossare guanti monouso 3) Sciacquare il pappagallo e riportarlo al letto del paziente 4) Rimuovere il pappagallo	2-1-4-3	1-3-2-4	2-4-1-3	3-2-1-4

353	<p>Mettere in ordine la procedura di assistenza al paziente che necessita della padella per evacuare.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Far mettere supino il paziente, mantenendo la padella in posizione 2) Lavarsi le mani 3) Mettere un lenzuolo per coprire il paziente 4) Riscaldare la padella lavandola con acqua calda, asciugarla esternamente e posizionarla ai piedi del letto o su di una sedia adiacente 5) Per i pazienti che non possono sollevare il bacino, piegare la biancheria da letto fino alle anche 6) Rimuovere la padella tenendola con una mano per evitare di versarne il contenuto 7) Assistere il paziente nell'assunzione la posizione laterale 8) Spiegare al paziente come può collaborare 9) Garantire la privacy del paziente 10) Posizionare la padella con la parte aperta verso i piedi del letto 11) Fornire al paziente la carta igienica, abbassare l'altezza del letto, alzare una sponda ed assicurarsi della vicinanza del campanello 12) Provvedere all'eliminazione degli odori sgradevoli dalla stanza 	4-8-2-9-5-7-10-1-3-11-6-12	1-3-11-6-12-2-9-5-7-10-4-8	11-6-12-2-9-5-7-10-4-3-8-1	5-7-10-4-8-11-6-12-2-9-3-1
354	<p>Mettere in ordine la procedura di assistenza al paziente che necessita di padella o pappagallo per la minzione.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Provvedere alla riservatezza del paziente 2) Assistere il paziente nell'uso del pappagallo o della padella, facendolo posizionare autonomamente se il paziente è in grado 3) Lavarsi le mani ed osservare le procedure per il controllo delle infezioni 4) Togliere e gettare i guanti. Lavarsi le mani 5) Controllare l'urina ove richiesto 6) Assistere il paziente durante la rimozione del dispositivo, asciugare il meato urinario, asciugare il perineo, cambiare la biancheria da letto o la traversa qualora bagnate 	3-1-2-6-5-4	1-3-5-4-2-6	4-2-5-1-3-6	1-2-5-4-3-6
355	<p>Indicare la corretta sequenza cronologica alle seguenti operazioni concernenti la procedura di lavaggio delle mani dell'assistito (dopo aver già informato il paziente, essersi lavate le mani e indossato i guanti monouso):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Riordinare il materiale 2) Tagliare le unghie secondo la volta della persona 3) Asciugarle con cura e limarle 4) Togliersi i guanti e lavarsi le mani 5) Togliere eventuale smalto poichè il letto ungueale pulito agevola l'osservazione del colorito e un corretto uso del saturimetro 6) Risciacquarle adeguatamente 7) Bagnare le mani 8) Insaponare le mani e spazzolare le unghie 	5-2-7-8-6-3-1-4	3-8-5-4-7-6-1-2	6-5-2-7-8-4-3-1	6-5-3-4-2-1-7-8
356	Quali sono le possibili fonti di infezione?	L'uomo, gli animali e l'ambiente	Solo gli animali	Solo l'ambiente	Gli ospedali
357	L'OSS esplica il suo mandato attraverso l'attuazione di attività affidate secondo il criterio:	dell'attribuzione	dell'assunzione	della delega	del mandato
358	Il lavaggio preoperatorio delle mani è un tipico esempio di:	asepsi chirurgica	asepsi medica	nessuna delle altre risposte è corretta	asepsi sociale

359	Maslow nella teoria motivazionale dei bisogni sostiene che:	vengono inizialmente soddisfatti i bisogni primari e successivamente quelli di ordine superiore	vengono inizialmente soddisfatti i bisogni di ordine superiore e successivamente quelli primari	i bisogni non possono essere soddisfatti in autonomia, ma con l'aiuto di un professionista esterno	i bisogni hanno movimento circolare e tendono sempre a restare insoddisfatti
360	Indicare la pratica errata per evitare le infezioni alle vie urinarie.	Eseguire l'igiene perineale in senso postero-anteriore	Eseguire l'igiene perineale in senso antero-posteriore	indossare biancheria intima di cotone e abbigliamento non oppressivo	Assumere almeno 1500 ml di liquidi al giorno
361	La scala di Tinetti valuta:	l'andatura e l'equilibrio	le ulcere da pressione	l'autosufficienza	la capacità della persona di alimentarsi
362	_____ NON è un modello di erogazione dell'assistenza.	Il nursing efficace	Il primary nursing	La piccola équipe	Il nursing funzionale
363	Indica le caratteristiche delle scale di valutazione.	Semplicità, affidabilità, comprensibilità	Difficoltà, affidabilità, comprensibilità	Semplicità, affidabilità, complessità	Semplicità, confondibilità, comprensibilità
364	Il rischio per la movimentazione manuale di carichi è compreso nel rischio:	ergonomico	fisico	chimico	biologico
365	[Identifica la sequenza corretta sulla "rilevazione della frequenza respiratoria"] 1. Appoggiare una mano sul torace e osservare e/o sentire il compimento di un atto respiratorio che è formato da due momenti, insirazione ed espirazione 2. Togliere i guanti 3. Indossare i guanti 4. Contare, guardando l'orologio, il numero degli atti respiratori compiuti in un minuto (frequenza), osservando anche lo sforzo necessario a compierli (qualità), la regolarità dei medesimi (ritmo) e le caratteristiche dei movimenti della gabbia toracica (profondità) 5. Verificare quale attività stava compiendo la persona ed eventualmente attendere qualche minuto prima di procedere alla misurazione del respiro	3-5-1-4-2	5-3-4-2-1	2-4-1-3-5	3-1-4-2-5
366	Per caduta si intende:	un improvviso, non intenzionale, inaspettato spostamento verso il basso dalla posizione ortostatica	un improvviso e inaspettato spostamento causato da una spinta ad opera di malintenzionati	un improvviso e aspettato spostamento verso un lato	uno spostamento cosciente verso il basoo
367	L'operatore sanitari indossa gli occhiali di protezione per proteggere:	gli occhi da possibili contaminazioni da materiale biologico	gli occhi da possibili contaminazioni meccaniche	il paziente da possibili contaminazioni	nessuna delle altre risposte è corrette
368	Nella fase dell'accertamento, l'ispezione è riferita:	al solo esame visivo	all'esame visivo, alla palpazione, all'auscultazione, alla percussione e all'intervista	all'esame fisico e psichico	all'esame visivo, alla palpazione, all'auscultazione e alla percussione
369	Per la misurazione della temperatura corporea?	Non è indicato l'uso dei guanti	È indicato l'uso dei guanti di qualsiasi materiale	È indicato l'uso dei guanti in PVC non sterile	È indicato l'uso dei guanti in lattice
370	_____ è opportuno effettuare il lavaggio sociale delle mani.	Tutte le altre risposte precedenti completano l'affermazione	Prima di distribuire i pasti	All'inizio del turno di lavoro	Prima di effettuare l'assistenza diretta
371	_____ condizionano l'attività di un disinfettante.	La concentrazione, il tempo di contatto, la carica microbica, la temperatura d'uso	La concentrazione, il tempo di contatto, la temperatura	La concentrazione, lo stato di conservazione, il tempo di contatto, la temperatura	La carica microbica, la concentrazione, la diluizione, la temperatura
372	Il lavaggio delle mani favorisce la rimozione della flora batterica?	Transitoria	Transitoria e della fauna batterica residente	Transitoria e della flora batterica residente	Residente
373	Il lavaggio delle mani può essere sociale, antisettico e chirurgico. Ciò che diversifica i vari tipi di lavaggio è:	La durata del lavaggio, le modalità, il prodotto usato	La durata del lavaggio, il prodotto utilizzato	Il prodotto utilizzato, il luogo in cui avviene il lavaggio	Il luogo in cui avviene il lavaggio, le modalità
374	Quando si alza una persona per la prima volta dopo un intervento chirurgico devono essere presenti:	Infermiere	Una coppia di OSS	Medico	Il fisioterapista e l'OSS
375	Gli igienisti sono soliti suddividere la struttura ospedaliera in _____ aree di rischio.	3	6	5	4
376	Il disinfettante è una sostanza che distrugge:	Gran parte dei microrganismi ed è usata sulle superfici inanimate	Tutti i microrganismi e che può essere usata ovunque	Tutti i microrganismi ed è usata sulle superfici inanimate	Gran parte dei microrganismi ed è usata su cute e mucose
377	La pulizia riduce la concentrazione della carica microbica presente nell'ambiente considerato di circa:	l'80 per cento	Il 90 per cento	Il 50 per cento	Il 70 per cento
378	L'antisettico è una sostanza che distrugge:	Gran parte dei microrganismi ed è usata su cute e mucose	Gran parte dei microrganismi ed è usata sulle superfici inanimate	Tutti i microrganismi e che può essere usata ovunque	Nessuna delle altre risposte è corretta
379	Un soggetto anziano che soffre di stipsi deve:	Tutte le altre risposte sono corrette	Mangiare soprattutto verdura, pane integrale, minestrone	Bere regolarmente, soprattutto acqua	Mangiare soprattutto patate e cioccolata
380	Durante l'effettuazione di un clistere evacuativo la posizione consigliata è:	Sul fianco sinistro modificata di Sims	Indifferente sul fianco destro o sinistro	Sul fianco destro	Prono
381	La sagoma rimovibile della protesi auricolare deve essere pulita con una salvietta asciutta:	Una volta alla settimana	A giorni alterni	Quotidianamente	Ogni due giorni
382	La pulizia dell'unità di degenza dell'assistito deve essere svolta:	Almeno quotidianamente	Alla dimissione del paziente	Ogni 3 giorni	Quando il paziente la chiede

383	La termodispersione è:	Il processo di dispersione nell'ambiente dell'eccesso di calore	Il processo di dispersione del calore del sangue nelle arterie	L'andamento della carica ormonale	La diminuzione repentina dei battiti cardiaci
384	Nella pulizia degli occhi, la rimozione delle secrezioni deve essere eseguita procedendo:	Dall'angolo palpebrale interno verso quello esterno	Dal lato destro della palpebra verso quello sinistro	Dalla palpebra superiore a quella inferiore	Dall'angolo palpebrale esterno verso quello interno
385	Al termine dell'igiene il prepuzio deve essere ricondotto nella posizione iniziale per:	Prevenire l'edema (gonfiore) del glande	Garantire l'igiene	Prevenire la comparsa di infezioni del tratto genito-urinario	Assicurare la regolarità della minzione
386	Per la rilevazione della temperatura corporea:	La temperatura timpanica riflette quella interna del corpo	La temperatura timpanica non riflette quella interna del corpo	Il sito orale non è indicato in chi respira con la bocca	Il sito rettale è meno affidabile di quello orale
387	La termoregolazione è:	Il meccanismo di adattamento che mantiene la temperatura corporea costante	Un processo dell'organismo che tende a produrre calore	Una misura che l'organismo mette in atto per diminuire la temperatura	Una misura per conservare il calore corporeo
388	Nel lavaggio sociale delle mani non si deve:	Usare lo spazzolino per le unghie	Prolungare il lavaggio per almeno 15 secondi	Usare un detergente	Asciugare minuziosamente le mani
389	La rianimazione cardio-polmonare può essere eseguita da un soccorritore o da due soccorritori. Il rapporto tra compressioni toraciche e insufflazioni è di:	Trenta: due	Dieci : tre	Cinque : due	Venti : cinque
390	Identificare la sequenza corretta nella mobilitazione del paziente a letto: 1) richiedere l'aiuto del paziente per ridurre il carico di lavoro 2) posizionarsi adeguatamente e spostare il paziente 3) provvedere alla riservatezza del paziente 4)lavarsi le mani ed osservare le procedure per il controllo delle infezioni 5)presentarsi e verificare l'identità del paziente	5-4-3-1-2	4-5-2-1-3	1-3-5-2-4	5-2-1-4-3
391	Nell'anziano, i momenti di riposo:	Dovrebbero alternarsi a momenti di attività	Devono essere più frequenti dei momenti di attività	Devono essere il minimo indispensabile	Sono sconsigliati
392	La pressione arteriosa non deve essere rilevata sul braccio del paziente se è presente:	Un' infusione endovenosa	Una cicatrice	Un neo	Un tatuaggio
393	Le urine per eseguire l'urinocoltura devono essere raccolte:	Con procedura pulita	In modo asettico	Raccolte dalla sera prima	Raccolte a digiuno
394	Che cosa sono le dimissioni protette ?	L'insieme delle azione che costituiscono il processo di passaggio organizzato di un paziente da un setting di cura ad un altro , al fine di garantire la continuità assistenziale	Le dimissioni organizzate in segreto tra medico e paziente	Le dimissioni di un paziente detenuto e sotto sorveglianza	Nessuna delle altre risposte è corretta
395	Dovendo identificare il paziente per l'esecuzione di una procedura , l'OSS deve ..	Chiedere alla persona il cognome e il nome	Chiedere al collega	Consultare la cartella clinica	Verificare il numero del letto
396	Le apparecchiature medicali possono essere oggetto di cattivo funzionamento e considerate pericolose se non sottoposte a manutenzione. Quale figura è di riferimento per garantire la corretta esecuzione della manutenzione su tali apparecchi ?	Il personale di assistenza deve attenersi a norme ben definite e conoscere i pericoli nell'uso delle apparecchiature	Tutto il personale deve preoccuparsi di effettuare un controllo	Le apparecchiature medicali devono essere controllate dalla ditta fornitrice che ne rimane unica responsabile	La responsabilità è della dirigenza medica
397	Indicare l'affermazione errata sulla conservazione e sull'utilizzo del materiale sterile	Occorre mantenere il pacco con il materiale sempre vicino alla divisa	Non si deve mai sporgere al di sopra della zona sterile	Non si può parlare, tossire o starnutire al di sopra del campo sterile	Bisogna aprire il pacco con il materiale solo in prossimità della zona di utilizzo
398	_____ è una procedura attribuibile all'OSS	Il rifacimento del letto non occupato	La rimozione della flebo	La rimozione del catetere vescicale	L'esecuzione della iniezione intramuscolare
399	Il cateterismo vescicale è una procedura che ...	Deve essere eseguita dall'infermiere e non può essere né delegata né attribuita all'OSS	Deve essere eseguita solo dal medico	L'OSS può eseguire nella donna in quanto manovra più semplice	L'infermiere può delegare all'OSS, rimanendo comunque il responsabile delle attività
400	Indicare i nutrienti che forniscono energia all'organismo	Carboidrati, lipidi e proteine	Vitamine, acqua	Minerali e acqua	Carboidrati, minerali e acqua
401	_____ è una misura preventiva nell'ambito della movimentazione manuale dei carichi	La conoscenza riguardo il corretto utilizzo del sollevatore	Il delegare i compiti della movimentazione	La riduzione del rischio non movimentando il paziente	Il mantenimento del riposo, evitando tutti gli sforzi
402	Un paziente con temperatura corporea rilevabile entro i 34°C è una condizione ...	Incompatibile con la vita. Il paziente si può trovare in uno stato di coma con depressione del centro termoregolatore che impedisce l'insorgenza di brividi	Di normalità nel periodo invernale in quanto la temperatura corporea è influenzata dalla temperatura fredda esterna	Di normalità nel periodo estivo quando l'organismo, per contrastare le alte temperature esterne, utilizza la termoregolazione	Di normalità dell'individuo
403	La mobilitazione passiva del paziente ...	Rientra nelle tecniche di mobilitazione	E' necessaria per il supporto delle funzioni vitali	E' una tecnica vaga di mobilitazione	Nessuna delle altre risposte è corretta
404	L'OSS quando si trova a collaborare in progetti educativo/animativi...	Diviene un facilitatore e come tale non si sostituisce mai all'utente, bensì trova delle strategie affinché la persona possa raggiungere l'obiettivo prefissato	Deve sostituirsi agli utenti e fare ciò che essi non riescono a fare da soli	Si limita ad osservare, non mettendosi in gioco personalmente	Osserva le dinamiche di gruppo e le interpreta

405	Per costruire un piano di assistenza personalizzata è necessario conoscere ...	I bisogni ed i problemi del paziente	L'anatomia e la fisiologia del corpo umano	La tipologia manifestata del paziente	I risultati a breve, medio, lungo termine che il paziente deve raggiungere
406	La " consegna e il rapporto " del reparto sono ...	Una forma di comunicazione scritta utile alla comunità dell'assistenza e non solo	Strumenti utili per prevenire errori assistenziali	Rapiti di informazione tra il personale dei vari turni	Semplici promemoria
407	In ambito geriatrico il rischio di cadute nell'anziano viene determinato con la scala di valutazione ...	Tinetti	Braden	D.I.S.C.O.	Norton
408	Sul carrello per le cure igieniche non dovrebbe/dovrebbero mancare ...	Guanti monouso	Apparecchio per la misurazione della glicemia	Termometro	Tutte le altre risposte sono corrette
409	L'Oss si assume la responsabilità ...	Tutte le altre risposte sono corrette	Analizzando le conseguenze dei suoi atti	Non nuocendo alla persona assistita	In base al livello di competenza e conoscenza raggiunto, al suo profilo e alle norme di riferimento
410	Per tolleranza si intende ...	La necessità di assumere una quantità sempre maggiore di una sostanza di abuso al fine di ottenere lo stesso effetto farmacologico	La capacità di una sostanza di abuso di indurre un aumento di risposta farmacologica pur essendo assunta ripetutamente nel tempo allo stesso dosaggio	L'overdose	Il desiderio incoercibile di assumere una sostanza d'abuso
411	Nell'esecuzione del bagno a letto ...	Si lavano nell'ordine : testa, viso, arti superiori, tronco (petto e schiena) parti intime e arti inferiori	Si lavano prima le parti intime e poi a seguire le altre parti del corpo	E' importante che venga effettuato almeno una volta al mese	Si inizia lavando le parti intime, poi gli arti inferiori, il tronco e, per ultimo, il viso
412	La sindrome da immobilizzazione prolungata a letto provoca ...	Tutte le altre risposte sono corrette	Comparsa di ridotta mobilità articolare	Piaghe da decubito	Stipsi
413	I bisogni di un paziente si possono individuare ...	Tutte le altre risposte sono corrette	In virtù di un adeguato percorso formativo	Attraverso l'osservazione	Attraverso i dati raccolti in precedenza con il colloquio
414	La posizione dell'operatore durante attività assistenziali che comportano il sollevamento pesi è ...	Allargare la base d'appoggio (piedi leggermente divaricati) evitare la flessione della colonna, flettere le ginocchia	Allargare la base d'appoggio, estendere la colonna e allargare gli arti superiori	Mantenere bene i piedi uniti, ginocchia flesse e dorso incurvato	Stringere la base di appoggio (piedi bene uniti), mantenere la colonna in flessione e gli arti estesi
415	Al fine di prevenire il rischio di cadute nell'anziano non è utile ...	Dotarlo di ausili protettivi (protettori d'anca, caschetti, ecc.)	Rivalutare con frequenza la terapia farmacologica	Eliminare gli ostacoli ed il disordine	Insegnargli a cambiare posizione lentamente
416	Un letto chiuso diventa aperto quando ...	Il lenzuolo superiore e le coperte vengono ripiegate verso il fondo del letto	Viene assegnato ad un paziente	La coperta e il copriletto vengono ripiegate verso la parte superiore del letto	Viene trasferito il paziente
417	Il "quinto parametro vitale " è ...	Il dolore	La temperatura corporea	Il battito cardiaco	Nessuna delle altre risposte è corretta
418	L'utilizzo dei guanti non sterili è una misura ...	Aggiuntiva al lavaggio delle mani	Alternativa al lavaggio sociale delle mani	Alternativa al lavaggio antisettico delle mani	Nessuna delle altre risposte è corretta
419	Le forze di stiramento in un paziente a rischio di ulcere da pressione si realizzano ...	Quando un paziente allettato viene spostato da due operatori facendo forza sulla base ascellare	Quando un paziente allettato viene spostato con il telo ad alto scorrimento	Quando un paziente allettato viene spostato da due operatori con l'ausilio di sollevatore	Nessuna delle altre risposte è corretta
420	L'applicazione delle calze elastiche deve ...	Essere effettuata solo su prescrizione	Sempre essere effettuata prima di un intervento chirurgico	Essere effettuata quando il paziente è alzato da almeno un ora	Nessuna delle altre risposte è corretta
421	Un operatore sanitario per sollevare un paziente dal letto NON deve ..	Rivolgersi nelle direzione opposta a quella del movimento e allargare la base di appoggio	Chiedere l'aiuto del paziente per alleggerire il carico di lavoro	Rimuovere tutti i cuscini, quindi porne uno contro la tastiera del letto	Nessuna delle altre risposte è corretta
422	Nel processo di stadiazione delle lesioni da pressione lo stadio I corrisponde a ...	Un eritema fisso della cute integra	Una ferita con spessore parzialmente coinvolgente l'epidermide e/o il derma	Una ferita a tutto spessore che implica danno e necrosi dal tessuto sottocutaneo	Nessuna delle altre risposte è corretta
423	Un OSS si sta preparando ad usare un sollevatore idraulico per spostare un paziente sulla sedia accanto a letto. Prima di dare inizio alla manovra, un'azione prioritaria dovrebbe essere ...	Spiegare la procedura al paziente	Posizionare il paziente sull'imbracatura	Indossare i guanti	Nessuna delle altre risposte è corretta
424	Posizionare il paziente nella posizione laterale di sicurezza significa ...	Stenderlo su di un fianco, con la testa leggermente rialzata	Assumere la posizione supina	Farlo sedere con testa rivolta in avanti	Nessuna delle altre risposte è corretta
425	La doccia preparatoria ...	Serve a prevenire le infezioni nel sito chirurgico	Serve a rilassare ed aumentare il comfort del paziente	Non incide sulla riduzione delle infezioni	Nessuna delle altre risposte è corretta
426	L'adeguata assunzione di cibo in termini di calorie e di nutrienti ...	Influisce positivamente sulla prevenzione o sulla guarigione delle lesioni da decubito	E' sufficiente l'assunzione del cibo che il soggetto desidera mangiare	Influisce solo l'apporto calorico che deve essere superiore al fabbisogno	Nessuna delle altre risposte è corretta
427	_____ risulta ERRATA/O nell'esecuzione della procedura per la pulizia della cute peristomale	L'utilizzo di disinfettante	Il ritagliare la placca della misura dello stesso diametro dello stoma	L'utilizzo di sapone neutro	Nessuna delle altre risposte è corretta
428	Il lavaggio antisettico delle mani è eseguito con ...	Sostanze antimicrobiche e acqua	Sapone comune e acqua	Formaldeide	Nessuna delle altre risposte è corretta
429	Per trasportare un paziente con sospetto di meningite batterica, oltre ai guanti è indispensabile per prevenire il contagio usare ...	La mascherina	Gli occhiali	Il camice	Nessuna delle altre risposte è corretta
430	Durante la deambulazione assistita il paziente deve ...	Mantenere la posizione eretta e guardare avanti	Alzare il ginocchio per ogni passo almeno a 60°	Guardare i piedi per controllare la posizione	Nessuna delle altre risposte è corretta
431	Per evitare le piaghe da decubito non bisogna ...	Eseguire dei lievi massaggi o frizioni con alcool saponato o canforato	Proteggere la pelle con una pulizia accurata	Decomprimere cambiando spesso la posizione del paziente	Nessuna delle altre risposte è corretta
432	_____NON è indicata/o in un anziano incontinente	L'introduzione di routine di un catetere vescicale	Il posizionare in modo costante il paziente sulla padella	Il ridurre al controllo degli sfinteri	Nessuna delle altre risposte è corretta
433	Quando una persona con esiti di emiplegia deve togliere i pantaloni , deve sfilarsi per primo l'arto inferiore ...	Sano	Plegico	E' indifferente	Nessuna delle altre risposte è corretta

434	I bisogni primari sono ...	Bisogni che si cerca di soddisfare per primi in quando indispensabili per la sopravvivenza	Bisogni che riguardano il personale sanitario	Bisogni che non si riesce a soddisfare in autonomia	Nessuna delle altre risposte è corretta
435	Quando una persona con limitazione funzionale a un arto superiore deve infilare una camicia, deve infilare...	Prima il braccio leso fino alla spalla, sistemare la camicia dietro alla schiena, portare il braccio sano indietro e introdurlo nella manica	Prima il braccio leso fino alla spalla, sistemare la camicia dietro alla schiena, portare il braccio leso indietro e introdurlo nella manica	Prima il braccio leso fino al gomito, sistemare la camicia dietro alla schiena, portare il braccio sano indietro e introdurlo nella manica. Abbottonare la camicia	Nessuna delle altre risposte è corretta
436	L'OSS che assiste nella deambulazione la persona deve ...	Interrompere di tanto in tanto l'andatura per far riposare l'assistito	Lasciare che sia il paziente a fare l'andatura	Accelerare di tanto in tanto per stimolare l'andatura	Nessuna delle altre risposte è corretta
437	Per favorire la deambulazione di un ospite con morbo di Parkinson L'OSS ...	Cammina davanti al paziente	Lo fa accomodare sulla carrozzina	Cammina dietro il paziente sorreggendolo	Nessuna delle altre risposte è corretta
438	Le precauzioni standard sono ...	Un insieme di azioni che, devono essere applicate in ogni ambiente di assistenza sanitaria, e devono essere sempre usate per ogni procedura di assistenza	Un insieme di azioni che devono essere poste in atto su richiesta medica	Un insieme di azioni che, devono essere applicate in ogni ambiente di assistenza sanitaria e non sanitaria, e devono essere usate, solo in alcune situazioni per le procedure di assistenza	Nessuna delle altre risposte è corretta
439	Quali sono i 5 momenti fondamentali del lavaggio delle mani?	Prima del contatto del paziente, prima di una manovra asettica, dopo l'esposizione ad un liquido biologico, dopo il contatto con il paziente, dopo il contatto con ciò che sta attorno al paziente	Prima del contatto del paziente, prima di una manovra asettica, dopo l'esposizione ad un liquido biologico, dopo il contatto con il paziente, solo se visibilmente sporco	Prima del contatto del paziente se non indosso i guanti, prima di una manovra asettica, dopo l'esposizione ad un liquido biologico, dopo il contatto con il paziente, dopo il contatto con ciò che sta attorno al paziente	Nessuna delle altre risposte è corretta
440	L'utilizzo dei guanti sostituisce il lavaggio delle mani ?	No, l'utilizzo dei guanti non sostituisce il lavaggio igienico delle mani	Si, l'utilizzo dei guanti sostituisce quasi sempre il lavaggio delle mani	Si, solo se prescritto dal medico competente	Nessuna delle altre risposte è corretta
441	Il corretto trasporto di un campione biologico prevede di ...	Salvaguardare l'integrità del preparato e la sicurezza del trasportatore	Consegnarlo entro 2 ore	Valutare da quale reparto proviene il materiale	Nessuna delle altre risposte è corretta
442	La posizione idonea per un paziente con dispnea è la ...	Posizione ortopnoica	Posizione supina	Posizione Trendelenburg	Nessuna delle altre risposte è corretta
443	L'acronimo P.L.S. significa ...	Posizione Laterale di Sicurezza	Posizione Libera di Sicurezza	Posizione Laterale di Sorveglianza	Nessuna delle altre risposte è corretta
444	Quali, tra le seguenti attività, non può svolgere l'OSS?	Somministrare per via naturale la terapia descritta	Attuare interventi di primo soccorso	Utilizzare specifici protocolli per mantenere la sicurezza del paziente	Nessuna delle altre risposte è corretta
445	La doccia o il bagno pre-operatorio devono essere eseguiti ...	Al mattino, prima dell'intervento	La sera del giorno prima dell'intervento	Il pomeriggio del giorno prima dell'intervento	Nessuna delle altre risposte è corretta
446	Durante la somministrazione del pasto ad un paziente disfagico è importante controllare	L'eventuale comparsa di tosse	La comparsa di tosse ed epistassi	La comparsa di incontinenza urinaria	Nessuna delle altre risposte è corretta
447	La sacca di raccolta delle urine deve essere sempre mantenuta ...	Al di sotto del livello della vescica	Al di sotto o a livello della vescica	Al di sopra del livello della vescica	Nessuna delle altre risposte è corretta
448	Se il paziente è portatore di protesi dentaria ...	La frequenza dell'igiene orale e delle protesi non cambia	Non serve eseguire l'igiene orale e della protesi se viene utilizzato un collutorio	La frequenza dell'igiene orale e della protesi può essere eseguita a giorni alterni ...	Nessuna delle altre risposte è corretta
449	Quando un paziente è a forte rischio di cadute in ambiente ospedaliero ...	E' utile pianificare interventi di tutela e rendere l'ambiente sicuro adottando tutti gli accorgimenti che riducono il rischio di cadute	Sarebbe opportuno ricorrere ai mezzi di contenzione quando necessario	Si deve accertare il rischio di caduta e chiedere al medico eventuali prescrizioni terapeutiche	Nessuna delle altre risposte è corretta
450	La rianimazione cardio-polmonare (RCP) si effettua con il paziente in posizione ...	Supina su un piano rigido	Qualsiasi	Semi seduta	Nessuna delle altre risposte è corretta
451	La scheda di Braden individua ...	Il rischio di insorgenza di una lesione da pressione nei pazienti ricoverati	Il rischio di caduta della persona anziana	Il rischio di dimissione difficile di una persona ricoverata in una struttura ospedaliera	Nessuna delle altre risposte è corretta
452	Con il termine di relazione di aiuto si intende ...	Il legame che si instaura tra una persona capace di dare aiuto ed un'altra che ha bisogno di riceverlo	La relazione tra due o più persone che si conoscono tra di loro	Il legame fra un gruppo di persone che si ritrovano accomunate per problemi in comune ...	Nessuna delle altre risposte è corretta
453	Un farmaco si deve proteggere ...	Da luce, aria, temperatura e umidità	Da luce, freddo e gas	Da furti e dalle calamità naturali	Nessuna delle altre risposte è corretta
454	L'acronimo G.A.S. significa ...	Guardare, ascoltare, sentire	Guardare, assistere, supportare	Guardare, assistere, sentire	Nessuna delle altre risposte è corretta
455	Per "prevenzione terziaria" si intende ...	Prevenzione che interviene per evitare la progressione dell'infermità recuperando le funzioni residue o, se possibile, preservandolo il più a lungo possibile	Prevenzione a livello eziologico, mira ad impedire l'ingresso delle cause patogene nell'organismo evitando la comparsa delle malattie	Prevenzione che interviene quando la causa morbosa si è già insediata nell'organismo. Implica attività di diagnosi precoce attraverso le attività di screening	Nessuna delle altre risposte è corretta
456	Quale opzione di risposta è corretta in riferimento a quello che si intende per "isolamento"?	Per isolamento si intende una misura di profilassi delle malattie infettive	L'isolamento non è considerata una tecnica per l'isolamento dei germi	L'isolamento è adoperato per aumentare al massimo il rischio di trasmissione degli agenti patogeni alle altre persone	Con l'isolamento si avvicinano i soggetti suscettibili alla fonte infetta
457	Quale misura assistenziale bisogna adottare nel caso in cui una persona a letto presenta un'aumentata difficoltà respiratoria per ridotta ventilazione e diminuita espansione toracica?	La cura del microclima	Evitare l'espettorazione evitando di far eseguire dei colpi di tosse per rendere più fluido il muco attraverso l'assunzione di un'adeguata quantità di liquidi	Evitare la cura del microclima	Non stimolare l'esecuzione di profonde inspirazioni

458	Nel caso in cui una persona a letto presenta un'aumentata difficoltà respiratoria per ridotta ventilazione e diminuita espansione toracica, quale misura assistenziale bisogna adottare?	Stimolare l'esecuzione di profonde inspirazioni	Evitare la cura del microclima	Non stimolare l'esecuzione di profonde inspirazioni	Evitare l'espettorazione evitando di far eseguire dei colpi di tosse per rendere più fluido il muco attraverso l'assunzione di un'adeguata quantità di liquidi
459	Tra le risposte, quale misura assistenziale bisogna adottare nel caso in cui una persona a letto presenta un'aumentata difficoltà respiratoria per ridotta ventilazione e diminuita espansione toracica?	Favorire l'espettorazione facendo eseguire dei colpi di tosse e rendendo più fluido il muco attraverso l'assunzione di un'adeguata quantità di liquidi	Non stimolare l'esecuzione di profonde inspirazioni	Evitare la cura del microclima	Evitare l'espettorazione evitando di far eseguire dei colpi di tosse per rendere più fluido il muco attraverso l'assunzione di un'adeguata quantità di liquidi
460	Nel caso un paziente segnali dolorabilità, l'OSS deve ...	Effettuare la segnalazione all'infermiere/coordinatore	Effettuare la segnalazione ai parenti del paziente	Rassicurare il paziente	Effettuare la segnalazione all'URP
461	Per svuotare la sacca di raccolta delle urine ...	Disinfettare il rubinetto prima dell'apertura, svuotare la sacca in un contenitore monopaziente	Disinfettare il rubinetto prima di chiuderlo, staccare la sacca dal catetere vescicale e procedere allo svuotamento	Svuotare la sacca in un secchio	Far avvicinare il paziente al gabinetto e svuotare la sacca
462	Durante l'esecuzione dello stick glicemico ad un paziente con il diabete che ha l'epatite C, l'OSS si punge in maniera accidentale il dito con ago infetto. Esiste un rischio di contagio considerando che l'ago era stato usato il giorno prima?	La puntura è avvenuta circa 24 ore dopo e quindi vi è una bassa carica virale, ma vi è possibilità di contagio	La puntura è avvenuta circa 24 ore dopo e quindi non vi è rischio di trasmissione	Non vi è pericolo di trasmissione in quanto non si trasmette con il sangue	Vi è possibilità di contagio solo se l'OSS non ha eseguito il vaccino per COVID-19
463	Nell'assistenza al paziente demente l'OSS deve ...	Mantenere più a lungo possibile le capacità residue stimolando a fare da solo	Lasciare che faccia ciò che si sente	Sostituirsi al paziente nello svolgimento delle attività quotidiane	Chiedere al caregiver di sostituirsi al paziente nello svolgimento delle attività quotidiane
464	Per scrivere in modo adeguato le consegne è utile impiegare un linguaggio ...	Sintetico	Profilisso	Descrittivo	Tecnistico
465	Quando il paziente è incapace di tagliare il cibo e di portarlo alla bocca, è necessario ...	Preparare in piccoli pezzi il cibo, aiutarne l'assunzione, imboccando il paziente, lasciandogli il tempo per deglutire e porgendogli acqua con bicchiere o cannuccia a seconda dei casi	Preparare in piccoli pezzi il cibo, tornare dopo 20 minuti per vedere se ha finito	Alimentarlo esclusivamente con cibi liquidi	Obbligare il caregiver a rimanere in reparto durante i pasti
466	Se dopo un intervento chirurgico il paziente ritorna nello stesso letto è necessario...	Sostituire tutta la biancheria e portare il letto ad un livello che consenta all'operatore movimenti agevoli	Sollevare la parte superiore del letto a un livello appropriato al paziente, assicurandosi che questi stia comodo	Mettere il guanciale sul letto in modo che la parte aperta si trovi dalla parte opposta alla porta	Sollevare la parte inferiore del letto, assicurandosi che il paziente abbia gli scarti in scarico
467	_____ può essere un esempio di attività attribuibile all'OSS in cooperazione con l'infermiere	La mobilitazione e il cambio biancheria personale e del letto a pazienti poli-traumatizzati in fase acuta	Lo svuotamento della sacca della diuresi	Il rifacimento dei letti	La rilevazione della glicemia capillare
468	La sagoma rimovibile della protesi auricolare deve essere pulita dall'OSS con una salvietta asciutta ...	Quotidianamente	Una volta alla settimana	Due volte al giorno	Due volte la settimana
469	Gli Operatori Sanitari, prima di procedere al lavaggio manuale del materiale sanitario, devono indossare ...	Sopracamiche protettivo, mascherina con visiera, guanti di gomma	Mascherina con visiera, guanti di gomma, divisa che dovrà essere cambiata al termine della manovra	Cuffia, mascherina chirurgica, occhiali protettivi, guanti di gomma	Sopracamiche protettivo, mascherina, guanti in vinile
470	Quando si deve somministrare un farmaco per via auricolare, dopo aver invitato la persona ad assumere la posizione supina e a girare la testa di lato, è necessario tirare il padiglione auricolare verso ...	L'alto e indietro	L'alto e avanti	Il basso e in avanti	Il basso e indietro
471	Le padelle usate dai pazienti devono essere sottoposte a ...	Pulizia e disinfezione	Pulizia	Sterilizzazione	Lavaggio e pulizia
472	Rispetto al controllo della diuresi, l'OSS deve saper osservare e riferire ...	La quantità, la trasparenza, il colore e l'odore delle urine	Quante volte avviene la minzione	La presenza di glucosio, proteine e corpi chetonici nelle urine	Quando è avvenuta l'ultima minzione del paziente
473	La funzione respiratoria si verifica ...	Rilevando o meno la presenza di estensioni toraciche	Rilevando il polso	Controllando il colorito cutaneo	Nessuna delle altre risposte è corretta
474	L'OSS, dopo aver alimentato un paziente, è tenuto a riferire all'infermiere ...	Il risultato ottenuto e le eventuali difficoltà riscontrate	Consigli su una dieta particolare	Quale sia il cibo preferito del paziente	Se il degente è portatore di protesi dentarie
475	Tra le mansioni dell'Operatore Socio Sanitario non vi è ...	La registrazione del carico e scarico delle medicine, prodotti disinfettanti e loro custodia	La cura della persona autosufficiente	La sanificazione dei locali	La somministrazione dei pasti
476	L'OSS in collaborazione e su attribuzione dell'infermiere è tenuto a ...	Tutte le altre risposte sono corrette	Eeguire il mantenimento delle posizioni terapeutiche assegnate al paziente	Eeguire l'igiene personale del degente	Rifare il letto del degente
477	Nell'attività di accoglienza della persona in una Unità Operativa l'OSS deve ...	Collaborare con l'infermiere alla valutazione del livello di autosufficienza dell'assistito	Valutare i posti letto disponibili per il ricovero	Occuparsi dell'attività burocratica e amministrativa del ricovero	Occuparsi in autonomia dell'assistito
478	L'operatore socio-sanitario è tenuto ad eseguire iniezioni intramuscolari quando ...	Nessuna delle altre risposte è corretta	Gli viene data indicazione dall'infermiere	Il paziente ne ha bisogno	Non è presente l'infermiere
479	Per protocollo si intende ...	Il risultato dell'adattamento delle linee guida	La raccomandazione di comportamento clinico non vincolante	Una procedura	Una linea guida per l'operatore

480	Ad un paziente diabetico l'OSS consiglia di avere cura dei suoi piedi ...	Usando calze morbide senza cuciture e scarpe comode	Lavandoli frequentemente con acqua a temperatura di 40-45 gradi	Tagliando le unghie molto corte	Utilizzando scarpe strette per migliorare la circolazione sanguigna
481	In un paziente affetto da diabete mellito (insulino dipendente), si deve controllare la glicemia ...	Prima di ogni pasto giornaliero	Ogni 2-3 giorni	Solo prima di pranzo	Una volta al mese
482	L'OSS si occupa in piena autonomia ...	Delle medicazioni semplici	Della somministrazione della terapia orale	Delle medicazioni complesse	Tutte le altre risposte sono corrette
483	Dopo che una persona ha evacuato, l'OSS rimuove la padella e la porta via per svuotarla, mantenendola ...	Senza toccare l'interno della padella, tenendola orizzontalmente con entrambe le mani lontano dal corpo per evitare il versamento o la contaminazione dell'uniforme	Con le dita di una mano ripiegate all'interno del bordo posteriore della padella e tenendola saldamente	Con un angolo di 30°, usando entrambe le mani per ridurre l'odore	Con un angolo di 60°, usando entrambe le mani per ridurre l'odore
484	L'OSS nel rifare il letto deve...	Maneggiare il meno possibile le lenzuola usate	Piegare correttamente e con cura le lenzuola usate	Esporre la biancheria usata all'aria, dopo averla scossa	Nessuna delle altre risposte è corretta
485	_____ è consigliabile sollevare verso l'alto gli arti inferiori	Nell'ipotensione	Nella contusione	Nella frattura	Nell'ipertensione
486	Nella verticalizzazione di un paziente ...	Si devono bloccare i piedi	Si devono bloccare le mani	Non si deve prestare alcuna attenzione particolare	Si deve fare leva dalle ascelle
487	Il trasferimento letto-barella con due operatori socio sanitari viene eseguito in ___tempi	2	3	4	5
488	L'OSS addetto al trasporto del materiale biologico ...	Esegue nel rispetto di disposizioni specifiche, nel più breve tempo possibile	Non esegue il trasporto del materiale biologico in quanto non è sua competenza	Nel rispetto di disposizioni specifiche decise nell'anno 2008	Può eseguire il trasporto solo insieme all'infermiere
489	Un OSS che si accinge ad eseguire un clistere ...	Sta introducendo nel retto una sostanza liquida per determinare lo svuotamento dell'intestino	Sta introducendo nel colon una sostanza liquida per determinare lo svuotamento dell'intestino	Sta introducendo sostanze saponose nel colon per determinare lo svuotamento dell'intestino	Sta svuotando l'intestino facendo assumere lassativi per os
490	L'igiene del cavo orale nella persona non autosufficiente e che si alimenta per via orale va eseguita ...	Tre volte al giorno	Solo una volta al giorno	Solo due volte al giorno	In nessun caso
491	Per fermare una modesta emorragia nelle manovre di primo soccorso conviene ...	Fare una pressione sul punto di fuoriuscita del sangue	Applicare il laccio emostatico	Applicare il ghiaccio istantaneo	Mettere il cotone emostatico
492	Applicare acqua fredda su una zona ustionata è consigliabile quando l'ustione sia ...	Stata provocata dalla prolungata esposizione ai raggi ultravioletti	Stata provocata da agenti chimici	A carico degli arti inferiori	A carico degli arti superiori
493	Le compressioni toraciche per il massaggio cardiaco in un soggetto adulto devono abbassare il torace di ...	Circa 4 o 5 cm	Mai più di 2 cm per non provocare fratture	Circa 3 cm	Circa 10 cm
494	Dopo l'esecuzione di un esame radiologico del digerente è opportuno che il paziente ...	Assuma una dieta ricca di scorie	Si sottoponga a clistere evacuativo	Assuma una dieta priva di scorie	Assuma lassativi
495	Le sacche per stomia intestinale di tipo drenante sono adatte per pazienti ...	Con stomie che emettono feci liquide o semi solide	Che necessitano di frequenti cambi della sacca	Con emissione frequente di gas intestinale	Con stomie che emettono feci solide
496	Nei pazienti con colostomia sigmoidea l'irrigazione si pratica per ...	Regolarizzare gli intervalli di emissione delle feci, eliminando in alcuni casi l'uso dei sacchetti	Evitare le irritazioni cutanee	Diminuire il meteorismo	Facilitare la diuresi
497	Prima di procedere alla rilevazione del polso è opportuno aiutare la persona assistita ad assumere la posizione supina e a posizionare l'avambraccio sul torace o lungo il fianco con il polso...	Esteso ed il palmo verso il basso	E la mano nella posizione preferita dall'assistito	Esteso ed il palmo verso l'alto	Flesso e la mano chiusa
498	_____ è il lavaggio delle mani che deve essere effettuato prima e dopo aver indossato i guanti monouso, utilizzando detergenti liquidi erogati da dispenser	Il lavaggio sociale	Il lavaggio antisettico	Il lavaggio antisettico prolungato	Il lavaggio chirurgico
499	La raccolta dei campioni di feci per coprocultura richiede ...	L'uso di contenitori non sterili	Possono essere utilizzati ugualmente contenitori sterili o contenitori non sterili	L'uso di contenitori sterili	Prima della raccolta bisogna somministrare al paziente clistere evacuante
500	La preparazione del materiale chirurgico e presidi medico chirurgici alla sterilizzazione consta di una serie di fasi; indicare la sequenza corretta	Raccolta-decontaminazione-pulizia-risciacquo-asciugatura-controllo e manutenzione-selezione	Raccolta-pulizia-risciacquo-decontaminazione-asciugatura-selezione-controllo e manutenzione	Raccolta-pulizia-risciacquo-controllo-decontaminazione	Raccolta-decontaminazione-pulizia-risciacquo-asciugatura-selezione-controllo e manutenzione
501	Il rifacimento del letto deve essere eseguito ...	Quotidianamente e secondo i bisogni della persona	Solo una volta al giorno	Quando la persona lo richiede e quando l'operatore lo ritiene necessario	Al bisogno, secondo la disponibilità della biancheria

502	Indicare la sequenza di vero (V) e falso (F) corretta in merito alla raccolta di materiali biologici -Le mani degli operatori sanitari rappresentano il veicolo principale di trasferimento di microrganismi patogeni da un paziente all'altro, e dai pazienti a sè stessi -Scopo del lavaggio antisettico è rimuovere completamente la popolazione microbica transitoria e parte di quella residente -Non lavarsi le mani prima di procedere ad interventi a rischio sul paziente può essere causa di infezioni esogene -E' opportuno che i contenitori degli erogatori di sapone che devono essere periodicamente rabboccati abbiano una capacità superiore a 900 ml, per evitare riempimenti frequenti	V, V, V, F	F, V, V, F	V, V, F, F	V, V, V, V
503	Al termine dell'igiene il prepuzio deve essere riportato nella posizione iniziale per...	Prevenire l'edema del glande	Prevenire la comparsa delle infezioni del tratto genito-urinario	Assicurare la regolarità della minzione	Nessuna delle altre risposte è corretta
504	Nell'esecuzione dell'enteroclisma è consigliato l'uso dei guanti ...	Monouso non sterili	Solo nei casi in cui il paziente abbia malattie infettive	Robusti in PVC	Sterili
505	La padella utilizzata per un paziente senza infezioni in corso deve essere ...	Lavata e disinfettata dopo ciascun utilizzo e a fine uso	Usata solo per quel paziente, lavata e disinfettata dopo ciascun utilizzo a fine uso	Lavata e mandata a sterilizzare a fine uso	Lavata e disinfettata a fine turno
506	La tricotomia del paziente in preparazione a un intervento chirurgico non urgente deve essere eseguita ...	Il più vicino possibile al momento dell'intervento	Il giorno prima dell'intervento	6 ore prime	La sera prima
507	Quando si effettua una medicazione semplice ...	Si rimuove la medicazione precedente, si disinfetta, si applica garza sterile e si fissa con un cerotto	Si usano pinze sterili immerse in disinfettanti alcolici e guanti sterili	Occorre sempre disinfettare con Eosina al 2% in soluzione acquosa	Si usano pinze monouso immerse in Cleorexidina al 10% e guanti monouso
508	Durante la medicazione di una ferita semplice l'OSS può rilevare presenza di ...	Macchie sulla garza, arrossamenti, edema, sierosità	Cianosi	Ematomi	Escoriazioni
509	La posizione corretta per un paziente con grave dispnea è ...	Seduto o semiseduto, in appoggio su cuscini possibilmente con i piedi del letto abbassati piano di appoggio per le braccia	Decubito supino senza cuscini, piano del letto orizzontale	Posizione prona oppure posizione di Trandelemburg	Nessuna delle altre risposte è corretta
510	Nella cura dell'igiene orale indicare l'affermazione corretta	Per la prevenzione delle carie dentali e per gli effetti antiplacca sono utili i prodotti contenenti fluoro	I colluttori contenenti clorexidina sono utili per il loro effetto anti-placca e vanno usati frequentemente e costantemente	Per l'igiene orale quotidiana si può usare il sodio bicarbonato che ha la capacità di ridurre la proliferazione di batteri	Per l'igiene orale della persona con stomatite da chemioterapia è importante usare il collutorio idroalcolico contenente fluoro
511	Metti in ordine la giusta sequenza delle parti del corpo da lavare per fare un bagno a letto ad un paziente 1) Gli arti inferiori 2) La schiena 3) La zona perineale 4) Il viso in posizione semiseduta o adatta alla situazione 5) La parte superiore del corpo	4 - 5 - 1 - 2 - 3	4 - 5 - 1 - 3 - 2	5 - 1 - 3 - 2 - 4	1 - 3 - 2 - 4 - 5
512	Iniziata la somministrazione di un pasto il paziente inizia a tossire e ad avere una voce modificata, l'OSS deve ...	Sospendere l'alimentazione del paziente ed avvisare l'infermiere	Continuare ad alimentare il paziente con cibi frullati e segnalare all'infermiere di controllare la situazione	Far assumere alla persona una posizione più comoda e continuare ad alimentarla	Non dare alla persona cibi liquidi e continuare con la somministrazione di cibi solidi
513	E' appropriato l'uso di sistemi di contenzione ...	Per consentire il trattamento terapeutico nei pazienti che interferiscono sulla somministrazione della terapia	Quando l'operatore ha bisogno di riposare nelle ore notturne	Quando per carenza di personale gli operatori in servizio non riescono a vigilare sufficientemente sulla sicurezza degli ospiti	Quando la persona non vuole stare a letto
514	La prevenzione delle cadute si effettua attraverso ...	Interventi riabilitativi mirati al mantenimento delle capacità deambulatorie	Uso intensivo di sistemi di contenzione fisica	Uso intensivo di sistemi di contenzione farmacologica	Il mantenimento della persona coricata a letto
515	In un paziente con un'ustione agli occhi provocata da sostanze chimiche ...	Tutte le altre risposte sono corrette	Detergere abbondantemente l'occhio lesa con acqua tenendo bene aperte le palpebre	Coprire entrambi gli occhi con tamponi inumiditi	Continuare il lavaggio se il paziente lamenta sensazioni di bruciore o irritazione
516	La persona ustionata ...	E' a rischio di ipotermia e quindi da coprire con panni asciutti dopo aver raffreddato la zona ustionata	Non si deve coprire perché possa disperdere il calore accumulato	E' da fasciare con un bendaggio compressivo per evitare emorragie	Nessuna delle altre risposte è corretta
517	Il mezzo più efficace per controllare una emorragia esterna non pulsante è ...	Applicare una compressione diretta	Sollevare la parte interessata	Applicare il tourniquet	Comprimere l'arteria a monte
518	Ad una giovane madre che sta allattando suo figlio di 3 mesi viene diagnosticata mastite nel seno sinistro. Il migliore consiglio da dare a questa mamma è di ...	Continuare ad allattare usando entrambi i seni	Fermare subito l'allattamento perché il bambino potrebbe infettarsi	Fermare subito l'allattamento perché lei inizierà a prendere antibiotici	Continuare ad allattare usando solo il seno destro
519	Il cambio della biancheria nel letto di un malato va effettuato ...	Almeno una volta alla settimana	Ogni due giorni	Almeno ogni due settimane	Tutti i giorni

520	I materassi più adatti per prevenire le piaghe da decubito sono quelli ...	Ad aria	Rigidi	Di lana	Ad acqua
521	_____ è utilizzato allo scopo di prevenire ulcere da decubito	Il materasso ad aria	L'archetto	La spondina	Il catetere
522	Per il rifacimento del letto di un malato non autosufficiente è necessario avere ...	Due operatori	Un operatore	Tre operatori	Quattro operatori
523	Quando il malato non è in grado di alzarsi si procede al cambio delle lenzuola	Dal capezzale verso i piedi del letto	Dai piedi verso il capezzale del letto	Indifferentemente dal capezzale o dai piedi del letto	Ogni 7 giorni
524	La respirazione artificiale si compie attraverso ... (barrare la risposta errata)	Naso-bocca	Bocca-bocca	Bocca-maschera	Maschera-pallone
525	_____ prima di procedere al massaggio cardiaco	Occorre verificare le pulsazioni attraverso la rilevazione del polso carotideo	Occorre effettuare due insufflazioni	Controllare visivamente se vi è ostruzione alle prime vie respiratorie e, in caso affermativo, rimuovere l'ostacolo	Spingere all'indietro la testa del soggetto mantenendogli la fronte con l'altra mano
526	In caso di avvelenamento, se il soggetto è cosciente bisogna dargli da bere ...	Latte, acqua calda o salata	Dell'acqua fredda	Del cognac	Delle sostanze fredde e gasate
527	Il massaggio cardiaco deve avvenire comprimendo ...	Lo sterno contro il rachide, spingendo verticalmente	La faringe con due dita, spingendo verticalmente	Lo sterno e la faringe, spingendo verticalmente	La scapola sulla clavicola
528	In caso di annegamento bisogna ...	Praticare la respirazione artificiale e il massaggio cardiaco esterno	Coprire l'infortunato con una coperta	Dare da bere bevande calde	Trasportare il soggetto in un luogo ben riscaldato
529	In caso di commozione cerebrale ...	Applicare bende fredde sulla testa e lasciare il ferito a riposo	Provocare il vomito attraverso la somministrazione di latte e sale	Praticare la respirazione artificiale	Praticare il massaggio cardiaco
530	In caso di stiramento bisogna applicare ...	Bende fredde e immobilizzare la parte dolorante	Dei massaggi con pomate e unguenti alla parte lesa	Bende calde sulla parte lesa	Bende fredde e riportare immediatamente il muscolo stirato al suo posto
531	In caso di congelamento bisogna ...	Coprire bene l'infortunato e trasportarlo in un locale non troppo riscaldato	Coprire bene l'infortunato e trasportarlo in un locale molto riscaldato	Frizionare le zone congelate con acqua calda	Esporre le zone congelate a sorgenti di calore
532	In caso di emorragia bisogna ...	Comprimere la ferita con un panno pulito, tenendo premuto con il palmo della mano	Pulire la ferita con un disinfettante	Comprimere la ferita e poi lasciare fuoriuscire il sangue	Lavare in acqua calda la ferita
533	In caso di svenimento bisogna sdraiare la persona ...	Sulla schiena e alzarle le gambe	Sul fianco destro in posizione fetale	Sul fianco sinistro in posizione fetale	A pancia sotto e alzarle le braccia
534	Se una persona si sente svenire, bisogna ...	Farla sedere su una sedia, piegata in avanti, con la testa bassa tra le gambe e farla respirare profondamente	Sdraiarla supina con qualcosa di morbido sotto la testa	Alzarle le braccia	Sdraiarla a pancia sotto
535	In caso di emorragia nasale ...	Sollevare il braccio opposto alla narice sanguinante e tenere premuta la narice che sanguina	Sollevare la testa senza applicare niente al naso	Far sdraiare il ferito alzandogli entrambe le braccia	Sollevare il braccio opposto alla narice sanguinante e tenere premuta la narice che non sanguina
536	In caso di annegamento, occorre ...	Afferrare con un braccio intorno al petto l'infortunato lasciando la testa all'insù	Prendere l'infortunato con entrambe le braccia e sollevargli la testa	Prendere l'infortunato con entrambe le braccia lasciando la testa all'ingiù	Afferrare con un braccio intorno alla pancia lasciando l'infortunato a testa all'ingiù
537	In caso di colpo di calore ...	La temperatura corporea sale rapidamente	Il soggetto colpito suda moltissimo	Il soggetto colpito trema ed è scosso da brividi	La temperatura corporea resta stabile
538	In caso di molteplici punture, causate da sciami di insetti, bisogna immergere le zone colpite in ...	Un bagno fresco in cui sia stato disciolto del bicarbonato di sodio	Un bagno caldo	Acqua e sale	Un bagno caldo in cui sia stato sciolto del bicarbonato di sodio
539	In caso di ustioni gravi è errato ...	Togliere e strappare i brandelli degli abiti	Mettere una coperta bagnata sull'ustionato	Non rompere le vescicole	Non applicare niente sull'ustione
540	In caso di incidente stradale, spostare l'infortunato ...	Solo se sopraggiungono altre macchine in corsa	Sempre	Solo se è cosciente	Solo se non ha riportato ferite agli arti inferiori
541	Porre l'infortunato in posizione laterale di sicurezza vuol dire ...	Stenderlo su un fianco, con la testa leggermente rialzata	Farlo sedere con la testa piegata in basso	Farlo rinvenire girandolo a destra e poi a sinistra	Stenderlo sulla schiena
542	Per prestare soccorso da un soggetto in stato di shock ...	Stenderlo e coprirlo con una coperta	Effettuare la respirazione artificiale	Dargli da bere acqua e zucchero	Effettuare il massaggio cardiaco
543	In caso di ustione e di corpo in fiamme, bisogna ...	Spegnere le fiamme degli abiti con una coperta	Allontanare gli abiti in fiamme dal soggetto	Disinfettare le zone ustionate	Riempire con pomate le ferite
544	Con le frizioni a caldo si ottiene ...	Una stimolazione della circolazione sanguigna	Una diminuzione della circolazione sanguigna	La migliore applicazione di un preparato locale	La contrazione di vasi sanguigni
545	La mobilizzazione di una persona a rischio di contrarre lesioni da compressione è consigliata almeno ogni ...	2 ore	3 ore	5 ore	12 ore
546	In caso di temperatura corporea elevata, gli interventi _____ sono di competenza dell'OSS	Che favoriscono la perdita di calore corporeo	Rivolti ad agire sulle cause dell'ipertemia	Rivolti ad agire sul quadro sintomatologico dell'ipertermia	Di tipo farmacologico
547	Il moncone dell'ombelico del neonato va medicato giornalmente per ...	Evitare infezioni	Favorisce l'essiccazione	Favorire la cicatrizzazione	Evitare l'essiccazione
548	Per preparare un litro di soluzione per la sanificazione di un locale alla concentrazione del 5%, sono necessari ...	950 ml di acqua e 50 ml di disinfettante	800 ml di acqua e 200 ml di disinfettante	900 ml di acqua e 100 ml di disinfettante	955 ml di acqua e 5 ml di disinfettante
549	La pulizia del naso va eseguita giornalmente nei pazienti con ...	Tutte le altre risposte sono corrette	Sonda naso-tracheale	Sondino naso gastrico	Sondino nasale per ossigeno
550	La manovra GAS (guardare, ascoltare, sentire) finalizzata alla valutazione di presenze di attività respiratoria deve protrarsi per _____ secondi	10	5	15	20

551	Il modo corretto per raccogliere oggetti da terra è ...	Piegare le ginocchia e tenere l'oggetto vicino a sé	Tenere le gambe divaricate e piegare la schiena	Inarcare la schiena e tenere l'oggetto lontano da sé	Piegare la schiena e tenere le gambe dritte
552	Nel mobilizzare un soggetto con catetere vescicale, il sacchetto delle urine deve essere posizionato ...	Sotto il livello della vescica	Appena sopra il livello della vescica	E' indifferente la posizione	Come richiede il paziente
553	Nell'igiene intima della donna è preferibile adoperare ...	Manopole monouso	Manopole di spugna dell'assistito	Cotone idrofilo	Detergenti con disinfettante incluso
554	Il confezionamento del materiale da sterilizzare non è corretto se ...	Contiene grandi quantità di materiali	Permette la penetrazione degli agenti sterilizzanti	Conserva la sterilità del materiale	Si rimuove con facilità
555	La raccolta delle urine delle 24 ore inizia normalmente ...	Dopo la minzione della notte	La sera prima di dormire	A qualsiasi ora	Prima della minzione della notte
556	Tra gli interventi assistenziali rivolti all'anziano con stipsi, è scorretto ...	Contenere l'apporto di liquidi	Garantire la privacy	Arricchire la dieta di fibre	Favorire l'attività motoria
557	Nel rifacimento del letto occupato ...	La traversa deve essere collocata evitando che il bordo superiore e inferiore sia a contatto con la cute dell'assistito	Le lenzuola vanno sostituite ogni mattina	Il copriletto non va mai ricalzato in fondo	Il cuscino va posizionato tra le spalle e il collo dell'assistito
558	Durante un episodio di soffocamento da cibo solido con persona in poltrona si ...	Tiene la testa in avanti, si danno colpi interscapolari, si chiama aiuto	Mette un dito in bocca, si posiziona sul fianco, si chiama aiuto	Posiziona prono, si danno colpi sulla schiena, si suona campanello	Nessuna delle altre risposte è corretta
559	La borsa con il ghiaccio ...	Va riempita per due terzi facendo fuoriuscire l'aria in eccesso prima di chiuderla	Si riempie per metà di ghiaccio aggiungendo un bicchiere di acqua fredda	La quantità di ghiaccio dipende dal motivo per cui si applica la borsa	Si riempie per metà di ghiaccio e per metà di acqua fredda
560	La pulizia della bocca in una persona che non si alimenta deve essere eseguita ...	In base al protocollo di reparto	Al mattino e alla sera	In base alla prescrizione del medico	Alla sera
561	Prima di eseguire il lavaggio dei ferri è utile indossare ...	I dispositivi di protezione individuali previsti dal protocollo	I guanti	Occhiali o visiera	Un grembiule cerato
562	Quando vi è la distribuzione del pasto in ospedale, l'OSS deve ...	Lavarsi le mani, indossare un copricapo, sovrapporre un grembiule alla divisa	Indossare camice monouso e guanti	Indossare mascherina, grembiule che copra il davanti della divisa, guanti	Indossare un grembiule che copra il davanti della divisa, lavarsi le mani
563	Il primo intervento da realizzare in caso di crisi asmatica di una persona è ...	Rassicurare la persona, posizionarla in decubito ortopnoico, allontanare eventuali allergeni	Somministrare ossigeno, tenere a riposo la persona, rilevare la pressione arteriosa	Rilevare la pressione arteriosa, posizionare supina la persona, somministrare ossigeno	Posizionare in decubito ortopnoico la persona, rilevare il polso, aerare l'ambiente
564	La rianimazione cardio-polmonare non si deve iniziare quando la persona ...	Presenta un'emorragia ingente	Non è cosciente	E' anziana (ha superato i 75 anni)	Presenta un'emorragia ingente
565	Durante il pasto una persona riferisce nausea. L'OSS deve ...	Sospendere il pasto, tenerla seduta, avvisare il personale infermieristico	Sospendere il pasto, metterla distesa, chiamare il medico	Tenerla seduta, darle da bere, chiamare l'infermiere	Metterla in decubito laterale, darle un sorso di acqua, chiamare il medico
566	L'OSS, di fronte a un paziente che nel maneggiare una pentola si è ustionato una mano, ...	Applica acqua fredda per alleviare il dolore	Applica delle garze grasse per ridurre l'ustione	Applica pomate grasse per alleviare il dolore	Cammina insieme per andare in farmacia
567	La sequenza corretta per la preparazione del materiale da sterilizzare è ...	Decontaminazione, detersione, risciacquo, asciugatura	Detersione, risciacquo, decontaminazione, asciugatura	Detersione, decontaminazione, risciacquo, asciugatura	Decontaminazione, risciacquo, detersione, asciugatura
568	In caso di ustione circoscritta ...	Lavare con acqua fredda e applicare un impacco umido-freddo	Lavare con acqua ossigenata, applicare una pomata antibiotica, fare un bendaggio	Fare subito un bendaggio compressivo per evitare infezioni	Lavare con fisiologica e mantenere impacchi sull'ustione per almeno 24 ore
569	In presenza di una persona con intossicazione per via inalatoria occorre prioritariamente ...	Trasportare la persona in una zona non contaminata e ben aereata, controllandone l'attività respiratoria	Tenere la persona seduta e controllare l'attività respiratoria	Mettere la persona supina e, al caso, fare la respirazione bocca a bocca	Fare la respirazione bocca a bocca e se possibile trasportare subito la persona in un centro antiveleni
570	In caso di sospetta frattura agli arti inferiori si deve ...	Tenere la persona supina, controllare la frequenza cardiaca e respiratoria, evitare movimento dell'arto fratturato	Mettere la persona seduta, controllare il polso pedideo, stendere l'arto fratturato	Tenere la persona supina, controllare il polso femorale, steccare l'arto fratturato	Mettere la persona sul fianco dell'arto non fratturato, controllare la frequenza cardiaca, immobilizzare l'arto
571	Le unghie dei piedi devono essere tagliate e limate in forma ...	Quadrata	Ovale	Ovale per evitare infezioni	Ovale se tendono ad incarnirsi
572	Per favorire l'espettorazione in un soggetto fumatore e che presenta tosse produttiva, l'OSS può ...	Curare l'idratazione dell'assistito	Nutrire regolarmente l'assistito	Posizionarlo prono almeno 3 volte al giorno	Curare il microclima
573	Per prelevare un campione per urinocoltura bisogna utilizzare un contenitore ...	Sterile	Non sterile	Pulito	Di plastica
574	Per la distribuzione dei pasti l'OSS deve ...	Avere a disposizione il menù giornaliero	Controllare il carrello inviato dalla cucina	Preparare ogni assistito per il pranzo	Sporzionare alla presenza dell'infermiere
575	L'efficacia della ventilazione con il pallone di Ambu si valuta ...	Osservando i movimenti del torace	Sentendo l'aria che fuoriesce dalla bocca	Con la presenza del polso carotideo	Dalla variazione di colore delle unghie
576	Nella distribuzione dei vassoi del pasto, l'OSS deve ...	Usare il carrello economale	Usare il carrello dell'unità operativa	Usare il carrello del giro visita	Usare il carrello del giro-letti
577	Nel paziente portatore di catetere vescicale il ...	Tutte le altre risposte sono corrette	Sacchetto di raccolta deve stare più in basso rispetto al bacino	Tube di raccordo del sacchetto deve essere ancorato al letto	Sistema di raccolta deve essere sterile
578	Il rapporto compressioni/ventilazioni nel BLS deve corrispondere a ...	30 : 2	5 : 2	5 : 1	10 : 2
579	La tecnica di apertura delle vie aeree prevede ...	Iperestensione del capo, sollevamento del mento, controllo della cavità orale	Iperestensione del capo, controllo della cavità orale, posizionamento della cannula faringea	Iperestensione del capo, posizionamento della cannula faringea, sollevamento del mento	Sollevamento del mento, posizionamento della cannula faringea, rimozione dei corpi estranei
580	Nel soggetto portatore di colostomia, si deve accuratamente evitare che ...	L'elastico dei pantaloni preme sulla sacca di raccolta delle feci	Il sacchetto delle feci si individui da sotto gli indumenti	Il sacchetto delle feci sia collocato sopra la linea dell'ombelico	Il sacchetto delle feci sia privo di filtro per odori

581	L'OSS di fronte ad un paziente con crisi epilettica deve ...	Allontanare gli oggetti che possano essere pericolosi e fare in modo che non si ferisca con questi, dopo ciò cercare di sdraiare la persona	Tentare di bloccarlo con ogni mezzo e se necessario chiedere aiuto	Allontanarsi e lasciarlo da solo, in modo da non innervosirlo, sino a quando la crisi non termina	Chiamare subito il fisioterapista
582	Una persona ha perso conoscenza ma mantiene i segni vitali (polso e respiro). L'OSS ...	La pone in posizione laterale di sicurezza chiamando subito soccorso	La mette seduta e cerca di farla bere	Inizia il massaggio cardiaco e la respirazione bocca-bocca	La pone supina e va a chiamare soccorso
583	Trovando una persona in apparente stato di incoscienza ...	Controlli il livello di coscienza chiamandola	Pratici immediatamente il massaggio	Chiedi di tirare fuori la lingua	Vai subito a chiamare il 118
584	Per un soggetto con difficoltà di masticazione devono essere scelti i seguenti alimenti, a esclusione di ...	Pasta asciutta con ragù di carne	Contorni morbidi	Pasta e fagioli	Frullato di frutta
585	Nella posizione seduta in poltrona, lo schienale deve essere mantenuto ...	Perpendicolare al sedile	Con qualsiasi inclinazione	Lievemente inclinato in avanti	Inclinato a 45°
586	Per evitare lesioni all'occhio in un paziente in coma si deve ...	Applicare frequentemente sugli occhi garze umide	Pulire sempre gli occhi con materiale sterile	Eseguire giornalmente l'igiene degli occhi con detergente	Nessuna delle altre risposte è corretta
587	Dovendo raccogliere un campione di urine per un esame colturale, occorre ...	Pulizia dei genitali, mani lavate, contenitore sterile, urine del mitto intermedio	Digiuno, pulizia dei genitali, mani lavate, contenitore sterile, urine delle 24 ore	Pulizia dei genitali, digiuno, contenitore pulito, urine del mitto iniziale	Pulizia dei genitali, mani lavate, contenitore sterile, urine del mitto finale
588	La pulizia della cute peristomale, in una persona con colostomia, deve essere eseguita con ...	Acqua e sapone neutro	Soluzione antisettica per asportare la flora batterica	Esclusivamente con soluzione fisiologica sterile	Sgrassando preliminarmente con etere per rimuovere residui di adesivo
589	Un paziente semiosciente sta vomitando. L'OSS ...	Posiziona la testa di lato	Lo lascia e chiama l'infermiere	Mette un telo sotto la testa	Cerca di alzarlo
590	Prima di indossare una mascherina monouso bisogna ...	Lavarsi le mani	Applicare della crema base sulle labbra	Detergere i baffi (nell'uomo)	Rimuovere il trucco (nelle donne)
591	Per preparare una soluzione disinfettante al 2% occorrono ...	980 cc di acqua e 20 cc di disinfettante	80 cc di acqua e 20 cc di disinfettante	80 cc di acqua e 200 cc di disinfettante	980 cc di disinfettante e 20 cc di acqua
592	Nei pazienti portatori di sondino nasale per ossigeno terapia, la pulizia del naso deve avere frequenza ...	In base al protocollo del reparto	Settimanale	Variabile	Di due volte a settimana
593	Per esami sulle feci il contenitore ...	Varia in base all'esame da effettuare sulle feci	Deve essere sempre sterile	Deve essere solo pulito	Deve essere conservato in frigo una volta raccolto il campione
594	Quando si aiuta una persona deambulare si deve ...	Fare indossare scarpe allacciate, sostenere da sotto l'ascella, far guardare in avanti	Fare indossare pantofole, sostenere dall'avambraccio, fare scivolare piano ai piedi	Sostenere sotto l'ascella, far guardare la posizione dei piedi, farsi aiutare da un familiare	Nessuna delle altre risposte è corretta
595	Quando si sposta nel letto una persona si devono compiere le seguenti azioni, tranne ...	Tenerla coperta	Evitare trazioni alle articolazioni	Evitare posizioni viziate	Non trazionare drenaggi
596	Nei trasferimenti di una persona emiplegica si deve evitare di ...	Trazionare la spalla emiplegica	Solleverare il braccio plegico in alto	Mobilizzare la spalla emiplegica	Flettere l'avambraccio sul braccio
597	Nel posizionamento di un soggetto emiplegico, è importante ...	Posizionare l'arto plegico su un cuscino	Usare una poltrona con spalliera comoda	Usare un letto comodo	Posizionare l'arto plegico su un piano rigido
598	Nell'uso del sollevatore bisogna ...	Sistemare le fasce di sostegno sotto al paziente	Fare attenzione ad utilizzarlo solo per soggetti superiori ai 120 kg	Utilizzare le fasce di sostegno solo per soggetti non infetti	Riportare il suo utilizzo nelle registrazioni assistenziali
599	Dopo aver posizionato la persona si deve ...	Assicurare che la posizione sia sicura e di gradimento del paziente	Lavare le mani	Annotare sulla documentazione l'ora e la posizione	Posizionare il campanello di chiamata a portata di mano
600	Durante la pulizia dei denti, va osservata con attenzione la presenza di ...	Sanguinamento, gonfiore e arrossamento gengivale, irritazione, infiammazione e placche biancastre nel cavo orale e sulla lingua	Esclusivamente sanguinamento, gonfiore e arrossamento gengivale	Esclusivamente irritazione, infiammazione e placche biancastre nel cavo orale e sulla lingua	Esclusivamente gonfiore
601	Prima di far camminare l'assistito col deambulatore bisogna ...	Fissare gli ascillari all'altezza idonea	Controllare il funzionamento dei freni	Far svolgere una verifica dal fisioterapista	Verificare la prescrizione del fisiatra
602	Per soccorrere immediatamente una persona contaminata da sostanza caustica bisogna indossare ...	I guanti	La mascherina specifica	Una qualsiasi mascherina	I mezzi di barriera previsti a seconda della sostanza
603	La pulizia del cavo orale del soggetto in coma risulta più sicura ed efficace se l'assistito è collocato in posizione ...	Decubito laterale, con il tronco leggermente sollevato	Decubito laterale, con la testa flessa sul tronco	Supina	Semisediata
604	Per raccogliere un campione biologico per urinocoltura bisogna ...	Dopo la pulizia dei genitali, raccogliere il getto intermedio	Scartare il primo getto e raccogliere il resto	Raccogliere il primo getto ed eliminare il resto	Dopo la pulizia dei genitali, raccogliere il primo getto
605	Un paziente incosciente che vomita deve essere posizionato ...	Con la testa di lato e un telo sotto la stessa	Semisediato con un telo davanti	Supino con un telo sotto la testa	Sulla carrozzina
606	Il sistema migliore per alzare una persona dalla poltrona è ...	Mani sotto al bacino, un piede davanti a quelli della persona, braccia dell'assistito al collo dell'operatore	Solleverare l'assistito da sotto le ascelle, far tenere le braccia lungo il corpo e le gambe divaricate	Solleverare per le braccia, piedi dell'operatore in allineamento verticale, braccia dell'assistito sulle spalle dell'operatore	Solleverare l'assistito da sotto le ascelle, inserire un piede dell'operatore tra quelli dell'assistito, braccia lungo il corpo
607	Per l'esame dell'espettorato bisogna fare espettorare il paziente ...	Al mattino a digiuno in un contenitore sterile	In un contenitore pulito	In un contenitore sterile in qualsiasi momento della giornata	Al mattino dopo colazione in un contenitore pulito

608	Per valutare la presenza di attività respiratoria l'operatore, mantenendo la testa della persona in iperestensione, deve avvicinare la guancia (abbassandosi) al naso e alla bocca della persona in stato di incoscienza e ...	Guardare se il torace della persona si alza e si abbassa ritmicamente, ascoltare la presenza di rumori respiratori, sentire il passaggio dell'aria durante gli atti respiratori (manovra di GAS)	Guardare se il torace della persona si alza e si abbassa ritmicamente, ascoltare la presenza di rumori respiratori	Guardare se il torace della persona si alza e si abbassa ritmicamente, sentire il passaggio dell'aria durante gli atti respiratori	Ascoltare la presenza di rumori respiratori, sentire il passaggio dell'aria durante gli atti respiratori
609	In caso di emiplegia o in presenza di apparecchio gessato o infusione continua, nella svestizione della persona bisogna ...	Sfilare prima la manica dell'arto sano e poi quello impedito	Sfilare la manica indifferentemente da un arto o dall'altro	Sfilare prima la manica dell'arto impedito e poi da quello sano	Nessuna delle altre risposte è corretta
610	Per il trasporto di un campione diagnostico non bisogna ...	Lasciare il materiale incustodito	Usare solo specifici contenitori	Indossare sempre i guanti	Evitare cadute
611	Per aiutare un soggetto non autosufficiente nell'assunzione del pasto non è necessario normalmente utilizzare ...	I guanti monouso	Il bicchiere	Il tavolino servitore	Le posate
612	Per mantenere la pervietà delle vie aeree bisogna ...	Sollevare il mento con due dita	Chiudere il naso dell'assistito, così che apra la bocca	Premere la fronte indietro	Eseguire la sub-lussazione della mandibola
613	Per prevenire le infezioni urinarie in un portatore di catetere vescicale è utile ...	Non manipolare i punti d'inserzione	Staccare il deflussore del catetere ogni volta che si mobilizza il paziente	Cambiare spesso la biancheria del letto	Cambiare ogni giorno la sacca di raccolta dell'urina
614	Nel primo soccorso è prioritario valutare...	La presenza dell'attività respiratoria e circolatoria	L'esistenza ed entità di una emorragia esterna	L'esistenza di una frattura delle vertebre cervicali o lombari	La presenza di ferite profonde sanguinanti
615	Nel trasferimento di una persona, gli OSS devono ...	Tutte le altre risposte sono corrette	Non inarcare mai la schiena, ma piegarsi sulle ginocchia	Non ruotare solo il tronco, ma tutto il corpo in allineamento	Non usare traverse per spostare l'assistito
616	Per prevenire il mal di schiena nelle manovre di mobilizzazione del paziente è consigliabile che l'operatore ...	Fletta le gambe e tenga dritta la schiena	Pieghe la schiena tenendo il peso vicino al corpo	Tenga le gambe ben dritte e fletta la schiena	Ruota la schiena con il carico
617	In caso di congiuntivite a un occhio, l'OSS deve evitare di utilizzare i presidi ...	Per ambedue gli occhi	Forniti dall'ospedale	Forniti dal cliente	Per l'occhio infiammato
618	La prima azione da effettuare secondo le priorità previste dall'ABC della rianimazione è ...	Assicurare la pervietà delle vie aeree	Garantire la circolazione	Assicurare la ventilazione	Assicurare la somministrazione di ossigeno
619	Il piano del letto nella posizione laterale deve essere ...	Orizzontale	A 30°	A 45°	A 60°
620	Se al paziente dà fastidio l'impacco caldo umido, si deve ...	Tutte le altre risposte sono corrette	Togliere l'impacco, osservare la cute	Riferire all'infermiere	Chiamare l'infermiere
621	La raccolta delle urine a scopo diagnostico deve incominciare ...	Al mattino a vescica vuota, scartando la prima minzione	Al mattino a vescica piena, conteggiando le urine a partire dalla prima minzione	In qualsiasi momento della giornata	Secondo la prescrizione del nefrologo
622	L'OSS esegue la _____ per la persona con colostomia	Applicazione di sacchetto per la raccolta delle feci	Sterilizzazione del sacchetto a ogni defecazione	Disinfezione della zona perineale	Applicazione di creme con solfato di argento
623	In caso di diarrea acuta in un bambino di due anni in buone condizioni cliniche bisogna ...	Reidratare con soluzioni glucoelettrolitiche per via orale	Sospendere tutti gli alimenti per 12 ore e poi iniziare una dieta in bianco	Sospendere l'assunzione di latticini	Stare a digiuno per almeno 8 ore
624	In una persona con catetere vescicale a permanenza bisogna ...	Adottare un sistema di drenaggio delle urine a circuito chiuso	Sterilizzare periodicamente il raccordo col sacchetto di drenaggio	Adoperare un sistema di drenaggio delle urine a circuito aperto	Disinfettare i tappini che si adoperano per chiudere il catetere in giornata
625	Per aiutare una persona emiplegica a scendere le scale avvalendosi di un ausilio, la corretta sequenza è ...	Ausilio - gamba plegica - gamba sana	Gamba sana - gamba plegica - ausilio	Gamba plegica - gamba sana - ausilio	Ausilio - gamba sana - gamba plegica
626	Dinanzi a una persona con crisi epilettica, l'OSS deve ...	Fare in modo che non si ferisca durante la fase convulsiva	Contenerla fisicamente	Contenerla in modo da evitarle lesioni	Lasciare che si muova come le crisi richiedono, senza contenerla
627	Per aiutare l'espettorazione del catarro si deve ...	Tutte le altre risposte sono corrette	Mobilizzare la persona	Aiutarla a tossire	Favorire l'assunzione di liquidi
628	Per far mantenere la posizione laterale nel letto a una persona non autosufficiente bisogna mettere un cuscino sotto la testa ...	Uno dietro la schiena, uno fra le gambe, uno come appoggio per l'arto superiore	Uno davanti al torace, uno dietro ai glutei	Uno sotto i glutei, uno sotto i piedi, uno sotto la spalla adagiata sul piano del letto	Uno davanti all'addome, uno sotto le anche, uno sotto i piedi
629	Al momento dell'alzata dal letto di una persona, dopo alcuni giorni di immobilità, è appropriato ...	Tenerla seduta sul bordo del letto per qualche minuto controllando la comparsa di eventuali alterazioni	Valutare il colorito cutaneo e metterla subito seduta su una sedia idonea	Tenerla almeno 10 minuti in posizione semiseduta	Valutare la frequenza del respiro e lo stato di idratazione della cute e delle mucose visibili
630	La carrozzina a rotelle per alzare una persona emiplegica dal letto si posiziona dalla parte ...	Sana in corrispondenza della testata o della pediera del letto	Plegica in corrispondenza della pediera del letto	Plegica in corrispondenza della testata del letto	Tutte le altre risposte sono corrette
631	Gli aghi delle siringhe dopo l'utilizzo devono essere ...	Rincappucciati o piegati	Smaltiti nei rifiuti ordinari	Smaltiti nel contenitore per rifiuti taglienti	Tolti dalla siringa e posti nel contenitore specifico
632	L'intervento del soccorritore nel corso di una crisi epilettica si realizza attraverso azioni semplici finalizzate a contenere ulteriori danni alla persona ... (indicare l'affermazione errata)	Cercare di tenere ferma la persona durante la crisi per evitare che si faccia male	Se possibile mettere in bocca alla persona un oggetto morbido per evitare la morsicatura e la caduta all'indietro della lingua	Accompagnare a terra la persona (se ci si accorge che sta iniziando la crisi)	Allontanare dalla persona tutti gli oggetti contundenti
633	In caso di infortunio da taglio o puntura è fondamentale ...	Aumentare il sanguinamento e lavare con acqua e sapone disinfettante e amuchina al 10%	Lavare con acqua e sapone disinfettante	Lavare abbondantemente con acqua o soluzione fisiologica e amuchina al 5%	Lavare abbondantemente con acqua corrente

634	Nel lavaggio dei capelli a letto il piano del letto deve essere ...	Portato a livello più elevato	Perfettamente orizzontale	Portato a livello più basso	Perfettamente obliquo
635	Per eseguire la pulizia delle orecchie è necessario inumidire una compressa di garza o una salvietta con acqua e con l'angolo ritorto delle medesime rimuovere l'eccesso di cerume tirando leggermente il padiglione auricolare ...	Verso il basso	Verso l'esterno	Sia verso l'esterno che verso l'alto	Verso l'alto
636	Nella pulizia dei denti i movimenti rotatori del polso devono essere eseguiti da ...	Il margine gengivale al margine incisivo	La superficie masticatoria al margine gengivale	Il margine incisivo al margine gengivale	Il margine gengivale alla superficie masticatoria
637	La pulizia del cavo orale nella persona portatrice di protesi dentaria deve essere attuata ...	Dopo aver rimosso la protesi	Senza rimuovere la protesi	Prima di rimuovere la protesi	Con accuratezza cercando di non far rimuovere la protesi
638	Per effettuare correttamente l'igiene perineale nell'uomo ...	Si deve scoprire il prepuzio	Non si deve scoprire il prepuzio	E' indifferente	Non si deve scoprire il prepuzio e si deve usare la soluzione fisiologica
639	Nell'uomo l'igiene dei genitali deve essere realizzato procedendo con movimenti circolari ...	Dal meato urinario verso l'esterno	Dall'esterno verso il meato urinario	Dal glande verso la base del pene	Dall'esterno verso la base del pene
640	Nella donna l'igiene dei genitali deve essere eseguita ...	Ritraendo delicatamente le labbra e procedendo dall'orifizio uretrale a quello vaginale	Con delicati movimenti laterali che garantiscono l'igiene	Ritraendo delicatamente le labbra e procedendo dall'orifizio vaginale a quello uretrale	Ritraendo delicatamente le labbra e procedendo dall'orifizio uretrale verso le piccole labbra
641	La zona perineale deve essere asciugata ...	Tamponando	Frizionando	Massaggiando	Strofinando
642	Nella posizione supina l'avambraccio ...	Va esteso e il gomito leggermente flesso. Il polso deve essere in posizione supina ed esteso e la mano aperta	E il gomito vanno leggermente flessi. Il polso deve essere leggermente flesso e la mano aperta	Va esteso e il gomito leggermente flesso. Il polso deve essere in posizione supina ed esteso e la mano chiusa	E il gomito vanno leggermente flessi. Il polso deve essere leggermente flesso e la mano chiusa
643	Nella posizione seduta testa e tronco devono essere allineati e la testata del letto sollevata a ...	60 gradi	45 gradi	90 gradi	30 gradi
644	Gli arti inferiori nella posizione seduta devono essere ...	Allineati	Leggerementi flessi	Allineati o leggermente flessi	Non allineati e leggermente flessi
645	Nella posizione semiprona dell'arto inferiore che sta sopra va sostenuto da un cuscino con il ginocchio ...	Flesso e l'altro esteso	Flesso e l'altro arto deve essere flesso	Non flesso	Esteso e l'altro esteso
646	Nella respirazione artificiale il numero delle insufflazioni da eseguire in sequenza è di ...	Due	Tre	Quattro	Cinque
647	In assenza di attività cardiaca è necessario eseguire un massaggio cardiaco esterno. La posizione della persona infortunata è supina su ...	Un piano rigido	Qualsiasi tipo di piano	Pavimento	Un piano non rigido
648	Nel massaggio cardiaco esterno bisogna eseguire _____ compressioni toraciche	Trenta	Cinque	Dieci	Venti
649	Nell'incontinenza contraddistinta da perdita di urina dovuta all'incapacità di ritardare la minzione dopo la percezione di vescica piena, si deve ...	Curare l'igiene personale e ambientale, fornire la comoda facilmente raggiungibile, regolare l'altezza del letto e ridurre i tempi di percorrenza verso la toilette	Facilitare il riorientamento della persona e ridurre i tempi di percorrenza verso la toilette	Far ascoltare acqua corrente, ridurre i tempi di percorrenza verso il bagno	Portare la persona in bagno a intervalli regolari, regolare l'altezza del letto e ridurre i tempi di percorrenza verso la toilette
650	Cosa si analizza con l'indice di Barthel?	Il livello di autonomia nelle attività di vita quotidiana	Il livello di demenza	Il rischio di lesione da pressione	Il livello di coscienza
651	_____ non è/sono da considerarsi un dispositivo di protezione individuale	Il sollevatore	I guanti monouso	Le calzature	Il camice
652	Con alimentazione per via enterale si intende ...	Quella artificiale effettuata tramite un sondino	Il regime alimentare ipocalorico	Il regime alimentare per pazienti affetti da avitaminosi	Quella artificiale per via venosa
653	Si parla di decubito ortopnoico quando ...	La persona per dormire ha bisogno di due/tre cuscini e deve stare in posizione semi seduta	Il soggetto per dormire ha bisogno di tenere le gambe alzate in una posizione più elevata rispetto alla testa	Il soggetto per dormire ha bisogno di stare coricato su un fianco con le gambe flesse vicino al corpo	La persona per dormire ha bisogno dell'ausilio alzacoperse
654	L'OSS ...	Può accedere alla documentazione clinica di un paziente e può anche inserire annotazioni su osservazioni e problemi rilevati	Non può accedere alla documentazione clinica di un paziente	Può solo visionare la documentazione clinica di un paziente	Può visionare la documentazione clinica solo per motivi importanti
655	Uno strumento si può definire sterile quando esiste una probabilità su ...	1.000.000 che sia contaminato da agenti microbici	10 che sia contaminato da agenti microbici	1.000.000.000 che sia contaminato da agenti microbici	1.000 che sia contaminato da agenti fisici
656	Per _____ non è giustificato l'isolamento del paziente	L'aspergilloso	La rosolia	La tubercolosi	Il COVID-19
657	Tra le seguenti sostanze chimiche _____ si adopera per la sanificazione	Il detergente	L'antibatterico	L'antisettico	Il disinfettante
658	Il più importante veicolo di infezione ospedaliera è/sono ...	Le mani dell'operatore	Le lenzuola e gli effetti personali del paziente	L strumentazione sanitaria	La strumentazione informatica
659	I microrganismi patogeni sono responsabili delle malattie infettive ...	Sempre	Non sempre	In nessun caso	Dipende dalla persona

660	La pulizia, se effettuata correttamente, riduce la concentrazione della carica batterica presente nell'ambiente considerato di circa il ___ %	80	40	60	100
661	Le principali vie di trasmissione delle malattie infettive sono ...	Le vie aeree, oro fecale, parenterale	I frutti di mare e l'acqua inquinata	Da malato a sano, da portatore a sano	Per inquinamento atmosferico
662	Per materiale riutilizzabile si intende materiale ...	Che può essere usato più volte, previo adeguato trattamento che lo renda riutilizzabile in condizioni di sicurezza	Anche monouso, che prima di essere riutilizzato, venga sottoposto a sterilizzazione	Che può essere usato più volte, previo adeguato trattamento che lo renda riutilizzabile in condizioni di sicurezza. Se monouso, è bene che dopo il trattamento venga usato solo su pazienti a rischio normale	Che può essere usato più volte, previo adeguato trattamento che lo renda riutilizzabile in condizioni di sicurezza. Se monouso può essere sterilizzato solo una volta
663	_____ è un'intossicazione di tipo alimentare	Tutte le altre risposte sono corrette	Il botulismo	La salmonellosi	L'epatite da virus A
664	La penicillina si ricava da ...	Un fungo	Una pianta	Un virus	Un batterio
665	I batteri sono ...	Microrganismi che possono causare infezioni	Microrganismi sempre pericolosi	Microrganismi con cellula molto complessa	Microrganismi che vivono solo in assenza di ossigeno
666	La vaccinazione rientra nella prevenzione ...	Primaria	Terziaria	Secondaria	Nessuna delle altre risposte è corretta
667	In autoclave si raggiunge solitamente la temperatura di ...	121°	80°	100°	110°
668	Nel caso in cui le confezioni di garze sottoposte a processo di sterilizzazione si presentino umide, bisogna ...	Confezionare nuovamente le garze e sottoporle a nuovo ciclo di sterilizzazione	Attendere che le confezioni asciughino prima dell'utilizzo	Contattare il medico in turno	Nessuna delle altre risposte è corretta
669	L'utilizzo di guanti monouso durante le manovre assistenziali ...	Nessuna delle altre risposte è corretta	Sostituisce il lavaggio delle mani	Riduce la frequenza del lavaggio delle mani	Non è importante
670	Sul contenitore per rifiuti pericolosi a rischio infettivo prima del suo allontanamento deve essere riportato ...	Tutte le altre risposte sono corrette	La data di confezionamento	Il reparto/servizio, ASL/AO	La data e la firma dell'impiegato in turno
671	I microrganismi saprofiti ...	Si nutrono di sostanze morte di cui provocano e accelerano la decomposizione	Traggono il proprio nutrimento sfruttando altri organismi viventi, detti ospiti, che vengono da loro lentamente danneggiati	Sono in grado di sintetizzare molecole organiche complesse partendo da molecole inorganiche semplicissime	Sono batteri
672	Il soggetto che ospita stabilmente o temporaneamente il microrganismo pur non sviluppando la malattia è un portatore ...	Sano	Precoce	malato	Convalescente
673	La pediculosi è un'infestazione di pidocchi che può interessare ...	I capelli, la zona pubica, tutto il corpo	Solo i capelli	Solo la zona pubica	Solo il genere femminile
674	Il lavaggio delle mani può essere sociale, antisettico e chirurgico. La differenza tra i vari tipi di lavaggio è ...	La durata del lavaggio, le modalità, il prodotto utilizzato	il prodotto utilizzato, il luogo in cui avviene il lavaggio	La durata del lavaggio, il prodotto utilizzato	Nessuna delle altre risposte è corretta
675	Per favorire la prevenzione oltre a lavare le mani ...	Le unghie devono essere tenute corte e pulite, non deve essere utilizzato lo smalto per le unghie e non devono essere utilizzati anelli, bracciali e orologi	Non deve essere utilizzato lo smalto per le unghie e devono essere indossati anelli, bracciali e orologi con la superficie liscia	Sulle unghie deve essere utilizzato solo lo smalto di colore	Si possono utilizzare solo anelli, bracciali e orologi d'oro
676	In caso di ferite la vaccinazione consigliata è ...	Antitetanica	Antidifterica	Antiepatite	Antipoliomelite
677	Per spettro antibiotico si intende ...	L'insieme di agenti patogeni sensibili all'azione di un antibiotico	Il tempo che l'antibiotico impiega per raggiungere la sua massima efficacia,	L'insieme di agenti patogeni resistenti ad un determinato antibiotico	Il tempo durante il quale un antibiotico rimane in circolo a dosi terapeutiche
678	Per evitare la moltiplicazione da legionella, l'acqua potabile deve rimanere alla temperatura di ...	Acqua fredda < 20°C e acqua calda > 60°C	Acqua fredda = 25°C e acqua calda > 50°C	Acqua fredda = 0°C e acqua calda > 45°C	Acqua fredda < 20°C e acqua calda = 45°C
679	In caso di puntura accidentale l'operatore deve sottoporsi ad accertamenti sanitari ...	Sempre	Solo se l'ago è stato usato per un paziente sieropositivo al virus HIV	Solo se l'ago è stato usato per un paziente appartenente ad un paziente di una categoria a rischio di infettarsi con il virus HIV	Solo se l'ago è contaminato di sangue
680	Requisiti fondamentali di un disinfettante sono ... (indicare l'affermazione errata)	Inattività in presenza di sostanze organiche	Assenza di tossicità	Innocuità nei confronti dei vari materiali di trattare	Costo limitato
681	_____ si è dimostrata particolarmente efficace nel ridurre l'incidenza di infezioni delle vie urinarie in pazienti con catetere a permanenza	L'adozione di un sistema di drenaggio chiuso	La separazione dei pazienti infetti dai non infetti	L'irrigazione routinaria della vescica con preparati antibiotici	Cambiare ogni 3 giorni il catetere
682	Il test di Bowie e Dick è un ...	Test che serve a verificare l'affidabilità delle autoclavi con il controllo giornaliero	Test allergico	Test di gravidanza	Ausilio protesico
683	I dispositivi di protezione individuale servono ...	A proteggere l'operatore dai rischi infettivi	A proteggere il paziente dai rischi infettivi	Puramente a livello estetico	A mantenere la termogenesi
684	I fattori che condizionano l'attività di un disinfettante sono ...	La concentrazione, il tempo di contatto, la carica microbica, la temperatura d'uso	La carica microbica, la concentrazione, la diluizione, la temperatura	La concentrazione, il tempo di contatto, la temperatura	Solo la concentrazione
685	La flora residente nella cute di una mano è ...	Non patogena	Inesistente	Patogena	Nessuna delle altre risposte è corretta
686	Lo screening è un'indagine che permetta ...	L'identificazione di una malattia o alterazione in fase preclinica	L'identificazione di una malattia o alterazione in fase conclamata	L'identificazione di una malattia o alterazione in fase post-operatoria	Nessuna delle altre risposte è corretta
687	_____ non espone/espongono a rischio professionale di contrarre un'infezione ematogena	Le lacrime	Il sangue	Lo sperma	La secrezione vaginale

688	La polvere va asportata a umido utilizzando la scopa a trapezio e la garza monouso. La scopa non va ...	Sollevata, ma strisciata con dei movimenti ad "S" dall'interno verso l'esterno della stanza	Strisciata, ma sollevata con dei movimenti orizzontali all'esterno verso l'interno della stanza	Sollevata, ma strisciata con dei movimenti verticali all'interno verso l'esterno della stanza	Sollevata, ma strisciata con dei movimenti indifferentemente dall'interno o dall'esterno della stanza
689	L'identificazione del livello del rischio, eliminazione o riduzione dell'esposizione e continuo monitoraggio del livello di rischio individuale e collettivo viene detto ...	Risk management	Educazione sanitaria	Promozione della salute	Risk assessment
690	Il test di Bowie-Dick per la verifica della sterilizzazione a vapore rientra tra i controlli periodici di tipo ...	Fisico	Biologico	Chimico	Radioattivo
691	Il processo che porta alla valutazione e alla misura degli effetti sulla salute di un fattore di rischio si dice ...	Risk assessment	Risk management	Informazione sanitaria	Educazione sanitaria
692	Il processo che conferisce alle popolazioni i mezzi per assicurare un maggior controllo sul loro livello di salute e migliorarlo si dice ...	Promozione della salute	Risk assessment	Risk management	Informazione sanitaria
693	_____ non rientra nelle vaccinazioni obbligatorie dell'infanzia	La meningite da Haemophilus influenzae	La difterite	La poliomelite	Il tetano
694	Per microclima si intende temperatura, ...	Umidità e ventilazione di una stanza	Umidità, ventilazione e illuminazione di una città	Umidità, ventilazione e illuminazione di un quartiere	Umidità di una stanza
695	Per precauzioni standard si intendono ...	Le precauzioni da adottare per tutti i pazienti	Le precauzioni da adottare in caso di pazienti infetti	Le precauzioni da adottare in caso di pazienti in isolamento per malattie a trasmissione cutanea	Nessuna delle altre risposte è corretta
696	Il lavaggio delle mani va fatto ...	Tutte le altre risposte sono corrette	Prima e dopo ogni manovra sul paziente	Quando si viene a contatto con materiali biologici	Quando si viene a contatto con oggetti contaminati
697	Il rischio infettivo per chi maneggia biancheria sporca può verificarsi ...	Durante la raccolta e il trasporto	Solo durante la raccolta	Solo durante il trasporto	Nessuna delle altre risposte è corretta
698	Per trasportare un paziente con sospetto di meningite batterica, oltre ai guanti è indispensabile prevenire il contagio utilizzare ...	La mascherina per evitare la trasmissione per via aerea	Solo gli occhiali per evitare la trasmissione attraverso le congiuntive	Il copricapo	Il camice
699	La vaccinazione antipneumococcica ...	Si effettua a partire dal 3° mese col vaccino coniugato	Si effettua dopo i 2 anni	Non è raccomandata	Si effettua a partire dal 3° mese con tutti i vaccini in commercio
700	Nel trattamento dei ferri chirurgici, _____ non risulta inefficace per disattivare il virus HIV	Il trattamento in autoclave	La disinfezione con alcool etilico al 40% per 5-10 minuti	La bollitura a 56° C e per 20 minuti	La disinfezione con acido acetico
701	Ridurre _____ è lo scopo della prevenzione terziaria	L'entità dei danni causati dalla malattia	la durata della malattia	L'incidenza della malattia	L'entità dei danni causati dai farmaci
702	Le reazioni al vaccino vivo antimorbilloso intervengono ...	Nei 6-8 giorni successivi all'iniezione	Entro 3 giorni	Entro 4 ore	Entro 8 ore
703	L'epidemiologia di una malattia è ...	La distribuzione sociale della malattia	Il periodo che passa dal contagio alla manifestazione della malattia	La tecnica per prevenire la malattia	La modalità di diffusione della malattia
704	La malattia infettiva è una malattia ...	Trasmisibile da un individuo all'altro	Tipica dei bambini	Che si diffonde rapidamente	Che ha bisogno di un organismo ospite
705	I batteri sono organismi ...	Unicellulari	Pluricellulari ad RNA	Pluricellulari ad RNA e DNA	Pluricellulari a DNA
706	I principali presidi diagnostici nelle malattie infettive sono ...	Visualizzazione ed isolamento dell'agente patogeno	Anamnesi	Esame emocromocitometrico	Esame delle urine
707	Le categorie immuni dall'AIDS sono ...	Nessuna	Gli eterosessuali	Coloro che si astengono dai rapporti sessuali	I maschi
708	_____ è contagioso il morbillo	Da due giorni prima a due giorni dopo la comparsa dell'esantema	Durante tutta la fase esantematica	Durante la fase di incubazione	Non appena compare l'esantema
709	_____ è/sono la profilassi della malaria	La chemioprolifassi	La vaccinoprolifassi	La sieroprolifassi	I farmaci antivirali
710	Nei "rifiuti speciali ospedalieri" sono compresi ...	Tutte le altre risposte sono corrette	Le medicazioni	Le piccole parti anatomiche provenienti da interventi chirurgici	I rifiuti provenienti dal laboratorio di analisi
711	La denuncia dei casi di gonorrea è ...	Obbligatoria	Non obbligatoria	Facoltativa	Discrezionale del medico curante
712	_____ è lo scopo della prevenzione primaria	Ridurre l'incidenza della malattia	Minimizzare le complicanze	Ridurre la durata della malattia	Ridurre gli effetti della malattia
713	La denuncia di malattia infettiva va presentata ...	All'ASL	Alla Polizia di Stato	Al medico provinciale	All'Ufficio di Igiene-Servizio d'Igiene
714	I vaccini polivalenti sono vaccini ...	Formati da ceppi differenti dello stesso genere	Formati da germi di differenti malattie	Somministrabili in più dosi	Ottenuti da virus attenuati
715	Microrganismi e spore resistenti a 100°C vengono uccisi solo con la ...	Sterilizzazione	Bollitura	Nessuna delle altre risposte è corretta	Pastorizzazione
716	L'agente responsabile dell'AIDS è un ...	Virus	Batterio	Insetto	Protozoo
717	I vaccini misti sono ...	Formati da germi di malattie differenti	Costituiti da germi e antibiotici	Formati da ceppi diversi di una stessa specie	Costituiti da germi e da farmaci anti-infiammatori
718	Le spore batteriche sono ...	Forme resistenti	Una fase della riproduzione	Un sistema di trasmissione	Una forma occasionale
719	Esistono _____ categorie di portatori	Tre	Due	Cinque	Quattro
720	La vaccinazione antitetanica viene fatta con ...	Anatossina	Virus attenuato	Batterio ucciso	Virus ucciso
721	Per la sterilizzazione dei ferri chirurgici si utilizza ...	Ossido di etilene	Clorexidina	Ammonio quaternario	Alcool al 70%
722	_____ non si usa per la disinfezione dell'acqua	L'alcool	Il cloro	L'ozono	L'etere
723	_____ non è una caratteristica dell'acqua	Densa	Incolore	Inodore	Insapore
724	_____ è la sorgente d'infezione della tubercolosi	L'uomo	La zanzara	Il cane	Il gatto
725	La reazione di Mantoux si ha nella ...	Tubercolosi	Malaria	Difterite	Rosolia

726	La vaccinazione antidifterica si pratica in associazione alla vaccinazione	Antitetanica	Antipoliomielitica	Antivaiolosa	Antirosolia
727	La valutazione della dermoreazione alla Mantoux va eseguita dopo ____ ore dall'inoculazione	48	8	4	18
728	La vaccinazione antimorbillosa è consigliabile ...	A tutti intorno al 15° mese di vita	Solo nei soggetti a rischio	Nessuna delle altre risposte è corretta	Dopo i tre anni
729	Gli arredi di un unità di degenza devono essere ...	Pratici e semplici da pulire	Colorati per creare un ambiente più accogliente	Pratici per creare un ambiente più accogliente	Facilmente smontabili
730	_____ è l'altezza minima di un letto di degenza	50 cm	30 cm	35 cm	70 cm
731	_____ è il tessuto più adatto per le lenzuola del malato	Il cotone	qualunque tessuto impermeabile	Il lino	La fibra sintetica
732	Le dimensioni di una traversa sono ...	Circa mezzo lenzuolo	Uguali a quelle del cuscino	Il doppio di un lenzuolo	Devono coprire l'intero materasso
733	La temperatura ottimale della stanza di un malato deve essere ...	Tra 18 e 25 °C	Tra 10 e 15 °C	Tra 22 e 28 °C	Non superiore ai 30 °C
734	Le dimensioni standard di un letto per adulti sono ...	200 x 90 cm	220 x 100 cm	170 x 70 cm	150 x 70 cm
735	Il tasso ottimale in una stanza di un paziente deve essere ...	Tra 30 e 60 %	Inferiore al 20%	Superiore all'80%	al 100%
736	L'asepsi è ...	L'insieme delle tecniche e delle norme per evitare la contaminazione	Un' infezione batterica	La contaminazione dell'organismo da parte di agenti patogeni	Un' infezione del circolo sanguigno
737	La sterilizzazione è ...	L'insieme delle tecniche volte all'eliminazione di tutti i microrganismi	L'insieme delle tecniche volte all'eliminazione delle spore	L'insieme delle tecniche volte all'eliminazione dei virus	La disinfezione di una lesione cutanea
738	Lo spazio previsto per uno spazio letto per adulti è pari a ...	7 mq	2 mq	5 mq	10 mq
739	L'altezza delle camere di degenza non deve essere inferiore a ...	3,2 m	2 m	2,5 m	4 m
740	Una stanza di degenza deve prevedere _____ tipi di illuminazione	Tre	Quattro	Due	Sei
741	_____ non è posto necessariamente accanto al letto dell'assistito	L'interruttore dell'abat-jour	Il campanello per chiamare l'assistenza	La presa del telefono	La presa di corrente
742	La pulizia dell'ambiente in cui è ospitata la persona avviene ...	Prima della disinfezione	Dopo la disinfezione	Contestualmente alla disinfezione	Indipendentemente dal momento in cui viene effettuata la disinfezione
743	La prima fase del processo di sterilizzazione è ...	La decontaminazione	La pulizia manuale del materiale riutilizzabile	L'asciugatura del materiale oggetto di sterilizzazione a vapore	Il confezionamento in packstage asettici
744	La disinfezione è ...	Il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni	Il processo per la sterilizzazione a caldo degli strumenti medici	Il complesso di procedimenti e operazioni atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero di popolazione dei ratti o dei topi	Il processo per la sterilizzazione a freddo degli strumenti medici
745	La disinfezione può essere eseguita con mezzi ...	Fisici, chimici o gassosi	Fisici	Chimici	Gassosi
746	I disinfettanti fisici sono ...	Luce, calore e freddo	Acido cloridrico e acido solforico	La formaldeide e l'anidride solforosa	Il cromo e il bromo
747	Si può detergere con soluzione fisiologica una ferita saturata e pulita?	Si	Si, ma prima con clorexidina	No	Si, ma dopo con cloridina
748	Il calore umido viene adoperato per ...	La disinfezione attraverso l'azione del vapore	Disinfettare le acque stagnanti	Distruggere i parassiti intestinali dell'uomo e degli animali	Evitare la decomposizione delle sostanze
749	I presidi trattati con ossido di etilene devono essere ...	Sottoposti a trattamento di degassificazione	Estratti dalla confezione almeno un'ora prima del loro utilizzo	Sciacquati con soluzione fisiologica prima dell'uso	Sciacquati con soluzione glucosata prima dell'uso
750	La disinfezione gassosa con formaldeide è indicata per la disinfezione ...	Terminale dell'ambiente in cui ha soggiornato un ammalato e di oggetti delicati che verrebbero danneggiati se sottoposti ad altri sistemi di disinfezione	Della strumentazione operatoria	Delle ferite profonde sporche di terriccio	Disinfezione terminale delle piaghe da decubito
751	Identificare l'affermazione corretta	I guanti sono un importante mezzo di prevenzione	I guanti in vinile sono meglio tollerati dagli operatori che soffrono di allergie cutanee	L'uso dei guanti riduce la necessità e la frequenza del lavaggio delle mani	I guanti in lattice sono meglio tollerati dagli operatori sanitari
752	Il termine "comfort" significa ...	La sensazione di benessere psicofisico derivato dall'ambiente e dalle relazioni con persone	L'equilibrio dei parametri vitali	La condizione generale di salute	La condizione specifica di salute
753	Per la persona allettata con problemi cronici respiratori, è giusto garantire ...	Il ricambio dell'aria con temperatura ambientale di circa 20-22 °C	L'umidificazione dell'aria con temperatura ambientale di circa 16-21 °C	L'umidificazione dell'aria con temperatura ambientale di circa 22-26 °C	Il ricambio dell'aria con temperatura ambientale di circa 23-29 °C
754	Per la sanificazione si adoperano ...	Detergenti	Disinfettanti	Antibatterici	Antisetici
755	E' caratteristico della flora transitoria cutanea ...	Essere rimossa col semplice lavaggio	Non sopravvivere	Essere scarsamente virulenta	Non essere rimossa col semplice lavaggio
756	Per "prevenzione secondaria" si intende ...	La diagnosi precoce di una malattia	La rimozione dei fattori di rischio ambientale	Gli interventi mirati a prevenire le infezioni ospedaliere	La rivelazione precoce delle complicanze di una malattia
757	Le infezioni ospedaliere si ...	Contraggono in ospedale	Manifestano solo in ospedale	Contraggono solo in comunità	Manifestano solo in comunità

758	Il microclima di una stanza di degenza è determinato da diversi fattori. _____ non svolge un'azione determinante	L'illuminazione	Il riciclo di aria	L'umidità	La temperatura
759	L'organismo che ospita un microrganismo patogeno ma non sviluppa la malattia è un portatore ...	Sano	Convalescente	Cronico	Malato
760	L'umidificatore per l'ossigeno terapia va ...	Disinfettato in base al protocollo di servizio	Disinfettato al termine dell'uso	Disinfettato prima e dopo l'uso	Riempito con regolarità
761	_____ non è corretto per la buona riuscita della disinfezione	Conservare il prodotto in luoghi caldi ed asciutti	Mantenere la soluzione antisettica nel proprio contenitore	Tenere il contenitore sempre ben chiuso	Mantenere la soluzione antisettica sterile
762	_____ non è un principio della corretta sanificazione	Pulire prima le superficie verticali e poi quelle orizzontali	Aprire le finestre prima della sanificazione	Spolverare con panni asciutti e umidi	Calzare corpicarpe per la pulizia del pavimento
763	La _____ elimina i microrganismi patogeni e non le spore	Disinfezione	Sterilizzazione	Detersione	Disinfestazione
764	Le malattie infettive in quanto dovute a microrganismi viventi capaci di moltiplicarsi sono dette anche malattie contagiose poiché ...	Tutte le altre risposte sono corrette	Esiste una fonte di infezione	I microrganismi sono eliminati nell'ambiente	Si trasmettono da un individuo all'altro
765	La sanificazione è la riduzione della ...	Carica batterica in un ambiente confinato	Carica virale in un ambiente confinato	Carica infettante in un ambiente confinato	Polvere in un ambiente confinato
766	Il termine "decontaminazione" indica ...	Tutte le manovre atte a rendere sicuro l'uso di un oggetto	L'abbattimento della carica virale su una superficie	La riduzione di microrganismi su cute e oggetti	La diminuzione di radioisotopi su cute e oggetti
767	Le spore si eliminano dai materiali metallici attraverso la ...	Sterilizzazione	Decontaminazione	Disinfezione	Antisepsi
768	Un detergente è una sostanza ...	Chimica che diminuisce la tensione superficiale favorendo l'asportazione dello sporco	Chimica che impedisce la moltiplicazione dei germi patogeni	Chimica che facilita la pulizia senza ridurre la carica microbica	Naturale che rinforza le difese cutanee della persona
769	_____ può favorire l'efficacia di un disinfettante	Nessuna delle altre risposte è corretta	Il calore del disinfettante	La quantità di disinfettante utilizzato	La presenza di sporco sulla superficie
770	Un antisettico è un prodotto per la ...	Disinfezione della cute	Sterilizzazione degli oggetti	Disinfezione di oggetti e superfici	Sterilizzazione della cute e degli oggetti
771	_____ può essere affidata all'OSS	La sterilizzazione dei ferri chirurgici in sala operatoria	L'organizzazione dello strumentario della sala operatoria	La revisione delle istruzioni operative relative ai processi interni della sala operatoria	Il monitoraggio dell'efficienza dello strumentario della sala operatoria
772	La prevenzione primaria si rivolge alla popolazione ...	Nel suo complesso	Non autosufficiente	Infantile	Anziana
773	Dopo che l'operatore è venuto a contatto con materiale biologico il lavaggio delle mani deve essere effettuato con prodotto ...	Antisettico	Detergente	Disinfettante	Saponoso e acqua
774	Quando si toglie la mascherina monouso ...	Si deve smaltire subito	Si può tenere al collo e si riutilizza ancora	Non si deve tenere a contatto con le restanti parte del corpo	Nessuna delle altre risposte è corretta
775	La prevenzione secondaria si rivolge a ...	Particolari gruppi di popolazione con fattori di rischio per alcune malattie	Tutta la popolazione con fattori di rischio per alcune malattie ereditarie	Tutta la popolazione	Tutti i lavoratori
776	I fattori più rilevanti della sterilizzazione a caldo umido sono ...	Tempo, temperatura, pressione	Vapore, temperatura	Tempo, pressione, umidità	Temperatura, umidità, pressione
777	_____ può contaminare una soluzione disinfettante	Lasciare aperta la confezione dopo l'uso	Esporre il disinfettante a fonti di luce	Esporre il disinfettante a fonti di calore	Tutte le altre risposte sono corrette
778	L'isolamento ...	Separa chi ha malattie infettive dalla collettività	Viene attuato solo per alcune malattie tropicali	Viene deciso dal medico in base al contesto di vita della persona	Viene attuato solo per alcune malattie genetiche
779	I dispositivi di protezione individuale servono ...	Proteggere gli operatori da rischi infettivi	Mantenere sterili i presidi chirurgici	Tutte le altre risposte sono corrette	Proteggere i malati da rischi infettivi
780	Un oggetto è sterile se privo di ...	Qualsiasi microrganismo o spora	Alghe e funghi	Microrganismi patogeni	Microrganismi saprofiti
781	Nell'esame colturale di materiale biologico si procede alla ricerca ...	Di microrganismi patogeni	Di sangue	Di cellule tumorali	Del valore del Ph
782	La sterilizzazione con _____ è la tecnica di elezione per i materiali termolabili	Ossido di etilene o gas plasma	Calore secco	Vapore saturo sotto pressione	Tutte le altre risposte sono corrette
783	I ferri chirurgici impiegati prima della sterilizzazione devono essere ...	Decontaminati e poi puliti	Puliti e poi disinfettati	Trattati dal personale ausiliario	Immersi nell'alcol
784	Nella procedura della pulizia quotidiana della stanza di degenza non si deve ...	Disinfettare tutte le superfici	Adoperare un panno umido	Evitare di sollevare la polvere	Rimuovere i liquidi organici
785	Per disinfettare una superficie si ...	Deterge la superficie e quindi si disinfetta	Passa il disinfettante con un panno umido	Usa un detergente non diluito, che così ha effetto disinfettante	Usa un disinfettante adatto alle superfici
786	La biancheria sporca di un paziente in isolamento deve essere ...	Tutte le altre risposte sono corrette	Collocata in sacchi specifici	Rimossa con guanti monouso	Collocata in sacchi contrassegnati con la scritta "Materiale potenzialmente infetto"
787	La prevenzione primaria consiste nel/nella ...	Rimuovere i fattori di rischio nella popolazione	Ricovero precoce in ospedale	Diagnosi precoce di malattia	Attivazione di programmi riabilitativi
788	La salmonellosi si trasmette per via ...	Oro-fecale	Respiratoria	Cutanea	Ematica
789	_____ sono dette infezioni ospedaliere	Le infezioni che la persona contrae durante la degenza in ospedale e che possono manifestarsi anche dopo la dimissione	Le malattie determinate dalla presenza di microrganismi nella persona	Le malattie infettive favorite dalle condizioni legate alla persona ricoverata in ospedale	Le infezioni che la persona contrae durante la degenza in ospedale e che possono manifestarsi solo durante il ricovero
790	La padella va disinfettata ...	Dopo ogni defecazione	In caso di feci infette	In base alle indicazioni della casa produttrice	In caso di malattie infettive
791	_____ vanno smaltiti nei rifiuti speciali	I sondini naso-gastrici	Le siringhe da 30 cc	Gli assorbenti per adulti	I residui di alimenti derivanti dai pasti

792	Con il lavaggio sociale delle mani eseguito correttamente si rimuovono ...	Lo sporco e i microrganismi normalmente non residenti sulla cute	Solo i microrganismi patogeni	Lo sporco e i microrganismi normalmente residenti sulla cute	Solo i microrganismi normalmente residente sulla cute
793	Nell'effettuazione dell'igiene ambientale è essenziale ...	Effettuare la spolveratura a umido	Usare esclusivamente materiale monouso	Fare uscire tutti i degenti dalla stanza	Risciacquare sempre le superfici lavate con un detergente
794	Con l'autoclave non è possibile sterilizzare ...	Fibre ottiche	Strumenti e ferri chirurgici	Materiale tessile	Garze
795	Nelle infezioni ospedaliere sono vie di contagio indiretto ...	Tutte le altre risposte sono corrette	Gli alimenti	Gli strumenti a uso diagnostico	Il materiale di medicazione
796	_____ sono da considerare un rifiuto sanitario a rischio infettivo	Le garze sporche di medicazione	I residui di farmaci	I flaconi fleboclisi vuoti	I termometri rotti
797	Un disinfettante non presenta ...	Inattività in presenza di sostanze organiche	Potere battericida	Ampio spettro di azione	Assenza di tossicità
798	Per un corretto trattamento del materiale da sterilizzare non occorre ...	Sciaccarlo, farlo sgocciolare, ma lasciando un certo grado di umidità residua	Confezionare il materiale secondo il protocollo	Lasciare il materiale in immersione con il detergente, poi spazzolarlo e asciugarlo	Eseguire separatamente le operazioni di pulizia e confezionamento
799	_____ sono "rifiuti speciali ospedalieri"	Tutti i rifiuti potenzialmente infetti o venuti a contatto con secreti, escreti o sangue	Tutti i rifiuti dell'ambiente ospedaliero	Tutti i rifiuti solidi a eccezione dei rifiuti di tipo domestico	Solo i contenitori dei farmaci usati
800	La flora transitoria cutanea ...	Può essere rimossa con il semplice lavaggio	Non sopravvive e non si moltiplica sulla cute	E' scarsamente virulenta	Non può essere rimossa con il semplice lavaggio
801	I problemi di salute secondari all'invecchiamento della popolazione si riferiscono a cambiamenti ...	Sociali economici tecnologici	Di contesto	Dell'informatica	Istituzionali
802	La "disinfestazione" è la distruzione di ...	Insetti, acari e piccoli animali	Microrganismi esistenti in un substrato	Animali dannosi per l'ambiente	Microrganismi patogeni e di spore di un substrato
803	L'uso dei guanti non è importante quando ...	Si distribuiscono gli alimenti	Esiste il rischio di contatto con liquidi biologici	La cute delle mani dell'operatore presenta delle lesioni	La cute della persona assistita presenta delle lesioni
804	Si devono usare i dispositivi di protezione individuale per ...	L'aldeide glutarica	L'alcol etilico	La clorexidina	L'ipoclorito di sodio al 10%
805	Il più importante fattore di trasmissione delle infezioni ospedaliere è/sono ...	Le mani dell'operatore sanitario	Lo strumento sanitario	Gli effetti lettereci	La biancheria ed effetti personali dell'assistito
806	_____ un'efficace sterilizzazione (indicare l'affermazione errata)	Il livello di contaminazione del materiale determina variazioni del processo di sterilizzazione in autoclave per ...	I parametri di sterilizzazione devono essere mantenuti dall'autoclave per ...	I parametri di sterilizzazione devono essere raggiunti dall'autoclave per ...	Il tipo di confezionamento dei ferri garantisce ...
807	La disinfezione è l'insieme delle misure attuate al fine di ...	Ridurre a un livello detto di "sicurezza", il numero dei microrganismi presenti su una superficie o nell'ambiente e capaci di provocare malattia	Eliminare il 50% dei microrganismi presenti su una superficie o nell'ambiente e capaci di provocare malattia	Eliminare tutti i microrganismi presenti su una superficie o nell'ambiente e capaci di provocare malattia	Eliminare il 90% dei microrganismi presenti su una superficie o nell'ambiente e capaci di provocare una malattia
808	_____ non rientra nelle precauzioni standard	L'uso dei sistemi di protezione respiratoria	Il lavaggio delle mani	L'igiene ambientale	Le modalità di manipolazione alla biancheria
809	Gli elementi che concorrono a individuare la correttezza e l'efficacia del lavaggio delle mani sono ...	Tre	Due	Quattro	Cinque
810	Lavare le mani non basta a favorire la prevenzione, inoltre ...	Tutte le altre risposte sono corrette	Le unghie devono essere tenute corte e pulite	Non deve essere utilizzato lo smalto per le unghie e non devono essere indossati anelli, bracciali e orologi	Non devono essere indossati anelli, bracciali e orologi e sulle unghie deve essere utilizzato solo lo smalto di colore chiaro
811	La disinfezione può essere distinta in disinfezioni di ...	Tutte le altre risposte sono corrette	Basso livello	Medio livello	Alto livello
812	Per ottenere l'effetto desiderato dai disinfettanti, non è sufficiente impiegarli alle giuste concentrazioni e con le modalità definite e specifiche per ogni sostanza, bisogna anche "mantenerli" correttamente. Non bisogna ...	Conservarli in luoghi caldi e asciutti	Conservare i disinfettanti nella confezione originale	Conservare ben chiuse le confezioni	Rispettare le temperature, considerate idonee alla loro conservazione
813	L'umidità relativa è accettabile a una percentuale che va dal ...	20 al 70%	15 al 60%	20 all'80%	30 al 70%
814	Quando si parla di caratteristiche chimiche del microclima si fa riferimento alla pressione parziale ...	Dell'anidride carbonica e alla pressione parziale dell'ossigeno	Dell'idrogeno	Di alcuni gas nell'aria considerati singolarmente	Di alcuni gas presenti nell'aria
815	I detergenti addizionati all'acqua consentono di _____ tra sporco e superficie da pulire	Allentare la tensione	Aumentare la tensione	Eliminare la tensione	Produrre la tensione
816	La pulizia dei pavimenti, consiste nell'asportazione della polvere e nella successiva detersione, ponendo attenzione agli angoli. La polvere va asportata a umido utilizzando la scopa a trapezio e la garza monouso. La scopa non va ...	Sollevata ma strisciata con dei movimenti a "S" dall'interno verso l'esterno della stanza	Strisciata ma sollevata con dei movimenti orizzontali dall'esterno verso l'interno della stanza	Sollevata ma strisciata con dei movimenti verticali all'interno verso l'esterno della stanza	Sollevata, ma strisciata con dei movimenti indifferentemente dall'interno o dall'esterno della stanza
817	L'unità del paziente è costituita da letto, ...	Comodino, armadio, tavolino, sedia	Comodino, sedia	Comodino, armadio	Comodino, tavolino
818	I rifiuti che sono contaminati da sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantità tale da renderlo visibile sono considerati rifiuti sanitari ...	Pericolosi a rischio infettivo	Pericolosi non a rischio infettivo	Non pericolosi	Che richiedono particolari sistemi di gestione
819	_____ appartengono alla categoria dei rifiuti sanitari non pericolosi	Il vetro, la carta, il cartone, la plastica, i metalli, gli imballaggi in genere	Le pile secche al mercurio	Le lampade fluorescenti	Gli animali da esperimento
820	Per il virus dell'epatite C (HCV) la sorgente di infezione:	è il sangue	sono le secrezioni bronchiali	è il contatto con un malato	sono gli oggetti d'uso (spazzolino, rasoio, forbicine, posate)

821	I farmaci adatti ad abbassare la febbre vengono detti:	antipiretici	anticonvulsivanti	antiemetici	anticoagulanti
822	L'ozono è:	un gas capace di assorbire i raggi ultravioletti	un gas nebulizzato da spray e bombolette di uso comune	un gas tossico che inquina l'atmosfera	un grande schermo elettromagnetico
823	La placenta è:	un annesso embrionale	un segmento embrionale	una ghiandola esocrina	una tonaca uterina
824	Il plasma è:	la parte liquida del sangue	tutte le altre risposte sono corrette	il sinonimo di linfa	la parte figurata del sangue
825	_____ si cura con l'insulina.	Il diabete mellito	La nefrite	L'ipertiroidismo	L'epatite
826	L'unità base del sistema nervoso periferico è:	il neurone	il miocardio	l'epatocita	il nefrone
827	Il diabete è una patologia contraddistinta da presenza:	superiore alla norma di glucosio nel sangue	inferiore alla norma di glucosio nel sangue dei soggetti magri	superiore alla norma di insulina nel sangue e nelle urine	superiore alla norma di sangue nelle urine
828	Per dispnea si intende difficoltà:	di inspirare/esprire	ad articolare le parole	nelle persone asmatiche ad ingerire alimenti caldi	nelle persone con bronchite cronica a rimanere seduti
829	Per disuria si intende:	minzione frequente e dolorosa	minzione impellente	perdita involontaria di urina durante il sonno	diuresi assente
830	Nella terza fase della febbre il paziente ha:	caldo, manifesta vasodilatazione cutanea e sudorazione calda in quanto la temperatura diminuisce	caldo, manifesta vasocostrizione con possibile sudorazione anche se la temperatura rimane costante	freddo e manifesta vasocostrizione cutanea con brivido in quanto la temperatura diminuisce	freddo, manifesta sudorazione calda in quanto la temperatura aumenta
831	La persona che ha un BMI superiore o uguale a _____ si definisce obesa.	30	29	20	28
832	Le proteine sono sostanze chimiche composte da:	carbonio, idrogeno, ossigeno, azoto	carbonio, idrogeno, azoto, magnesio	magnesio, carbonio, azoto, ossigeno	azoto, idrogeno, magnesio, ossigeno
833	Il rilievo di calo ponderale nel neonato entro la quinta giornata dalla nascita è un evento:	fisiologico di frequente riscontro	da segnalare tempestivamente al medico	grave	non grave e di infrequente riscontro
834	_____ non è un'intossicazione di tipo alimentare.	L'epatite da virus C	La salmonellosi	Il botulismo	L'epatite da virus A
835	Le conseguenze dell'ictus si presentano con disturbi:	motori, sensitivi, cognitivi	solo cognitivi	esclusivamente motori	generalmente motori, talvolta sensitivi
836	L'ulcera da pressione di primo stadio si manifesta con:	un eritema persistente su cute integra	un arrossamento non persistente	una fistola profonda nella cute	una lesione superficiale che si presenta come un'abrasione o vescicola
837	_____ si trasmettono con gli abitanti.	Escheria coli, epatite A, salmonella	Herpes, epatite C, salmonella typhi	Clostridium difficile	Salmonella typhi, epatite C, herpes
838	Epistassi significa:	sangue che fuoriesce dal naso	sangue che fuoriesce dall'ano	sangue che fuoriesce dalla bocca	sangue che si rimargina in modo discontinuo
839	Il fegato è diviso in _____ lobi.	4	7	2	3
840	Lo sfigmomanometro serve a misurare:	la pressione arteriosa	la temperatura corporea	la velocità del sangue	l'intervallo tra un colpo di tosse e l'altro
841	Gli scaleni sono muscoli:	inspiratori accessori	attivi nella deglutizione	espiratori accessori	piastrine speciali
842	_____ è il muscolo trasversale che separa gli organi contenuti nel torace (cuore e polmoni) da quelli contenuti nella cavità addominale.	Il diaframma	Il mediastino	La pleura	La coclea
843	La lussazione è:	una perdita permanente dei rapporti articolari	una lacerazione legamentosa totale	una flessione del cuore	una perdita temporanea dei rapporti articolari
844	Per infezione di intende:	l'ingresso e lo sviluppo di microrganismi patogeni in uno e più tessuti di un organismo	la manifestazione in segni e sintomi causata da un agente infettivo	nessuna delle altre risposte è corretta	la presenza transitoria di microrganismi sulla superficie corporea o su oggetti
845	Per epidemia si intende:	il succedersi continuo e costante di un numero limitato di casi in un certo territorio	la manifestazione in segni e sintomi causata da un agente infettivo	la comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un'area limitata e in un breve periodo di tempo	la comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un breve periodo di tempo in un territorio molto ampio
846	La pleura è una membrana seriosa che riveste:	il polmone	il cuore	il fegato	il cervello
847	L'epidemia consiste:	nella comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un'area limitata e in un breve periodo di tempo	nel succedersi continuo e costante di un numero limitato di casi in un certo territorio	nessuna delle altre risposte è corretta	nella comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un breve periodo di tempo in un territorio molto ampio
848	Il nome della cellula nervosa è:	neurone	piastrina	neurite	globulo neutro
849	Un contrario di "analgesico" è:	dolorifico	distraente	ansigeno	rilassante
850	La polidipsia è:	un aumento della sete	un aumento della fame	una riduzione della fame	la perdita di capelli
851	In corso di _____ si possono rilevare lesioni cutanee granulomatose.	sarcoidosi	antracosi	silicosi	gestazione
852	Il termine Anuria si riferisce a:	mancata o ridottissima produzione di urina	eccessiva produzione di urina	produzione di urine di colore rossastro	nessuna delle altre risposte è corretta
853	Con il termine pollachiuria si intende:	aumento della frequenza delle minzioni a brevi intervalli di tempo	la perdita involontaria di urina soprattutto di notte	produzione di urine di colore rossastro	nessuna delle altre risposte è corretta
854	Il dotto di Winsung e il dotto di Santorini si trovano nel:	pancreas	rene	cuore	polmone
855	Il Clostridium botulinum produce le sue tossine contaminanti gli alimenti in condizione di:	anaerobiosi	aerobiosi	lipofilia	aracnofobia
856	Il Pap test rientra negli interventi di prevenzione:	secondaria	primaria	terziaria	forzata
857	La determinazione del sesso nella specie umana, come in molti organismi, dipende:	dallo spermatozoo	dallo zigote	dall'ovulo	dalla bilirubina
858	Funzionalmente, l'emoglobina può essere definita una proteina di:	trasporto	difesa	riserva	attacco
859	Il neonato deve urinare entro _____ ore dalla nascita.	24	48	12	3

860	I farmaci generici sono coperti da un brevetto:	in nessun caso	solo per il primo anno di produzione	sempre	sono fino ai primi sei mesi di produzione, al dieci per cento
861	L'ipofisi è:	Una ghiandola endocrina	Una ghiandola esocrina	Un ormone	Un virus
862	Il principale componente delle ossa è:	Il fosfato di calcio	Il cloruro di sodio	Il cloruro di calcio	Il carbonato di potassio
863	I gameti femminili vengono prodotti:	Nell'ovaio	Nelle surrenali	Nella vagina	NI testicolo
864	Per atassia si intende:	La mancata coordinazione nell'esecuzione dei movimenti	La differenza del diametro delle pupille	La perdita della capacità di parlare	L'incapacità di scrivere
865	Per agrafia si intende:	L'incapacità di formulare per iscritto il pensiero	La differenza del diametro delle pupille	La perdita della capacità di parlare	La mancata coordinazione nell'esecuzione dei movimenti
866	Per leucocitosi si intende:	L'eccesso di globuli bianchi	La carenza di globuli rossi	La carenza di piastrine	La carenza di globuli bianchi
867	Il termine "anemia" significa:	Carenza di globuli rossi	Eccesso di globuli bianchi	Carenza di globuli bianchi	Carenza di piastrine
868	Per trombocitopenia si intende:	La carenza di piastrine	L'eccesso di globuli bianchi	La carenza di globuli rossi	La carenza di globuli bianchi
869	Per leucopenia si intende:	La carenza di globuli bianchi	L'eccesso di globuli bianchi	La carenza di globuli rossi	La carenza di piastrine
870	Il termine compulsione significa:	La tendenza ad agire coscientemente in maniera irrazionale	Un impulso patologico a rubare	La paura dei luoghi chiusi	Un improvviso attacco di intensa paura
871	Per metrorragia si intende:	Una perdita ematica che si verifica nel periodo intermestruale	L'assenza di flusso mestruale	Una perdita ematica abbondante che inizia come mestruazione e continua nel periodo intermestruale	Un flusso mestruale particolarmente abbondante a comparsa ciclica regolare
872	La persona in bradipnea è in presenza di:	Frequenza respiratoria inferiore a 12 atti al minuto	Frequenza respiratoria superiore a 20 atti al minuto e respiro profondo	Respiri superficiali alternati a brevi periodi di apnea	Respiri profondi alternati a brevi periodi di apnea
873	Per cleptomania si intende:	L'impulso patologico a rubare	La paura dei luoghi chiusi	La paura dei luoghi aperti	Un improvviso attacco di intensa paura
874	Il "divezzamento":	E' il passaggio da alimentazione latte ad alimentazione varia	Può essere iniziato a qualsiasi età del bambino	Va fatto dopo i primi 2 mesi di vita del bambino	E' la fase in cui il bambino beve latte materno
875	Con il termine di ipossia si intende:	Inaeguata ossigenazione dei tessuti	Insufficiente apporto di sangue in una parte dell'organismo	Diminuzione della pressione arteriosa al di sotto dei valori normali	Aumento della pressione arteriosa al di sopra dei valori normali
876	Il nome delle quattro camere interne del cuore sono:	Atri e ventricoli	Sistole e diastole	Atri e mitrali	Mitrali e tricuspidi
877	Per iperpiressia si intende:	L'aumento della temperatura corporea	L'abbassamento improvviso della pressione	L'aumento della frequenza cardiaca	L'aumento della pressione arteriosa
878	Nel caso di melena, le feci assumono:	Un colore nero per la presenza di sangue digerito	Consistenza più solida	Consistenza normocromica	Un colore rosso per la presenza di sangue vivo
879	La disartria è:	La perdita della capacità di articolare le parole in maniera normale	Un disturbo della visione	Un disturbo della percezione	Un disturbo della cute poco elastica
880	Per glicosuria si intende:	La presenza di glucosio nelle urine	La presenza di glucosio nel sangue	La scarsa quantità di glucosio nel sangue	L'assenza di glucosio nelle urine
881	La logopedia è:	La rieducazione verbale	Il deficit dell'età pediatrica	La terapia della demenza	La terapia del dolore
882	Con l'invecchiamento il sistema muscolare va incontro a:	Perdita di fibre contrattili, riduzione della forza e della velocità di contrazione	Aumento delle fibre pallide-tipo II	Riduzione della prevenzione di fibre rosso-tipo I	Nessuna delle altre risposte è corretta
883	Il quadro clinico della emiplegia può essere contraddistinto da:	Tutte le altre risposte sono corrette	Deficit sensitivi	Modificazioni del tono muscolare e deficit sensitivi	Perdita del reclutamento motorio volontario di alcuni gruppi muscolari
884	L'equilibrio dinamico del cammino è basato sull'integrità funzionale:	Tutte le altre risposte sono corrette	Del sistema visivo	Del sistema vestibolare e propriocettivo	Della conduzione neuromuscolare, forza muscolare, mobilità articolare
885	I disturbi cognitivi causati da un ictus possono comprendere:	Tutte le altre risposte sono corrette	Afasia, agrafia	Agnosia, aprassia	Anosognosia, negligenza spaziale unilaterale
886	Dalla SDO sono escluse informazioni relative:	Ai farmaci somministrati durante il ricovero o le reazioni avverse ad essi	Alle caratteristiche anagrafiche del paziente	Alle caratteristiche cliniche	Tutte le altre risposte sono corrette
887	Per "costipazione" si intende:	Ritenzione delle feci	Difficoltà ad urinare	Frequenze emissione di urina	Ristrettezza economica
888	In una persona diabetica è facile riscontrare:	Chetonuria	Piuria	Nicturia	Anuria
889	I sintomi della ipoglicemia sono:	Ansia, tremori, sudorazione, pallore, fame, confusione mentale, visione offuscata e/o disturbi visivi, debolezza e vertigini, irritabilità, intorpidimento della lingua, delle labbra e delle dita	Disidratazione, anoressia, nausea, vomita, ipotensione, respiro di Kusmaul, acidosi	Confusione mentale, visione offuscata e/o disturbi visivi	Sete eccessiva, fame eccessiva, fastidio agli occhi, minzione frequente, sonnolenza, secchezza delle fauci, nausea e vomito, alito acetone
890	"_____ " è associata\o a cianosi periferica o fredda.	Lo shock cardiogeno	L'embolia polmonare	La cardiopatia congenita	La cronopatia cronica ostruttiva
891	L'angina pectoris è spesso provocata da:	Forzi fisici intensi	Esposizione al freddo	Pasti abbondanti	Assunzione di alcolici
892	Una persona può avere un infarto del miocardio quando:	Tutte le altre risposte sono corrette	Ha un dolore al torace, irradiato alla mandibola, al braccio e respira con difficoltà	Respira male ed ha un dolore al torace che si irradia verso la schiena	Ha un dolore toracico si presenta ansioso, pallido e sudato
893	L'ipovolemia è:	La riduzione del volume di sangue circolante	La riduzione della concentrazione sierica di potassio	La riduzione della concentrazione sierica del sodio	Nessuna delle altre risposte è corretta
894	Nella persona inconsciente in decubito supino, "_____ " è la causa principale di ostruzione delle vie aeree.	La caduta della lingua all'indietro	La flessione dell'epiglottide	L'ostruzione della laringe da alimento non digerito	La flessione della glottide
895	Per sintomo si intende:	Ogni sensazione soggettiva avvertita dal paziente	Capacità da parte del paziente di riferire una sensazione	Ogni alterazione oggettiva avvertita dal paziente	Capacità di descrivere
896	La terza età o fase della senilità corrisponde:	Dai 70 anni in su	Tra i 60 e i 65 anni	Tra i 50 anni e i 60 anni	Tra i 60 e i 70 anni
897	La gangrena gassosa è:	Una infezione da germi anaerobi	Una infezione da aerobi	Una infezione da germi misti	Una infezione da COVID

898	La termogenesi è la:	Produzione del calore	Dispersione del calore	Nessuna delle altre risposte è corretta	Produzione di bile
899	Per dieta equilibrata si intende:	Una adeguata ripartizione dei nutrienti	Ripartire una dieta in almeno 5 pasti	Che in una dieta ci sono glucidi, lipidi e proteine in eguale percentuale	Che in una dieta ci sono solo proteine
900	" _____ " si riscontra ipotermia.	Quando la temperatura corporea è al di sotto dei 35 °C	Quando la temperatura corporea è al di sotto dei 40 °C	Quando la temperatura corporea è al di sotto dei 37 °C	Quando la temperatura corporea è al di sotto dei 38 °C
901	I regimi dietetici sono:	Diete specifiche per patologie	Un insieme di diete equilibrate	Un insieme di menu	Diete per i pazienti favici
902	Il periodo fetale va dalla:	Nona alla trentottesima settimana di sviluppo	Prima alla seconda settimana di sviluppo	Terza all'ottava settimana di sviluppo	Prima alla terza settimana di sviluppo
903	La melena è caratterizzata da emissione di feci:	Picee	Bianche	Non formate e di colore scuro	Gialle
904	Per mantenere efficiente il nostro sistema cardiocircolatorio è opportuno l'esercizio:	Isotonico	Isometrico	Isocinetico	Isometrico
905	Il prelievo trans addominale del liquido amniotico è detto:	Amniocentesi	Villocentesi	Amnioscopia	Amnioressi
906	L'insulina viene prodotta:	Dal pancreas	Dal cuore	Dai reni	Dal fegato
907	La " _____ " è la giusta definizione di scoliosi.	Deviazione permanente rotatoria e laterale del rachide	Deviazione permanente rotatoria e laterale del coccige	Deviazione frontale del rachide	Deviazione permanente del rachide
908	La disfagia è:	Difficoltà nel passaggio di cibo attraverso l'esofago	Dolore retrosternale	Senso di bruciore retrosternale	Difficoltà nel passaggio delle feci nell'intestino
909	L'eparina sodica:	Si inietta per via endovenosa	Si inietta per via sottocutanea	Può essere somministrata sia per via endovenosa che sottocutanea	Si somministra per via orale
910	La gravidanza ectopica è una gravidanza:	Che si sviluppa al di fuori dell'utero	Indesiderata	Isterica	Che si interrompe prima del 3° mese
911	Una gastrite è una infiammazione:	Dello stomaco	Del fegato	Dell'intestino	Nessuna delle altre risposte è corretta
912	" _____ " sono i sintomi tipici dell'edema polmonare acuto.	Tutte le altre risposte sono corrette	Dispnea, cianosi	Tachicardia, espettorato schiumoso	Ipotensione marcata, sonnolenza, dispnea
913	Le feci alcoliche sono feci:	Prive di colore	Striate di sangue	Del neonato	Di consistenza molle
914	L'apertura di una ferita è chiamata:	Deiscenza	Eviscerazione	Formazione di ernia	Sventramento
915	La geriatria è la disciplina:	Medica che studia le malattia dell'anziano e le loro conseguenze disabilitanti	Medica che studia la riabilitazione negli anziani	Medica che studia la longevità degli anziani	Forense
916	Per " _____ " non è attualmente disponibile un vaccino.	L'AIDS	Il morbillo	L'epatite A	La varicella
917	Per acastisia si intende:	Il bisogno imperioso di muoversi	La perdita della capacità di eseguire sequenze motorie apprese con l'esperienza	La perdita progressiva della coordinazione muscolare	La difficoltà a parlare
918	Un paziente dispnoico è un paziente che:	Fa fatica a respirare	Non ha alcun interesse per quello che succede intorno a lui	Ha difficoltà a digerire	E' affetto da una malattia respiratoria cronica
919	Nel delirium del paziente vi è compromissione:	Di tutte le funzioni cognitive	Solo ed esclusivamente delle capacità di attenzione	Solo ed esclusivamente delle capacità di orientamento temporospaziale	Solo ed esclusivamente della memoria
920	Con il termine decubito si indica la posizione:	Di chi giace a letto	Di chi si trova seduto	Di chi trova sdraiato su un fianco	Eretta
921	Nelle donne i disturbi dell'umore si possono manifestare in genere:	Subito dopo una gravidanza	Nelle prime fasi della gravidanza	Nell'età giovanile	Nel periodo della menopausa
922	La bradipnea è una respirazione:	Rallentata	Accelerata	Altalenante	Ad intermittenza
923	Per cachessia si intende:	Sia lo stato di forte dimagrimento e denutrizione di una persona, sia la consunzione del tessuto adiposo e muscolare di una persona	Lo stato di forte dimagrimento e denutrizione di una persona	La consunzione del tessuto adiposo e muscolare di una persona	L'aumento dello stato adiposo
924	Con "wandering" si intende:	Il modo di camminare senz aposa della persona con demenza	Un disturbo del comportamento delle persone con demenza	Un disturbo alimentare	Uno dei sintomi che rilevano una situazione di burn-out dell'OSS addetto all'assistenza in un nucleo con persone affette dal morbo di Alzheimer
925	Gli anziani con diabete sono predisposti a:	Ulcere alle gambe e ai piedi	Disfagia	Epistassi	Tutte le altre risposte sono corrette
926	Se un bambino ha una statura inferiore al 3 per centile vuol dire che:	Più del 97% dei bambini della sua età sono più alti di lui	Più del 3% dei bambini della sua età sono più bassi di lui	Più del 97% dei bambini della sua età sono più bassi di lui	Più del 3% dei bambini della sua età sono più alti di lui
927	Nei lattanti con infezione delle vie urinarie la manifestazione clinica più frequente è la:	Febbre	Disuria	Pollachiuria	Incontinenza
928	La " _____ " non è causata in un bambino dallo Streptococco pneumoniae.	Cistite	Otite	Polmonite	Meningite
929	Il bambino Down è a rischio elevato di malformazioni:	Cardiache	Dell'apparato nefro-urinario	Cerebrali	Dell'apparato dirigente
930	L'appendicite acuta nel bambino è la più frequente causa di addome acuto:	Sempre	Solo nel lattante	Solo nel bambino in età puberale	In nessun caso
931	La patogenesi è:	Il meccanismo d'azione dell'agente patogeno	L'individuazione dell'agente responsabile della malattia	La distribuzione nel territorio della malattia a seconda del periodo dell'anno	Il meccanismo genetico alla base della malattia
932	" _____ " sono gli elementi diagnostici dell'epatite.	L'ipertransaminasemia e la ricerca etiologica	L'aumento della VES e TAS	L'ipercolesterolemia e ricerca etiologica	La proteinuria di Bence-Jones
933	I principali tipi di epatite cronica sono:	Persistente ed attiva	A e B	Acuta e subacuta	Epatite cronica non A e non B
934	La malattia venerea è la malattia:	A trasmissione sessuale	Dell'apparato genitale	Della pelle	Dei vasi venosi

935	Il Clostridium botulinum determina intossicazione alimentare a causa:	Dell'emissione di tossine	Di sostanze che determinano una distruzione completa della parete intestinale	Delle sostanze presenti sulla sua membrana cellulare	Di sostanze che attivano l'Helicobacter pylori a livello gastrico
936	Gli Herpes virus sono virus:	A DNA a doppia elica	A RNA a singola elica	Privi di DNA e RNA	A RNA a doppia elica
937	La poliomielite è causata da un virus del genere:	Enterovirus	Rhabdovirus	Togavirus	Ciclovirus
938	L'infezione brucellare si può trasmettere per contagio:	Diretto e indiretto	Indiretto	Diretto	Tramite un organismo ospite
939	Il Clostridium tetani è definito bacillo mobile:	Gram positivo, sporigeno	Gram negativo, sporigeno	Gram positivo, asporigeno	Gram negativo, capsulato
940	L'epatite B cronica è contraddistinta da:	Aumento delle IgG sieriche e HBsAg+	Aumento delle IgG sieriche	HBsAg+	Aumento delle IgM sieriche
941	La Taenia saginata ha come ospite definitivo:	Uomo	Ovini	Suini	Gatto
942	"_____ " è l'agente eziologico del foruncolo.	Lo Stafilococco	Lo Streptococco	Lo Herpes virus	Lo Pneumococco
943	La via di eliminazione del bacillo del tifo è:	Urine e feci	Urina	Sudore	Mucose
944	Il principale serbatoio di Toxoplasma gondii è:	Il gatto	Il topo	L'uomo	Il cane
945	Il virus dell'epatite A appartiene al genere:	Enterovirus	Adenovirus	Torevirus	Tutte le altre risposte sono corrette
946	Il nome di malattia dei legionari è stato dato a:	Un'infezione con prevalente localizzazione polmonare sostenuta da un batterio specifico gram negativo e diffusa in tutto il mondo in piccoli focolai epidermici	Un tifo esantematico, perché frequente in forma epidemica nelle legioni romane	Un'epidemia che colpì le truppe italiane in Spagna	Una malattia tipica dei militari di leva
947	Il Mycobacterium è un:	Batterio	Virus	Protozoo	Fungo
948	La tipica forma del batterio della meningite è la:	A chicco di caffè	A virgola	A bastoncello	A grappolo
949	Il batterio Neisseria meningitidis causa la:	Meningite	Encefalite	Meningite da emofilo	Polmonite
950	La rosolia è una patologia ad eziologia:	Virale	Batterica	Protozoica	Micotica
951	"_____ " favorisce nel malato la formazione del tessuto osseo grazie all'azione della vitamina D.	La luce	La temperatura	Il tasso di umidità	La ventilazione
952	La "pressione minima" coincide con la pressione:	Diastolica	Sistolica	Nelle arterie in piena contrazione cardiaca	Idrostatica
953	Lo "scompenso cardiaco" è:	L'incapacità del cuore di pompare il sangue ai polmoni e agli altri organi	L'incapacità del cuore di compiere sotto sforzo 70 battiti al minuto	L'alterazione e l'aumento eccessivo delle capacità del cuore di pompare il sangue ai polmoni e agli altri organi	L'alterazione e l'aumento della frequenza cardiaca
954	La pediculosi è:	Un'infestazione provocata dai pidocchi	Una sostanza clinica	L'attività respiratoria di un adulto	Un antisettico
955	La parola handicap viene usata per definire:	Un insieme di danni fisici p psichici	Una malattia specifica	Una disfunzione prettamente psichica	Una disfunzione prettamente fisica
956	Gli handicap motori possono essere dovuti:	A malformazioni organiche o lesioni al sistema nervoso centrale	Solo a disfunzioni a carico dei muscoli	Solo ad anomalie genetiche	Solo a lesioni al sistema nervoso periferico
957	La blefarite è una:	Infiammazione delle palpebre	Malattia ereditaria	Infiammazione della macula lutea	Malattia che provoca un distacco retinico
958	La contusione è la:	Lesione di organi interni o parti muscolari dovuta ad un trauma	Sospensione, in seguito ad una violenta caduta, dell'attività degli organi colpiti	Rottura di un osso degli arti inferiori	Rottura di un osso degli arti superiori
959	Per bulimia si intende:	Appetito insaziabile	La mancanza di memoria	Il disturbo del linguaggio	La perdita dell'appetito
960	La commozione cerebrale consiste nel trauma:	Del cranio	Dell'apparato cardiocircolatorio	Di tutto l'apparato scheletrico	Del rachide
961	L'epicondilita è l'infiammazione:	Del gomito	Dello stomaco	Delle vertebre lombari	Del colon
962	Il crampo è:	La contrazione involontaria della muscolatura	La paralisi dei muscoli in seguito ad eccessivo sforzo	La paralisi dei nervi all'interno degli arti	La sospensione momentanea di tutte le attività muscolari
963	Lo stiramento consiste nella lesione:	Parziale di poche fibre muscolari	Totale delle fibre muscolari	Parziale di tutte le fibre muscolari	Parziale delle arterie
964	La commozione spinale è causata da un trauma:	Alla colonna vertebrale	Al cervello	Al cuore	Alle ossa degli arti superiori
965	"_____ " è la forma di lesione più grave.	Lo strappo	Lo stiramento	Tutte le altre rispsote sono corrette	La distorsione
966	"_____ " non è tra le cause della tendinite.	Nuotare a lungo in acque non profonde	La mancanza di sali minerali	La corsa su un suolo troppo duro	Lunghi allenamenti senza preparazione
967	"_____ " studia gli effetti delle lesioni e il malfunzionamento dei tessuti.	La traumatologica	La semeiotica	La farmacologia	L'istologia
968	La pubalgia è l'infiammazione:	Della sinfisi pubica	Del piede	Del tallone nei ragazzini durante la fase della pubertà	Tutte le altre risposte sono corrette
969	La metatarsalgia è:	L'infiammazione dell'avampiede	L'infiammazione del metacarpo	La contusione della spalla	La lussazione della spalla
970	Le flittene sono:	Le vesciche	I traumi oculari	Un tipo di emorragie nasali	Le verruche
971	"_____ " non è tra i sintomi di frattura cranica.	Il dolore della schiena	La perdita di coscienza	La perdita di sangue da naso, bocca e orecchie	Il polso debole o accelerato
972	"_____ " non provocano lo stato di shock.	Le vertigini	Le allergie	Le emorragie	Le forti disidratazioni
973	Tra i sintomi dello stato di shock non vi è:	La fame	Un forte pallore	Il polso con battiti deboli	Il vomito
974	I segni fondamentali della peritonite acuta generalizzata sono:	Tutte le altre risposte sono corrette	Febbre	Contrattura addominale	Shock
975	La ferita è la:	Soluzione di continuo della cute o della mucosa	Perdita di uno strato di epitelio in seguito a trauma	Incisione chirurgica	Lesione causata da un oggetto tagliente
976	I traumi cronici possono essere distinti in:	Chiusi e aperti	Aperti e primari	Primari e secondari	Secondari e aperti
977	La defervescenza è:	La diminuzione della temperatura corporea	Il momento iniziale della febbre	L'assunzione di antipiretici sotto stretta sorveglianza medico-infermieristica	La misurazione della temperatura corporea
978	La musicoterapia:	Contribuisce al miglioramento della capacità residua uditiva	Non ha alcuna conseguenza né positiva né negativa	Ha conseguenze dannose per il soggetto audioleso ai fini dell'apprendimento	Stimola l'aggressività
979	Il sistema Braille è composto da "_____" combinazioni.	64	59	72	48

980	La percezione visiva risulta inadeguata fino ai:	6-7 anni	4-5 anni	5-6 anni	9-10 anni
981	Cataratta, sordità e cardiopatia formano la cosiddetta:	Triade di Gregg	Malattia di Pick	Sindrome di Pickwick	Serie di Krebs
982	Lo stato di malnutrizione è:	Lo squilibrio tra i fabbisogni dell'organismo e l'assunzione delle sostanze nutritive	Un disturbo digestivo	Una alterazione dei cibi dovuta dovuta ad inquinamento microbico	L'ingestione di un cibo contaminato
983	Con l'invecchiamento si determinano alcune modificazioni a carico dell'apparato digerente:	La tossinfezione da alimenti	La diminuzione dei succhi digestivi	La diminuzione dell'acidità gastrica	La riduzione della motilità intestinale
984	L'ittero si cura con la:	Fototerapia	Somministrazione di ferro o nei casi gravi con la radioterapia	Somministrazione massiccia di vitamine	Vaccinazione
985	Al momento "_____" avviene la perdita del tappo mucoso da parte della donna in gravidanza.	Dell'inizio del travaglio	Dell'espulsione del feto	Dell'espulsione della placenta	Della prima visita ginecologica postpartum
986	La prostata serve a:	Produrre liquido seminale	Produrre estrogeni	Spingere l'urina	Provocare la minzione
987	"_____" si definisce l'estremità di un muscolo che ne assicura l'attacco alle ossa.	Il tendine	Il legamento	L'articolazione	Il nervo
988	Il sangue contenuto nelle arterie polmonari è sangue:	Venoso e perciò scarsamente ossigenato	Arterioso e perciò ben ossigenato	Misto e quindi ricco di ossigeno e anidride carbonica	Proveniente dal ventricolo sinistro quindi ben ossigenato
989	La fibra è contenuta:	Nella frutta, nei legumi, nei cereali, negli ortaggi	Nei cereali, nei legumi, nella carne, nelle uova	Nei legumi, negli ortaggi, nei formaggi, nel pesce	Nei legumi, nella carne, nei cereali, negli ortaggi
990	L'assorbimento della maggior parte dei nutrienti avviene:	Nell'intestino tenue	Nello stomaco	Nell'intestino crasso	Nel retto
991	"Epistassi" significa sangue che fuoriesce da:	Il naso	La bocca	L'orecchio	L'intestino
992	"Paraplegia" significa la paralisi:	Degli arti inferiori	Dei quattro arti	Delle braccia	Di un emilato
993	Il derma si trova tra:	Epidermide e ipoderma	Epidermide e adipe	Ipoderma e adipe	Ipoderma e connettivo
994	"_____" hanno funzione plastica.	Le proteine	I grassi	Gli amidi	Le vitamine
995	Un'infezione è:	La penetrazione di un agente infettivo nell'organismo e successiva replicazione	Una malattia causata da un agente infettivo con sintomatologia conclamata	Una malattia con sintomatologia latente	La presenza di microrganismi saprofiti nelle prime vie aeree
996	La minzione è:	L'emissione all'esterno dell'urina	L'emissione all'esterno di vomito	La filtrazione delle urine nelle 24 ore	L'aumento delle sostanze organiche nell'urina
997	Il grado dell'ustione classifica la:	Profondità	Estensione	Profondità ed estensione	Temperatura dell'agente ustionante
998	La prossemica è una disciplina che studia:	L'utilizzo che le persone fanno della distanza e dello spazio nell'ambito delle relazioni interpersonali	La modalità espressiva e la scelta linguistica	Le competenze linguistiche	La capacità di reazioni agli stimoli
999	L'epiglottide ha la funzione di:	Impedire che i cibi vadano in trachea	Produrre la voce	Produrre muco	Filtrare i microrganismi
1000	"Ematemesi" significa:	Sangue emesso con il vomito proveniente dall'apparato digerente	Perdita di sangue con l'urina proveniente dall'apparato urinario	Sangue emesso con colpi di tosse proveniente dall'apparato respiratorio	Modesta perdita di sangue dall'ano proveniente dall'apparato digerente
1001	Il diaframma è un muscolo che:	Divide la cavità toracica da quella addominale	Si trova collocato tra il cuore e i polmoni	Si alza durante l'inspirazione	Si abbassa durante l'espiazione
1002	Il fecaloma è:	Una raccolta di feci disidratate e consistenti nell'ampolla rettale	Una abbondante emissione di feci	Una scarsa emissione di feci, di solito indurite per la permanenza nel retto	La presenza di feci grosse in ampolla, con una rilevante quantità di gas intestinali
1003	L'assenza di ossigeno al cervello provoca danni irreversibili dopo:	10-15 minuti	30 secondi	3 minuti	30 minuti
1004	L'ossigeno nel sangue è trasportato da:	Emoglobina	Mioglobina	Globuli bianchi	Pistrine
1005	La malnutrizione nell'anziano è soprattutto:	Calorico-proteica	Calorica	Calorico-lipidica	Calorico-glucidica
1006	La "ritenzione urinaria" è:	Il ristagno e accumulo di urina nella vescica	L'incapacità di trattenere l'urina	La ridotta presenza di urina in vescica	Il ristagno di sedimenti in vescica
1007	La soglia del dolore:	Rappresenta la quantità minima di stimoli perché una persona senta dolore	Rappresenta la quantità massima di stimoli prima che una persona senta dolore	E' una precisa gradazione del dolore che si ricava compilando la scala VAS	E' la massima intensità di dolore che una persona è in grado di tollerare
1008	Per "brandicinesia" si intende:	Lentezza di movimento	Assenza di movimenti	Incapacità di deambulare	Esecuzione movimenti a scatto
1009	Il colesterolo è:	Un lipide	Una vitamina	Un glucide	Una fibra
1010	Il gasping è:	Un tipo di respiro in cui i movimenti toracici sono inefficaci e non c'è ingresso di aria nei polmoni	Un tipo di respiro in cui i movimenti toracici sono più efficaci, tali da permettere al soggetto di iperventilare i polmoni	Un tipo di respiro in cui i movimenti anziché toracici sono addominali	Una parte dell'occipite
1011	La normale frequenza cardiaca a riposo in un adulto è "_____" battiti al minuto.	60-90	60-110	50-70	80-110
1012	Gli atti respiratori in un adulto sono "_____" in un minuto.	12-16	8-12	Superiori a 20	6-10
1013	La sindrome da immobilizzazione si manifesta in seguito:	All'allettamento prolungato	All'invecchiamento	A una patologia cronica	A una patologia acuta
1014	Per onda sfigmica si intende:	L'onda creata dal sangue che esce dal cuore e raggiunge il sistema periferico	La circolazione polmonare	La fase di contrazione dei calici renali per spremere le piramidi e aiutare il deflusso dell'urina	La diuresi del mattino
1015	L'ipotensione ortostatica si può presentare nei:	Soggetti allettati da lungo tempo	Pazienti broncopatici cronici	Soggetti diabetici con ridotta mobilizzazione	Pazienti infartuati in convalescenza
1016	L'anisocoria è:	Una diseguale ampiezza delle due pupille	Una patologia cardiaca	Il rapido calo del peso	Il rapido aumento del peso
1017	La meningite si manifesta con:	Tutte le altre risposte sono corrette	Cefalea	Fotofobia	Irsutismo
1018	L'emiplegia colpisce in prevalenza l'arto superiore:	E inferiore dal lato opposto a quello della lesione cerebrale	Se l'emorragia cerebrale è a destra	E inferiore se l'emorragia cerebrale è a sinistra	Se l'emorragia cerebrale è a sinistra
1019	La scala di Braden modificata per uso pediatrico valuta il:	Rischio di ulcere da pressione nel bambino fino a 5 anni	Rischio di ulcere da pressione nel bambino fino a 10 anni	Dolore nel neonato	Dolore nel bambino
1020	Un ascesso è una raccolta di:	Materiale purulento	Materiale ematico	Materiale fecale	Nessuna delle altre risposte è corretta

1021	Il colostro è:	Un alimento	Una sostanza cancerogena	La prima emissione di feci del neonato	Il liquido eliminato con la placenta
1022	"_____ " è detta oliguria.	La ridotta quantità di urine prodotte nelle 24 ore	L'assenza di urine prodotte nelle 24 ore	La difficoltà all'eliminazione delle urine	L'eccessiva quantità di urine prodotte nelle 24 ore
1023	Il mecomio è:	La prima emissione di feci del neonato	Materiale eliminato con la placenta	La sostanza emessa prima della montata latte	Materiale aspirato al neonato alla nascita
1024	"_____ " è detta incontinenza urinaria.	L'impossibilità di controllare volontariamente il flusso di urine	L'impossibilità a svuotare completamente la vescica urinaria	L'impossibilità a percepire il riempimento della vescica urinaria	La tendenza ad urinare più volte durante la notte
1025	Per la coagulazione del sangue:	Partecipano le piastrine	Partecipano i leucociti	Partecipano gli anticorpi	Partecipa la ptialina
1026	La menomazione è:	Lo svantaggio derivante dalla disabilità	La difficoltà a ricordare gli avvenimenti del giorno prima	L'incapacità di mantenere l'attenzione	La difficoltà a respirare
1027	"Melena" significa feci:	Nere contenenti sangue proveniente dalle prime vie digerenti	Abbondanti e semiliquide	Contenenti sangue nero proveniente dal retto	Con striature di sangue "rosso vivo"
1028	La persona adulta urina normalmente "_____ " nelle 24 ore.	1.500 cc	700 cc	200 cc	2.900 cc
1029	La corretta sequenza degli organi dell'apparato digerente è:	Esofago-stomaco-intestino tenue-colon	Stomaco-esofago-intestino tenue-colon	Esofago-stomaco-colon-intestino tenue	Colon-intestino tenue-stomaco-esofago
1030	Per tachicardia si intende:	Aumento della frequenza cardiaca	Aumento della conducibilità cardiaca	Riduzione della frequenza respiratoria	Aumento della pressione arteriosa
1031	Per produrre il movimento è necessaria la presenza dei seguenti elementi:	Tutte le altre risposte sono corrette	Le ossa	I muscoli	Le articolazioni
1032	La mobilizzazione segmentale (mobilizzazione finalizzata a ottenere una determinata attività motoria: alzare un braccio, alzare una gamba, ecc. mediata da un operatore esperto) può essere:	Passiva, attiva, attiva assistita	Passiva, attiva	Passiva, attiva, assistita	Attiva, attiva assistita
1033	La mobilizzazione segmentale è eseguita:	Dal fisioterapista	Dall'infermiere	Dall'operatore socio-sanitario	Tutte le altre risposte sono corrette
1034	"_____ " sono gli elementi che contraddistinguono la correttezza della deambulazione e che perciò vanno costantemente presidiati.	La posizione del tronco, la posizione del bacino, la posizione dell'arto di appoggio, la posizione dell'arto sospeso	La posizione del tronco, la posizione del bacino, la posizione dell'arto di appoggio	La posizione dell'arto sospeso, la posizione dell'arto di appoggio, la posizione del bacino	La posizione del tronco, la posizione del bacino, la posizione dell'arto sospeso
1035	Le urine sono prodotte:	Dai reni	Dagli ureteri	Dalla vescica	Dall'uretra
1036	Per "oncologia" si intende:	lo studio dei tumori	la branca della nefrologia	lo studio della circolazione arteriosa	la branca della neurologia
1037	Per presbifrenia si intende:	una demenza senile (chiamata anche sindrome amnestico-confabulatoria	un problema visivo tipico dei giovani	nessuna delle altre risposte è corretta	un problema visivo degli anziani
1038	La saturazione è:	un parametro che indica la quantità di O2 che si lega all'emoglobina	il numero di globuli rossi	un parametro che indica il riempimento dell'atrio sinistro	un parametro vitale
1039	Il SARS-COV-2 appartiene al genere:	coronavirus	haemophilus influenzae	staphilococcus epidermidis	candida
1040	Un paziente con incontinenza urinaria manifesta perdite di:	urine involontarie	feci volontarie	feci ed urine	urine volontarie
1041	Le ghiandole sudoripare fanno parte degli annessi:	cutanei	del tessuto nervoso	endocrini	esocrini
1042	Il sistema scheletrico è composto da:	ossa, cartilagini e articolazioni	ossa, muscoli, vene	muscoli, tendini, legamenti	muscoli, legamenti e cellule nervose
1043	L'ingresso di aria nei polmoni viene detto:	inspirazione	espirazione	respirazione	meteorismo
1044	La diaforesi è:	una profusa sudorazione	la stimolazione elettrica di una miocellula	il trattamento preventivo del plasma per la somministrazione umana	una sudorazione normale
1045	La vaccinazione rientra nella:	prevenzione primaria	cura di patologie stagionali	prevenzione secondaria	prevenzione terziaria
1046	L'ecchimosi è:	La rottura dei piccoli capillari	Una micro-frattura	La rottura di un nervo	Uno stiramento del muscolo
1047	I farmaci generici sono coperti da brevetto?	No	Sì, ma solo quando siano destinati a cure oncologiche	Sì, sempre	Non esiste tale tipologia di farmaci
1048	Che cosa divide il muscolo del diaframma?	La cavità toracica da quella addominale	Si trova collocato tra il cuore e i polmoni	Si trova collocato al di sotto dello stomaco	Si abbassa durante l'espirazione
1049	L'apparato urinario è costituito dai reni:	Tutte le altre risposte sono corrette	Dagli ureteri, dalla vescica	Dall'uretra	Dagli ureteri, dall'uretra
1050	La "disuria" è l'emissione di urine:	Dolorosa	Con tracce di sangue	Concentrate	Con tracce di pus
1051	L'iperpiressia consiste in un rialzo della temperatura corporea oltre i:	38°C	39°C	36°C	40°C
1052	La temperatura rettale è superiore a quella ascellare di:	0,5°C	0,3°C	1,5°C	0,5°F
1053	Il polso popliteo è collocato:	In corrispondenza della cavità posteriore del ginocchio	Al lato del collo	Nei pressi dell'inguine	In corrispondenza dell'articolazione del polso
1054	Le ferite infette vanno pulite:	Con movimenti circolari, dal margine interno verso l'esterno	Con movimenti circolari, dal margine esterno verso l'interno	Secondo il protocollo in uso per la decontaminazione	Con garza sterile, iniziando dall'incisione e portandosi verso l'esterno
1055	La tricotomia è effettuata normalmente:	A ridosso dell'intervento chirurgico	Almeno 48 ore prima dell'intervento chirurgico	Solo per interventi chirurgici addominali	Entro le ore 12 e prima dell'intervento chirurgico
1056	La pressione diastolica è:	La pressione arteriosa minima	Una delle sedi della rilevazione del polso	Il numero dei respiri che vengono compiuti in normali condizioni assumendo come unità di misura temporale il minuto	La pressione arteriosa massima
1057	Il "veicolo d'infezione" è:	La mano	Un insetto portatore sano	Un microrganismo	Una malattia infettiva

1058	I virus sono:	Organismi intracellulari capaci di vivere e riprodursi solo all'interno di una cellula	Organismi unicellulari, procarioti, in grado di sopravvivere anche in condizioni climatiche estreme	Spore in grado di resistere a situazioni ambientali sfavorevoli	Organismi che ricavano nutrimento da materia organica morta o da organismi viventi
1059	In situazioni di emergenza in quale sede è consigliato rilevare il polso ?	Carotidea	Pedidia	Radiale	Poplitea
1060	Per assorbimento di un farmaco si intende il passaggio di un farmaco:	Dal punto di somministrazione al circolo ematico sistemico	Dallo stomaco all'intestino	Dal sistema arterioso a sistema venoso	Nessuna delle altre risposte è corretta
1061	La Sincope è:	Una perdita di coscienza transitoria	Una iperglicemia	Una crisi epilettica parziale	Una frattura
1062	La sindrome di Down è conosciuta anche come:	Trisomia 21	Trisomia 14	Bisomia 14	Trisomia 11
1063	L'Herpes Zoster è una malattia che ...	Si può presentare in età adulta in pazienti che hanno già manifestato la varicella	Si può presentare in età adulta in tutti i pazienti	Si può presentare in età pediatrica ed è chiamata varicella	Nessuna delle altre risposte è corretta
1064	Per DEA si intende ...	Dipartimento di emergenza e accettazione	Dipartimento di emergenza e assistenza	Distretto di emergenza e urgenza	Distretto di emergenza e accettazione
1065	Per valutazione dello stato della cute si osserva	Tutte le altre risposte sono corrette	La temperatura	La consistenza	Il colorito
1066	L'acqua ossigenata o perossido di idrogeno ...	Ha un effetto molto debole sui batteri	Non ha alcun effetto sui batteri	E' un battericida molto potente	Per essere efficace deve essere miscelata con iodio
1067	L'organo della fonazione è rappresentato dalla	Laringe	Mucosa nasale	Trachea	Cavità buccale
1068	Un aumento della frequenza dello stimolo ad urinare viene detta	Pollachiuria	Polidipsia	Poliuria	Nessuna delle altre risposte è corretta
1069	Per "asepsi" si intende ...	L'assenza di microrganismi	Una malattia	Un farmaco	Nessuna delle altre risposte è corretta
1070	Quando una ferita è di colore giallo è ...	Infetta	Ancora fresca	In fase di rigenerazione avanzata	Nessuna delle altre risposte è corretta
1071	Nella ritenzione urinaria le urine ...	Vengono prodotte e non eliminate	Vengono prodotte e vengono escrete in continuazione	Non vengono prodotte	Nessuna delle altre risposte è corretta
1072	La disartria è un disturbo ...	Di coordinazione del linguaggio	Della percezione	Causata dalla rigidità delle articolazioni	Nessuna delle altre risposte è corretta
1073	I microrganismi saprofiti sono organismi ...	Eterotrofi che si nutrono di sostanze morte di cui provocano e accelerano la decomposizione	In grado di sintetizzare molecole organiche complesse partendo da molecole inorganiche semplici	Che traggono il proprio nutrimento sfruttando altri organismi viventi chiamati ospiti che vengono da loro danneggiati lentamente	Nessuna delle altre risposte è corretta
1074	Le infezioni correlate all'assistenza (I.C.A.) sono quelle che ...	Possono verificarsi in tutti gli ambienti assistenziali, inclusi ospedali per acuti, day-hospital/day-surgery, lungodegenze, ambulatori, assistenza domiciliare, strutture residenziali territoriali	Possono verificarsi solo esclusivamente durante la degenza ospedaliera	Possono verificarsi solo dopo 30 giorni dalla dimissione	Nessuna delle altre risposte è corretta
1075	Gli agenti biologici potenzialmente capaci di dar luogo ad infezioni e determinare una malattia si differenziano tra loro per ...	Infettività, patogenicità e virulenza	Infettività, virulenza e trasmissibilità	Virulenza, trasmissibilità e comorbilità	Nessuna delle altre risposte è corretta
1076	La temperatura corporea è l'espressione della capacità dell'organismo ...	Di mantenere un equilibrio tra la perdita e la produzione di calore	Di mantenere in equilibrio la perdita di calore	Di mantenere costante la produzione di calore	Nessuna delle altre risposte è corretta
1077	Per melena si intende ...	L'emissioni di feci nere per la presenza di sangue proveniente dalle vie digerenti alte	L'emissione di sangue con il vomito proveniente dalle vie digerenti superiori	L'emissione di sangue con il vomito proveniente dalle vie digerenti inferiori	Nessuna delle altre risposte è corretta
1078	_____ corrisponde ad una lesione da decubito di 1° grado	L'arrossamento della pelle (senza lesione) che non scompare alla digitopressione (eritema irreversibile)	L'arrossamento della pelle (senza lesione) che scompare alla digitopressione (eritema reversibile)	L'arrossamento della pelle che scompare subito al cambio di posizione	Nessuna delle altre risposte è corretta
1079	Per emoftoe si intende ...	L'emissione di muco frammisto a tracce di sangue in seguito ad un colpo di tosse, proveniente dalle vie respiratorie	L'emissione di sangue con il vomito proveniente dalle vie digerenti superiori	L'emissione dalla bocca di abbondante quantità di sangue proveniente dalle vie aeree	Nessuna delle altre risposte è corretta
1080	I fattori di rischio delle malattie cronico-degenerative sono ...	Consumo di tabacco, sedentarietà, ipertensione, obesità	Sesso, familiarità, fumo in gravidanza, uso di droghe	Elevato stress, tensione muscolare, vizi di postura	Nessuna delle altre risposte è corretta
1081	Cosa indica PAI in ambito sanitario?	Piano di assistenza individuale	Processo di approccio individuale	Piano di assistenza infermieristica	Processo di azione infermieristico
1082	Con l'acronimo ECM si intende definire:	Educazione continua in medicina	Essenziale competenza medica	Educazione e cultura medica	Educazione competenze mediche
1083	L'agenzia italiana del farmaco viene indicata anche con:	AIFA	AGIFA	AGIF	FIIA
1084	Con CIO si intende:	Comitato delle infezioni ospedaliere	Certificato idoneità ospedaliera	Comitato infermieristico e degli operatori socio-sanitari	Nessuna delle altre risposte è corretta
1085	Per FKT si intende:	La fisioterapia	La fito-kino-terapia	Il fisiatra	Il logopedista
1086	Per USCA si intende:	Unità speciale di continuità assistenziale	Unità sanitaria comunità assistiti	Unità subordinata di continuità assistenziale	Unità specialistica di complessità assistenziale
1087	Per ASO si intende:	Accertamento sanitario obbligatorio	Azienda senza operatori	Assistenza sanitaria operatoria	Assistenza socio-oss
1088	Per DSM si intende:	Dipartimento salute mentale	Dipartimento solo medico	Dispositivo solo per medici	Dispositivo sanitario medico
1089	Il BMI è:	Body mass index	Bronchite mielite ad intermittenza	Blood mass intrapheritoneal	Bronco mielite interstiziale
1090	Per BLS si intende:	Basic life support	Blood linear support	Linea base sanitaria	Bronchite lineare superficiale
1091	Per SDO si intende:	Scheda di dimissione ospedaliera	Scheda di diagnosi OSS	Servizio domiciliare di orientamento	Servizio di diagnosi ospedaliera
1092	Cos'è l'ECG?	Elettrocardiogramma	Elettromiografia	Elettroencefalogramma	Elettrocoagulazione
1093	Cos'è la BPCO?	Broncopneumopatia cronica ostruttiva	Broncopolmonite cronica ostruttiva	Bronchite cronica ostruttiva	Bronchite persistente cronica ostruttiva
1094	Cos'è la RSD?	Residenza sanitaria disabili	Residenza sanitaria demenze	Residenza sociale disabili	Residenza sociale demenze

1095	Cos'è l'IMA?	Infarto miocardico acuto	Infarto muscolare acuto	Infarto malato anziano	Infarto medio acuto
1096	Cos'è la RCP?	Rianimazione cardiopolmonare	Respirazione cardiopolmonare	Reazione cardiopolmonare	Riflesso cardiopolmonare
1097	IM indica:	Intramuscolo	In media	In medicina	Indicazione medica
1098	Il SNG è:	Sondino naso gastrico	Sondino nasale gommatto	Sondino nasale gonfiato	Sondino non gonfiato
1099	Il SSR è il:	Servizio sanitario regionale	Servizio sanitario riservato	Servizio sociale regionale	Servizio sociosanitario regionale
1100	Cos'è la RSA?	Residenza sanitaria assistenziale	Residenza socio assistita	Residenza sanitaria assistita	Residenza socio assistenziale
1101	L'ADI è:	Assistenza domiciliare integrata	Assistenza domiciliare intensiva	Assistenza domiciliare interattiva	Assistente domestica italiana
1102	La PA è:	Pressione arteriosa	Pressione atmosferica	Portata arteriosa	Portata atmosferica
1103	La FC è:	Frequenza cardiaca	Formazione comune	Feci compatte	Fisiologia cardiaca
1104	Il CV è:	Catetere vescicale	Catetere vetusto	Callo valvolare	Catetere veicolato
1105	La TC è:	Temperatura corporea	Temperatura craniale	Temperatura certa	Temperatura corretta
1106	Cos'è il PS?	Pronto soccorso	Pronto salvamento	Primo soccorso	Primo salvamento
1107	Il SAD è:	Servizio assistenza domiciliare	Servizio assistenza disabili	Servizio assistenza demenze	Servizio accoglienza demenze
1108	La FR è la:	Frequenza respiratoria	Frequenza ritmica	Frequenza relativa	Familiarità relazionale
1109	Cos'è la SC?	Sottocute	Supercerotto	Sopracute	Solo cerotto
1110	I DPI sono:	Dispositivi protezione individuale	Dispositivi protezione infetti	Dispositivi protezione inalterati	Dispositivi protezione inefficaci
1111	Cos'è la NE?	Nutrizione enterale	Età neonatale	Non estensibile	Non eccedere
1112	L'EEG è:	Elettroencefalogramma	Elettrocardiogramma esterno	Emorragia gastro/enterica	Ematoma esteso grave
1113	La NPT è:	Nursing post traumatico	Nutrizione parentale totale	Nutrizione pre trattamento	Necessario pasto tritato
1114	La ARDS è la:	Sindrome da distress respiratorio acuto	Sindrome da distress respiratorio nell'adulto	Sensazione di disagio respiratorio all'aperto	Sindrome da russamento acuto
1115	Cos'è la ADP?	Assistenza domiciliare programmata	Adenosintrifosfato	Assistenza domiciliare perpetua	Alterata deambulazione parziale
1116	La PEG è:	Gastrostomia endoscopica percutanea	Pressione endogastrica	Portata enterale giornaliera	Progetto esterno di gestione
1117	La sigla MMG è:	Medico di medicina generale	Menomazione mentale generalizzata	Medico di medicina geriatrica	Gestione malattia miocardica
1118	La EMG è:	Elettromiografia	Elettromiocardiografia	Elettrografia mensile	Elettromediografia
1119	I FANS sono:	Farmaci anti - infiammatori non steroidei	Farmaci anti - dolorifici non steroidei	Farmaci ancora non sospesi	Farmaci anti nausea sensibili
1120	Le ICA sono:	Infezioni correlate all'assistenza	Istituti contro gli abusi	Infezioni contratte in ambulanza	Infezioni contratte all'aperto
1121	La MRGE è la:	Malattia da reflusso gastro esofageo	Malattia da reflusso gastro enterico	Medicazione ricorrente con gentamicina	Malattia da rigurgito gestazionale
1122	Per ogni lato ci sono ___ vene giugulari	2	3	4	5
1123	L'accumulo di liquido patologico nella cavità peritoneale viene detta ...	Ascite	Peritonite	Sacculo viscerale	Prostatite
1124	_____ è definita emorragia rettale	La proctorragia	L'ematemesi	La melena	L'epistassi
1125	La causa più frequente di ostruzione intestinale nell'adulto è dovuta a ...	Aderenze	Malattie infiammatorie	Ernie incarcerate	Malattie psichiatriche
1126	La broncocostrizione è a carico del ...	Sistema parasimpatico	Sistema simpatico	Sistema nervoso enterico	Rene
1127	Per _____ si intende il processo che consente l'arresto di un'emorragia	Emostasi	Ematemesi	Emottisi	Epistassi
1128	La circolazione polmonare ha origine ...	Dal ventricolo destro	Dal ventricolo sinistro	Dall'atrio sinistro	Nessuna delle altre risposte è corretta
1129	Per "diafasi" si intende ...	Il corpo delle ossa	Il canale midollare	Un tipo di frattura delle ossa	Le suture del cranio del neonato
1130	L'intestino tenue sfocia nel crasso mediante la valvola ...	Ileocecale	Cardias	Piloro	Ascendente
1131	Il gomito è un'articolazione di tipo ...	Uniassiale	Trocoide	Sellare	Trocleare
1132	L'osso semilunare si trova ...	Nella mano	Nella testa	Nella spalla	Nel gomito
1133	Le ghiandole sudoripare sono ...	Esocrine	Ghiandole di transizione	Parte del sistema immunitario	Endocrine
1134	La sinapsi è la ...	Zona di contatto tra due neuroni	Zona di contatto tra due muscoli	Cavità del cuore	Parte superiore dello stomaco
1135	L'olecrano è una sporgenza ossea situata ...	Nel gomito	Nel ginocchio	Dietro l'acromion	Sulla scapola
1136	La sinfisi pubica viene detta articolazione ...	Scarsamente mobile	Instabile	Temporo - mandibolare	Molle
1137	Il sartorio è situato ...	Nella coscia	Nella mano	Nel gomito	Nel piede
1138	Nella vita intrauterina lo scambio di gas e di sostanze nutritive del sangue avviene ...	Nella placenta	Nel liquido amniotico	Nel fegato	Nel polmone
1139	L'articolazione del ginocchio permette ...	Flessione ed estensione	Abduzione e adduzione	Circonduzione	Rotazione
1140	L'albumina è prodotta da ...	Fegato	Timo	Pancreas	Corteccia surrenale
1141	La funzione dell'emoglobina è ...	Legare e veicolare nel sangue l'ossigeno e l'anidride carbonica	Legare l'ossigeno	Evitare l'anemia falciforme	Legare il ferro
1142	Il normale accrescimento delle ossa è influenzato da ...	Ormoni	Sali di calcio	Midollo	Cartilagine
1143	L'osso sfenoide si trova ...	Nella testa	Nel collo	Nel torace	Nella colonna vertebrale
1144	Il malleolo esterno fa parte ...	Del perone	Dell'omero	Del femore	Della tibia
1145	L'affaticamento muscolare è causato da ...	Acido lattico	Mioglobina	ATP	Creatinina
1146	Il dolore anginoso è tipicamente localizzato in sede ...	Retrosternale	Emitorace destro	Mesogastrico	Fossa iliaca sinistra
1147	La toxoplasmosi è una ...	Malattia da protozoi	Micosi diffusa	Infezione da Arbovirus	Infezione da Citomegalovirus
1148	_____ è una frequente complicanza del morbillo	La broncopolmonite	L'epatite acuta		

1149	Il segno clinico della carenza di vitamina A è ...	Emeralopia (perdita della visione crepuscolare)	Stomatite	Rachitismo	Osteomalacia
1150	_____ si rileva solitamente tremore a riposo, bradicinesia e rigidità muscolare	Nel morbo di Parkinson	Nel morbo di Sturge-Weber	Nella Sclerosi laterale amiotrofica	Nella Sclerosi a placche
1151	La colonna vertebrale presenta ...	7 vertebre cervicali	6 vertebre lombari	6 vertebre sacrali	Una cifosi e due lordosi
1152	Indicare l'affermazione errata sulle ghiandole gastriche	Producono le amilasi	Producono l'acido cloridrico	Producono il pepsinogeno	Producono un enzima proteolico
1153	Indicare l'affermazione corretta. Nell'apparato circolatorio ...	L'aorta trasporta sangue arterioso	L'arteria polmonare trasporta sangue arterioso	Le arterie coronarie nascono dall'arteria polmonare	Le vene cave nascono dal ventricolo sinistro
1154	Il midollo osseo è ...	Un organo linfoide	Costituito da osteoni	Contenuto solo nelle ossa lunghe	Contenuto solo nelle ossa piatte
1155	Nel versamento pleurico di cospicua entità il decubito abituale è quello ...	Laterale sul lato ammalato	Ortopnoico	Laterale sul lato sano	Prono
1156	Per arresto cardiaco si intende ...	La cessazione dell'attività meccanica del cuore	La cessazione dell'attività elettrica del cuore	La cessazione dell'attività sia elettrica che meccanica del cuore	Nessuna delle altre risposte è corretta
1157	Il primo esame diagnostico che si esegue in caso di sospetto aneurisma è ...	Ecografia	Urocoltura	T.A.C.	Angiografia
1158	La causa più frequente di arresto cardiaco extraospedaliero è la ...	Fibrillazione ventricolare	Dissociazione elettromeccanica	Asistolia	Insufficienza renale cronica
1159	La struttura che non può rigenerarsi riguarda ...	I centri nervosi	L'epitelio	Il fegato	La cute
1160	Per "laparocèle" si intende ...	Erniazione di visceri attraverso un difetto di parete in sede di pregressa cicatrice chirurgica	Erniazione di visceri attraverso la non completa oblitterazione della cicatrice ombelicale	Erniazione di visceri attraverso la linea alba sovraombelicale	Erniazione di visceri attraverso un difetto di parete tra il bordo laterale del muscolo retto e la linea semilunare
1161	La causa più frequente di pancreatite cronica è generalmente ...	Alcolismo	Ipertrigliceridemia	Iperlipidemia	Deficit di folati
1162	_____ è una rilevanza cutanea di consistenza molle alla palpazione, colorito rosso, rosa o bianco porcellanaceo, espressione di un edema circoscritto del derma	Il pomfo	La bolla	L'eritema	La nodosità
1163	Un neurotrasmettitore è ...	Una molecola che stabilisce una connessione tra un neurone e l'altro a livello della sinapsi (neurone pre e post-sinaptico)	Una molecola che stabilisce una connessione tra un neurone e le cellule stromali dell'ambiente circostante	Un canale ionico che, regolando l'equilibrio elettrolitico entro e fuori la cellula, dà origine al potenziale d'azione o a una catena di secondi messaggeri	Un neurone deputato a regolare la funzione di altri neuroni
1164	L'aterosclerosi è una ...	Forma particolare di arteriosclerosi caratterizzata da una deposizione lipidica nel contesto dell'intima con localizzazione prevalentemente focale	Patologia progressiva a decorso cronico a carico dell'apparato respiratorio	Forma particolare di arteriosclerosi presente solo nei pazienti con mutazione del gene HLA-B27	Forma particolare di arteriosclerosi che colpisce esclusivamente le arterie coronarie
1165	Lo pneumotorace iperteso ...	Presenta silenzio respiratorio all'emittoce interessato con deviazione controlaterale del mediastino	E' causato sempre da un trauma toracico penetrante	Presenta silenzio respiratorio all'emittoce interessato con deviazione omolaterale della trachea	Va sospettato in caso di riduzione della pressione di picco inspiratoria durante la ventilazione meccanica
1166	Il volvolo è ...	Un'occlusione meccanica di strangolamento	Una patologia infiammatoria intestinale	Un'occlusione da compressione estrinseca	Un'occlusione meccanica
1167	La sindrome di Down (trisomia 21) si osserva tipicamente associata a ...	Difetti del canale atrio-ventricolare	Stenosi aortica	Artresia della tricuspide	Coartazione aortica
1168	Le arterie del retto derivano dall'arteria ...	Ipogastrica e mesenterica inferiore	Iliaca esterna	Mesenterica inferiore	Ipogastrica
1169	Nell'uso del sollevatore si deve ...	Sistemare le fasce di sostegno sotto al paziente	Fare attenzione ad utilizzarlo solo per soggetti superiori a 120 Kg	Utilizzare la fasce di sostegno solo per soggetti non infetti	Tutte le altre risposte sono corrette
1170	Per prevenire la lesione da decubito è utile ...	Mantenere la cute pulita e asciutta	Effettuare la cura della cute con detergenti energici	Effettuare massaggi a base di alcool saponato	Effettuare la cura della cute solo con sapone di marsiglia
1171	Nella fase di preparazione della salma, la composizione e trasporto deve essere effettuata _____ dalla morte	Entro le prime ore (2-3)	Dopo le 3-4 ore	Dopo le 4-5 ore	Dopo le 24 ore
1172	_____ è di competenza dell'OSS nel caso di un paziente con colostomia	L'applicazione della placca e del sacchetto per la raccolta delle feci	L'esecuzione delle medicazioni all'ano artificiale con creme apposite	La scelta della dieta ideale per il paziente, in base alle sue condizioni	La terapia farmaceutica
1173	L'impiego dell'enteroclistma si esegue per scopo ...	Evacuativo, di pulizia e terapeutico	Idratativo, analgico, ritentivo	Diagnostico, curativo e terapeutico	Nessuna delle altre risposte è corretta
1174	Quando si mobilita un paziente per la prima volta dopo un intervento chirurgico deve/devono essere presenti ...	Un infermiere	Un OSS e un parente	Una coppia di OSS	Una coppia di medici
1175	Quando si trasporta un assistito in barella si deve ...	Alzare i cancellini, tenerlo coperto, controllare le reazioni	Tenerlo coperto, manovrare dalle gambe, controllare la fleboclisi	Manovrare dalle gambe, controllare le sue reazioni, parlare con la persona	Nessuna delle altre risposte è corretta
1176	Se si deve procedere a sollevare dalla poltrona una persona con difficoltà motorie, il sistema più corretto è ...	Mettere un piede davanti a quelli della persona assistita, posizionare le mani sotto al bacino, con le braccia dell'assistito al collo dell'operatore	Sollevando la persona per le braccia, l'operatore deve posizionare i suoi piedi tra quelli dell'assistito ponendo le braccia dell'assistito sulle sue spalle	Sollevare l'assistito da sotto le ascelle, far tenere le braccia lungo il corpo e le gambe divaricate	Nessuna delle altre risposte è corretta
1177	La _____ è un disturbo della mobilità volontaria a causa di una lesione nervosa	Paralisi	Ipertrofia	Parestesia	Cianosi
1178	La differenza tra ausilio maggiore e minore ...	Dipende dalla grandezza	Dipende dall'efficacia	Dipende dalla forza impiegata dall'operatore che lo utilizza	Nessuna delle altre risposte è corretta

1179	Per "aneurisma" si intende ...	Dilatazione permanente e irreversibile di un'arteria con perdita del parallelismo delle pareti e diametro trasverso che superi di almeno il 50% quello dell'arteria normale	Dilatazione diffusa di un'arteria, permanente, a prescindere dalla entità dell'incremento di diametro rispetto a quella dell'arteria normale o del segmento prossimale alla dilatazione	Dilatazione formatasi da una comunicazione diretta con il lume del vaso, le cui pareti non presentano i normali costituenti elastici e muscolari di una parete arteriosa	Restringimento patologico di un'arteria con perdita del parallelismo
1180	La neuroaprassia viene definita ...	Una condizione in cui non sia osservabile un'interruzione anatomica degli assoni, ma solo un blocco della conduzione	Una condizione in cui sia osservabile un'interruzione anatomica degli assoni, ma cui rimangono integre le guaine connettivali	Una condizione in cui il nervo è completamente interrotto	Una condizione che di solito non guarisce spontaneamente
1181	Un paziente di 40 anni riferisce dolore addominale da 24 ore, vomito, alvo chiuso e feci. Alla palpazione si rileva distensione addominale e all'auscultazione iperperistaltismo. Grave complicanza nelle occlusioni intestinali meccaniche è lo strangolamento. _____ NON comporta rischio di strangolamento	Il fecaloma	L'ernia strozzata	Il volvolo	L'invaginazione
1182	Per "eupnea" si intende ...	Respiro normale, regolare	Aumento della frequenza respiratoria	Difficoltà respiratoria	Diminuzione della frequenza respiratoria
1183	_____ assorbe la maggior parte dei nutrienti	L'intestino tenue	Lo stomaco	Il retto	L'intestino crasso
1184	La concentrazione di cloro in una soluzione ipotonica è ...	1% - 2,5%	7% - 9,5%	10% - 11%	10% - 12,5%
1185	A proposito della mobilitazione dell'assistito, è corretto affermare che nella posizione semiseduta la testata del letto deve essere sollevata a:	45 gradi	30 gradi	60 gradi	15 gradi
1186	A quale livello deve essere mantenuta la sacca di raccolta della diuresi?	Al di sotto del livello della vescica	Al livello dell'uretra	Al di sopra dell'appendice	Sul fianco destro
1187	A un paziente con sondino naso-gastrico si può far assumere:	cibo e acqua sia con il sondino sia per via orale (su indicazione dell'infermiere)	alimenti o bevande molto caldi o molto freddi	alimenti troppo densi o pastosi	solo cibi grassi
1188	A un paziente diabetico l'OSS può consigliare di avere cura dei suoi piedi:	utilizzando calze morbide, senza cuciture e scarpe comode	utilizzando calze rigide	utilizzando calze morbide, con cuciture	utilizzando scarpe comode, ma con calze rigide e cuciture rinforzate
1189	A un paziente ricoverato è stata prescritta una dieta ad alto contenuto di fibre: di quali alimenti dovranno essere aumentate le porzioni quotidiane?	Verdura e frutta	Grassi e verdure	Frutta e grassi	Carboidrati e grassi
1190	Ad un paziente a cui deve essere praticato un clistere, quale posizione è preferibile far assumere?	Decubito laterale sinistro	Posizione prona	nessuna delle altre risposte è corretta	Frontale, a 45 gradi
1191	Ad un paziente con sondino nasogastrico:	si può far assumere cibo e acqua con il sondino	non si può mai far assumere cibo e acqua con il sondino	si deve avere l'accortezza di porlo in isolamento, anche dai parenti	deve essere posizionato nel letto con gli elastici che impediscono ogni suo movimento (paralisi farmacologica indotta)
1192	Ad un paziente diabetico, l'OSS:	può consigliare di avere cura dei suoi piedi utilizzando calze morbide e senza cuciture e scarpe morbide	può consigliare di avere cura dei suoi piedi utilizzando calze rigide	può consigliare di avere cura dei suoi piedi utilizzando calze morbide, con cuciture	può consigliare di avere cura dei suoi piedi utilizzando scarpe comode, ma con calze rigide e cuciture rinforzate
1193	Ai primi sintomi di svenimento come è consigliato intervenire?	Far sedere su una sedia piegata in avanti con la testa bassa tra le gambe e far respirare profondamente	Far sedere su una sedia con la testa alta e i cubi iperbarici sulle gambe	Sdraiare la persona a pancia in giù e le gambe unite	Far inginocchiare il paziente, con la testa rivolta verso il soffitto
1194	Al fine di prevenire la trasmissione di infezioni, quali delle seguenti azioni è corretto compiere durante il rifacimento del letto?	Evitare di appoggiare la biancheria pulita sopra a quella sporca	Appoggiare la biancheria pulita sopra quella sporca	Predisporre una biancheria più soffice, nel caso in cui il paziente lo richieda	Spruzzare sulla biancheria pulita il clorosodio idrorepellente, prima di posizionarla sul letto
1195	Al fine di prevenire le infezioni ospedaliere, l'OSS deve attenersi alle seguenti regole:	le unghie devono essere corte e pulite, prive di smalto; anelli, bracciali e orologio non devono essere indossati durante il turno	le unghie devono essere corte e pulite, è consentito l'uso di smalti per unghie; è consentito l'uso di anelli, ma non di bracciali e orologio durante il turno	le unghie possono essere anche molto lunghe, purché pulite e smaltate con la protezione; è consentito l'uso di anelli, bracciali e orologi durante il turno	nessuna delle altre risposte è corretta
1196	Al fine di prevenire l'insorgenza di lesioni da pressione in un paziente allettato, occorre mobilitare il paziente:	ogni due ore	ogni sei ore	ogni dodici ore	ogni ventiquattro ore
1197	Al fine di ridurre i rischi per la schiena, quali accorgimenti si devono prendere prima di sollevare un peso?	Allargare i piedi per aumentare la base di appoggio e piegare le gambe	Indossare l'apposita fascia paralizzante	Nessuna delle altre risposte è corretta	Indossare i guanti che consentono di evitare scivolamenti e la fascia di protezione per la colonna vertebrale
1198	Al fine di una comunicazione efficace si deve evitare:	Incongruenza fra comunicazione verbale e non verbale	che ci sia congruenza tra comunicazione verbale e non verbale	di parlare a voce troppo alta	di gesticolare in modo eccessivo e usare termini troppo banali o semplici
1199	Al termine dell'igiene il prepuzio deve essere riportato nella posizione iniziale per:	prevenire l'edema del glande	consentire l'edema del glande	incoraggiare il paziente ad urinare	prevenire eventuali erezioni durante l'operazione
1200	Allorquando il malato non sia in grado di esprimere il suo consenso, come si procede?	Decidono i congiunti del malato	Non possono decidere i congiunti	Decide sempre un membro del tribunale del malato	Decide sempre il sindaco in quanto

1201	Anna, ospite affetta da una demenza di grado lieve, inserita presso la Casa Residenza 'Il melograno', si rifiuta di alzarsi quando in turno c'è l'Operatore Socio-Sanitario Marco. Un giorno, casualmente, assisti all'alzata di Anna da parte di Marco e ti rendi conto che il tuo collega utilizza dei modi molto scortesi e sbrigativi e tende ad alzare la voce di fronte alla scarsa collaborazione dell'ospite. Quale iniziativa ritieni più adeguata?	Ti affianchi a Marco per aiutarlo a terminare l'alzata di Anna; in un secondo momento, senza che l'ospite sia presente, gli chiedi in modo assertivo di confrontarsi rispetto all'accaduto, coinvolgendo anche la RAA	Riprendi tutto l'accaduto con un telefono, senza chiedere alcun tipo di confronto, perché potrebbe servire alla paziente per eventuali ricorsi giudiziari	Ti affianchi a Marco, rimproverandolo pesantemente, di fronte ad Anna, per i modi usati senza chiedere subito dopo l'intervento della RAA	Eviti di confrontarti con il collega e fai finta di vedere
1202	Basculando indietro la carrozzina è quella manovra che:	impedisce lo scivolamento in avanti del bacino	favorisce il rafforzamento delle strutture fibrose dei muscoli	impedisce il vomito	favorisce la digestione
1203	Basculando indietro la carrozzina:	Si impedisce lo scivolamento in avanti del bacino	Si favorisce la perfetta respirazione	Si impedisce al paziente di consumare troppi Sali minerali	Si favorisce il vomito del paziente
1204	Bisogna ricorrere all'uso dei guanti quando:	vi è il rischio di contatto con materiale biologico	si vogliono mantenere le unghie lunghe e poco curate	non vi è alcun rischio di contatto con materiale biologico	si termina il proprio turno di lavoro
1205	Che cosa bisogna fare davanti ad un soggetto che ha un'ostruzione parziale delle vie aeree, che tossisce e si agita?	Non intervenire con nessuna manovra, ma invitarlo a calmarsi e cercare di tossire in maniera più efficace	Intervenire con la manovra di Nightingale, per far calmare il paziente, stringendo con cura i suoi polsi	Incoraggiare a bere liquidi	Colpire energicamente sulla schiena
1206	Che cosa bisogna fare in caso di assideramento?	Evitare all'infortunato qualsiasi tipo di movimento diretto e indiretto	Far accomodare l'infortunato in un ambiente eccessivamente caldo	Avvicinare il corpo dell'infortunato alla piastra riscaldata	Favorire qualsiasi tipo di movimento diretto e indiretto all'infortunato
1207	Che cosa bisogna fare in caso di emorragia?	Comprimere la ferita con un panno pulito, tenendo premuto con il palmo della mano	Applicare un bendaggio troppo stretto	Alzare la parte del corpo ferita	Ritardare l'assistenza medica
1208	Che cosa deve fare l'OSS di fronte a un paziente con crisi epilettica?	Far assumere al paziente una posizione di sicurezza, allontanare gli oggetti che possano essere pericolosi e fare in modo che non si ferisca con questi	Tentare di bloccarlo con ogni mezzo, avvicinando gli oggetti che possano essere pericolosi	Non contenerlo e allontanarsi, lasciandolo solo fino a che la crisi non termina	Somministrare un pesante paralizzante
1209	Che cosa occorre fare prima di procedere al massaggio cardiaco?	Verificare le pulsazioni attraverso la rilevazione del polso carotideo	Non verificare le pulsazioni attraverso la rilevazione del polso carotideo	Un Oss deve sempre improvvisare e non eseguire eventuali istruzioni del personale medico	Nessuna delle altre risposte è corretta
1210	Che tipo di assistenza presta l'OSS ad un bambino con colostomia?	Provvede ad applicare il sacchetto per la raccolta delle feci	L'OSS deve cambiare o gestire il dispositivo di colostomia senza una formazione adeguata e supervisione da parte del personale infermieristico specializzato	L'OSS deve ignorare segni di infezione o irritazione intorno al sito della colostomia	L'OSS ha il dovere di somministrare farmaci o trattamenti intorno al sito della colostomia senza indicazioni specifiche da parte del personale sanitario
1211	Che tipo di lavaggio deve effettuare l'OSS nel caso di contatto con materiale biologico?	Il lavaggio antisettico	Deve limitarsi a lavare la pelle solo con acqua	Non deve effettuare alcun tipo di lavaggio	Deve evitare di disinfettarsi e indossare subito i guanti
1212	Collaborando con l'infermiere nella somministrazione della terapia auricolare, l'OSS potrà:	preparare, tra il materiale occorrente, dei batuffoli di cotone	prescrivere farmaci per il trattamento dell'orecchio	eseguire procedure invasive all'interno dell'orecchio, come l'inserimento di tubi di drenaggio auricolari o la rimozione di corpi estranei dall'orecchio, senza formazione specifica e supervisione adeguata da parte del personale medico qualificato	ignorare segni di complicazioni
1213	Collaborando con l'infermiere nella somministrazione della terapia oftalmica, l'OSS potrà:	preparare, tra il materiale occorrente, dei tamponi oculari	somministrare farmaci oftalmici anche senza una prescrizione medica	prescrivere farmaci per il trattamento di condizioni oculari	eseguire procedure invasive sugli occhi, come l'inserimento di lenti a contatto, la rimozione di corpi estranei dall'occhio o altre procedure che coinvolgono il trattamento diretto dell'occhio, senza ricevere istruzioni dall'infermiere
1214	Collaborando con l'infermiere nella somministrazione della terapia rettale, l'OSS potrà:	preparare, tra il materiale occorrente, dei guanti monouso	prescrivere farmaci per il trattamento di condizioni intestinali o retali	eseguire procedure invasive nel retto, come l'inserimento di clisteri, l'irrigazione del colon o altre procedure invasive che coinvolgono il trattamento diretto dell'intestino, senza ricevere istruzioni dall'infermiere	trascurare l'igiene e la sicurezza durante la somministrazione della terapia rettale
1215	Collaborando con un infermiere durante la medicazione a un'ustione, l'OSS potrà:	far assumere la posizione più confortevole al paziente	diagnosticare l'entità o la gravità dell'ustione	trascurare l'igiene e la sicurezza durante la medicazione dell'ustione	rimuovere vestiti attaccati alla pelle, a mani nude
1216	Collaborando con un infermiere durante la medicazione di una ferita chirurgica semplice, l'OSS potrà:	far assumere la posizione più confortevole al paziente	prescrivere farmaci o trattamenti per la ferita chirurgica	eseguire procedure invasive sulla ferita chirurgica, come la rimozione di punti di sutura o la manipolazione della ferita, anche senza formazione specifica e supervisione adeguata	trascurare l'igiene e la sicurezza durante la medicazione della ferita chirurgica
1217	Come avviene il confezionamento in caso di biancheria infetta?	Separatamente attraverso un sacco interno idrosolubile e un sacco esterno in polietilene	Manipolando la biancheria con le mani nude	Trascurando l'etichettatura dei sacchi	Mischiando la biancheria infetta con quella pulita
1218	Come bisogna intervenire, in caso di stiramento?	Applicare bende fredde e immobilizzare la parte dolorante	Eseguire le operazioni senza indossare guanti monouso	Alzare le sponde del letto	Collocare i cuscini sotto la testa

1219	Come bisogna intervenire, in caso di ustione e di corpo in fiamme?	Spegnere le fiamme degli abiti con una coperta	Rompere le bolle che si formano sull'ustione	Utilizzare ghiaccio direttamente sulla zona ustionata per 10-15 minuti	Rimuovere vestiti attaccati alla pelle
1220	(OSS) Come deve avvenire il massaggio cardiaco?	Comprimendo lo sterno contro il rachide, spingendo verticalmente	Somministrando un farmaco di reazione	Esercitando pressione sulla zona addominale	Nessuna delle altre risposte è corretta
1221	Come deve comportarsi l'OSS nel caso in cui un parente chieda notizie su un paziente ricoverato nel reparto?	Deve indirizzare il parente al medico, al coordinatore infermieristico o all'infermiere	Deve divulgare informazioni personali del paziente, direttamente	Deve rivelare l'ubicazione del paziente senza autorizzazione	Deve mostrarsi scontroso
1222	Come deve essere conservato il materiale sterile?	In armadi chiusi al riparo da luce, calore, umidità e polvere	In locali facilmente accessibili	In contenitori di amianto	In contenitori che prevedano l'inserimento esterno di gas idrosaturi
1223	Come deve essere effettuata la pulizia del cavo orale in una persona che porta una protesi dentaria?	Dopo la rimozione della protesi	Utilizzando spazzolini duri o abrasivi	Immergendo la protesi in soluzioni aggressive	Nessuna delle altre risposte è corretta
1224	Come deve essere effettuato il trasporto dei campioni biologici?	Mediante l'utilizzo di contenitori di trasporto ermetici e infrangibili	Se i campioni biologici richiedono temperature controllate, l'OSS deve trascurare il mantenimento della catena del freddo	È importante non mantenere i campioni biologici separati da altre sostanze e materiali durante il trasporto	È importante organizzare il trasporto dei campioni biologici il più lentamente possibile dopo il prelievo per garantire la conservazione delle loro caratteristiche
1225	Come deve essere posizionata una padella?	La parte chiusa si posiziona sotto i glutei, mentre la parte aperta è rivolta verso i piedi della persona	È importante collocarla in una posizione non accessibile e scomoda per il paziente	L'OSS deve posizionare la padella su superfici irregolari o instabili	Durante l'evacuazione, è consigliato posizionare la padella in luoghi molto esposti o visibili ad altri pazienti o membri del personale sanitario
1226	Come deve essere posizionato un paziente che vomita?	Con la testa di lato e con un telo sotto la testa	Posizionare il paziente in posizione supina	Posizionare il paziente in posizione di Trendelenburg	Sollevare eccessivamente la testa del paziente
1227	Come deve essere praticata la fototerapia a un neonato itterico?	Esponendo il bambino nudo con gli occhi protetti da una benda opaca alla luce di lampade fluorescenti a luce blu e somministrandogli spesso dei liquidi	Evitando di proteggere gli occhi del neonato	Trascurando di monitorare la temperatura del neonato	Consigliando l'allattamento in camere buie
1228	Come deve essere tenuto il piano del letto, nel lavaggio dei capelli a letto?	Il più possibile alto	Il più possibile basso	Con pendenza di 25 gradi	Con pendenza di 35 gradi
1229	Come devono essere raccolte le urine per eseguire l'urinocoltura?	In modo asettico	A mani nude, senza indossare i guanti monouso	Prima di raccogliere le urine, l'OSS non deve lavare accuratamente le mani con acqua e sapone	Evitando di utilizzare un contenitore sterile
1230	Come intervenire in caso di atteggiamenti aggressivi di un paziente anziano?	Tenere un atteggiamento calmo e non nervoso, senza bloccare fisicamente la persona	Utilizzare la forza fisica per controllare o sopprimere il comportamento aggressivo del paziente anziano	È appropriato ignorare o minimizzare il comportamento aggressivo del paziente anziano, senza cercare di capire le cause sottostanti del comportamento	Rispondere con aggressività
1231	Come prestare soccorso ad un soggetto in stato di shock?	Stenderlo e coprirlo con una coperta	È appropriato trascurare di monitorare i segni vitali del paziente	Trattare il paziente in modo brusco o insensibile	Somministrare farmaci anche senza prescrizione medica
1232	Come può essere effettuata la disinfezione?	Con mezzi fisici, chimici o gassosi	Sempre a mani nude, senza indossare i guanti monouso	Non arieggiare l'ambiente dopo la disinfezione, anche qualora sia consigliato	Anche qualora sia prescritto, trascurare il rispetto del tempo di contatto specifico, affidandosi all'istinto
1233	Come si comporta l'OSS di fronte a un paziente che nel maneggiare una pentola si è ustionato una mano?	Applica acqua fredda per alleviare il dolore	Applicare creme o unguenti senza consulenza medica	Rompere le bolle della ustione	Trascurare il monitoraggio del paziente
1234	Come si deve comportare l'OSS di fronte ad un paziente con crisi epilettica?	Allontanare gli oggetti che possono essere pericolosi e far in modo che non si ferisca con questi	Allontanarsi e lasciarlo da solo, in modo da non innervosirlo sino a quando la crisi non termina	Nessuna delle altre risposte è corretta	Accertarsi che gli sia somministrato un farmaco contro le tumefazioni
1235	Come si deve comportare l'OSS di fronte ad un paziente con crisi epilettica?	Allontanare gli oggetti che possano essere pericolosi e fare in modo che non si ferisca con questi, dopo ciò cercare di sdraiare la persona	Allontanare gli oggetti che possano essere pericolosi e lasciarlo al buio	Chiuserlo a chiave in una stanza	Allontanarsi e lasciarlo da solo, in modo da non innervosirlo sino a quando la crisi non termina
1236	Come si deve comportare l'OSS, nel caso in cui un paziente segnali dolorabilità?	Effettua la segnalazione all'infermiere/caposala	Evitare di riferire tutto all'infermiere	Convocare i medici	Evitare di rassicurare il paziente
1237	Come si misura la frequenza respiratoria?	Atti per minuto	Senza informare il paziente, prima di iniziare la misurazione	Trascurando la registrazione dei risultati	Nessuna delle altre risposte è corretta
1238	Come si misura la glicemia in maniera esatta?	Con il glucometro digitale	Con un retrattore	Con un bisturi	Con gli schizzettoni
1239	Come si ottiene la pervietà delle vie aeree in un soggetto in arresto cardiaco non traumatizzato?	Iperestendendo il capo e sollevando il mento	L'OSS deve piegare la testa del paziente in modo brusco	L'OSS deve usare la manovra di Turing	Ordina all'infermiere le procedure da eseguire
1240	Come si può trattare la ferita presente in zone escoriate o genericamente prive di epitelio?	Possono essere d'ausilio delle garze sterili vasellinate	Bisogna applicare prodotti irritanti o aggressivi	Bisogna forzare la rimozione di tessuti necrotici, evitando che si stacchino naturalmente durante il processo di guarigione	Coprire la ferita con materiali adesivi
1241	Come si può trattare la ferita se sono presenti in essa zone escoriate o genericamente prive di epitelio?	Possono essere d'ausilio delle garze sterili vasellinate	Trattare le zone escoriate in modo aggressivo	Bisogna applicare prodotti irritanti o aggressivi	Coprire la ferita con materiali adesivi
1242	Come si rileva la funzione respiratoria in un soggetto?	Rilevando la presenza o meno del movimento ritmico del torace verso l'alto e verso il basso	Trascurando il conteggio della frequenza respiratoria	Nessuna delle altre risposte è corretta	In questo caso, non deve valutare la profondità respiratoria

1243	Come si valuta lo stato di coscienza di una persona non traumatizzata?	Chiamandola a voce alta e scuotendola per le spalle	Fare domande complesse o ambigue per confondere il paziente	Utilizzare sempre stimoli dolorosi in modo inappropriato	Trascurare l'aggiornamento delle informazioni sulla valutazione dello stato di coscienza del paziente nel sistema di registrazione medica
1244	Come va preparata la borsa del ghiaccio?	La si riempie per due terzi e, prima di chiuderla si fa fuoriuscire l'aria in eccesso	La si riempie di gas brupofene, affinché il contenuto si raffreddi subito e mantenga la freddezza	Per evitare ustioni da ghiaccio, posizionare la borsa del ghiaccio direttamente sulla pelle del paziente, senza coprirlo con un panno	Nessuna delle altre risposte è corretta
1245	Come viene effettuato il trasporto dei campioni ematici?	Utilizzando un contenitore a chiusura ermetica	Deve essere trasportato senza un adeguato contenitore	Deve essere trasportato senza adeguata etichettatura	Deve essere trasportato senza controllo della temperatura
1246	Con l'autoclave non è possibile sterilizzare:	apparecchiature che risentono negativamente dell'alta temperatura di esercizio (120 gradi)	indumenti	materiali per la pulizia e l'igiene	biancheria
1247	Con l'autoclave non è possibile sterilizzare:	fibre ottiche	indumenti	materiali per la pulizia e l'igiene	biancheria
1248	Con l'uso delle stampelle "canadesi" il paziente che sale le scale:	parte con la gamba sana, poggiando la stessa sul gradino superiore	parte con la gamba infortunata, poggiando la stessa sul gradino superiore	evita di fare pause, anche se mostra segni di affaticamento, per non perdere il respiro	deve operare seguendo la procedura di Turing o di Helsting
1249	Con quale ausilio si può posizionare un bambino non collaborante e obeso?	Il sollevatore	Il bisturi	Lo stantuffometro	Lo stetofonendoscopio
1250	Con quale frequenza deve essere pulita con una salvietta asciutta la sagoma rimovibile della protesi auricolare?	Quotidianamente	Due volte al mese	Due volte alla settimana	Tre volte alla settimana
1251	Con quale frequenza va effettuato il cambio della biancheria nel letto di un bambino ospedalizzato?	Almeno una volta al giorno	Almeno una volta al mese	Almeno una volta alla settimana	Mai
1252	Con riferimento all'alimentazione di un soggetto diabetico, quale affermazione, tra le seguenti, è vera?	Occorre verificare l'assunzione dell'intero pasto	Somministrare sempre alimenti ad alto contenuto di zucchero	Saltare sempre i pasti o ritardarli	Somministrare sempre grandi quantità di cibo in una sola volta
1253	Con riferimento all'utilizzo del sollevatore, quale affermazione è corretta?	Le fasce di sostegno vanno posizionate sotto il paziente	Posizionare il sollevatore in modo da consentire un accesso sicuro al paziente e un trasferimento agevole su una superficie stabile e sicura	Applicare le cinghie o le imbracature necessarie al paziente in modo sicuro e confortevole	Assicurarsi che il paziente sia stabilizzato e che la superficie di atterraggio sia stabile prima di completare il trasferimento
1254	Cosa è necessario fare prima di eseguire il lavaggio dei ferri?	Indossare i dispositivi individuali previsti dal protocollo	Trascurare la pulizia e la disinfezione delle superfici di lavoro	Utilizzare prodotti chimici dannosi o non adatti	Trascurare la sicurezza personale
1255	Cosa deve essere in grado di osservare e riferire l'O.S.S. in merito al controllo della diuresi?	Quantità, colore, trasparenza e odore delle urine	L'OSS deve evitare di prestare attenzione all'odore dell'urina del paziente, concentrandosi solo sul colore	L'OSS deve tralasciare se c'è presenza di sangue o sedimenti nell'urina del paziente, poiché ciò potrebbe indicare problemi ai reni o alle vie urinarie	Nessuna delle altre risposte è corretta
1256	Cosa NON è corretto fare, durante l'esecuzione del bagno di pulizia?	Non valutare le abitudini del malato	L'OSS deve pulire accuratamente il corpo del paziente utilizzando acqua e sapone o detergenti specifici, assicurandosi di raggiungere tutte le parti del corpo, compresi le aree difficili da raggiungere come l'inguine e sotto le ascelle	Prima di iniziare il bagno, l'OSS deve assicurarsi che l'ambiente sia adeguatamente preparato e deve indossare i guanti monouso	Dopo il bagno, l'OSS deve aiutare il paziente a indossare biancheria pulita e asciutta, inclusi vestiti e lenzuola
1257	Cosa NON deve fare l'OSS riguardo alla procedura della tricotomia?	Effettuarla 24 ore prima di un intervento chirurgico	Indossare i guanti monouso	Verificare l'identità del paziente	Tendere la cute ed eseguire la tricotomia in direzione del pelo
1258	Cosa si deve evitare in caso di dieta a basso residuo di scorie?	Verdura, legumi, patate, frutta fresca	Incrementare la somministrazione di verdure, ma evitare la frutta fresca	Incrementare la somministrazione di patate, cioccolata, evitando verdura	Incrementare la somministrazione di frutta fresca, evitando patate
1259	Cosa si utilizza per la sanificazione di una superficie?	Detergenti (saponi)	Acetilcisteina	Bicalutamide	Entecavir
1260	Davanti ad una persona con crisi epilettica, l'OSS deve:	Fare in modo che non si ferisca durante la fase convulsiva, senza contenerla	Usare cerotti con effetto placebo e paralizzante	Non intervenire e lasciare che si calmi da solo, al buio	Effettuare la manovra di Goolman
1261	Di che colore è l'ogiva della bombola dell'ossigeno?	Bianca	Rossa	Blu	Verde
1262	Di fronte a un paziente con crisi epilettica l'OSS deve:	allontanare gli oggetti che possano essere pericolosi e fare in modo che non si ferisca con questi; in seguito cercare di far sdraiare la persona	allontanarsi e lasciarlo completamente al buio	bloccarlo con ogni mezzo, facendosi aiutare dai presenti e somministrargli un paralizzante	costringerlo a stare sdraiato e lasciarlo al buio con i tappi alle orecchie per produrre la sordità simulata
1263	Di norma, quando va eseguita la tricotomia in preparazione di un intervento chirurgico?	La mattina dell'intervento	La sera dell'intervento	Il giorno prima dell'intervento	Un giorno dopo l'intervento
1264	Di quanto è sollevata la testata del letto nella posizione semi-seduta?	30 gradi - 60 gradi	75 gradi - 80 gradi	60 gradi - 80 gradi	65 gradi - 75 gradi
1265	Dopo aver posizionato la persona si deve in primo luogo:	assicurarsi che la posizione sia sicura e di gradimento dell'assistito	evitare l'uso dei DPI	cambiare la biancheria del letto	non interessarsi al gradimento dell'assistito
1266	Dove bisogna mettere la carrozzina, per poter spostare dal letto alla carrozzina un residente che può caricare solo sulla gamba destra?	A destra del residente	A sinistra del residente	Nella posizione più comoda all'Oss	Nella posizione più comoda al medico
1267	Dove si devono mettere le mani quando si effettua una presa per spostare il residente?	A livello di scapole e bacino	Sotto le ginacchia	Immediatamente sotto le ascelle	Sulle spalle
1268	Durante il trasferimento di un paziente dal letto alla sedia a rotelle applicare la cintura:	intorno alla vita del paziente	intorno alle gambe del paziente	intorno al collo del paziente	in modo da bloccare completamente le braccia del paziente

1269	Durante il trasferimento di un paziente dal letto alla sedia a rotelle bisogna mettere la sedia a rotelle parallela al letto dal lato:	più comodo per il paziente	più comodo per l'Oss	più comodo per l'infermiere	più comodo per il medico curante
1270	Durante il trasferimento di un paziente dal letto alla sedia a rotelle come prima cosa bisogna:	sempre lavarsi le mani	chiedere all'infermiere di montare la sedia a rotelle	somministrare al paziente una dose di calmante	Nessuna delle altre risposte è corretta
1271	Durante il trasferimento di un paziente dal letto alla sedia a rotelle come ultima cosa bisogna:	garantire la sicurezza del paziente, invitandolo a spingersi indietro sul sedile della sedia, abbassando i poggiatesta e sistemandovi i piedi del paziente	coinvolgere il medico curante nell'atto del trasferimento	chiedere all'infermiere di montare la sedia a rotelle	somministrare al paziente una dose di calmante
1272	Durante il trasferimento di un paziente dal letto alla sedia a rotelle, bisogna aiutare il paziente ad assumere la posizione seduta sul bordo del letto e ad indossare:	una vestaglia e calzature antiscivolo	una vestaglia, sollevando le traverse del letto	una guaina	una vestaglia e posizionare sotto le gambe i guscini vibranti
1273	Durante la pulizia degli occhi, la rimozione delle secrezioni deve essere effettuata procedendo:	Dall'angolo palpebrale interno verso l'esterno	Dall'angolo palpebrale esterno verso l'interno	Con disinvoltura, senza rispettare un verso particolare	Nessuna delle altre risposte è corretta
1274	La tricotomia, nel caso in cui fosse necessaria, deve essere eseguita:	la mattina dell'intervento	la sera dopo l'intervento	la mattina dopo l'intervento	il giorno prima dell'intervento, secondo le predisposizioni del paziente
1275	Durante la somministrazione della terapia orale, l'OSS:	deve verificare che la persona ingerisca effettivamente i farmaci somministrati	deve allertare l'infermiere affinché si accerti che il paziente ingerisca i farmaci	deve ordinare all'infermiere la pulizia della cavità orale	deve immobilizzare completamente il paziente
1276	Durante l'aiuto all'assunzione dei pasti di una persona disfagica, l'OSS deve prestare attenzione alla comparsa di:	tosse	tachicardia	rossore del ventre	spettro uditivo basso
1277	Durante l'assistenza ad un paziente che necessita della padella per evacuare come prima cosa bisogna:	riscaldare la padella lavandola con acqua calda, asciugarla esternamente e posizionarla ai piedi del letto o su di una sedia adiacente	togliere i guanti monouso e agire a mano nuda	sistemare il cuscino sotto il capo della persona	sistemare il cuscino sotto la parte lombare della persona
1278	Durante l'assistenza ad un paziente che necessita della padella per evacuare come ultima cosa bisogna:	provvedere all'eliminazione degli odori sgradevoli dalla stanza	sistemare il cuscino sotto il capo della persona	sistemare l'apposito poggiatesta sotto la zona lombare	evitare di indossare i guanti monouso
1279	Durante l'assistenza ad un paziente che necessita della padella per evacuare, bisogna:	assistere il paziente ad assumere una posizione laterale	trascurare l'igiene	lasciare il paziente totalmente da solo	non documentare l'assistenza fornita al paziente e ignorare i suoi segnali di disagio
1280	Durante l'assistenza ad un paziente che necessita della padella per evacuare, bisogna coprire il paziente con:	un lenzuolo	una coperta pesante, anche qualora possa ostacolare la sua respirazione	una serie di cuscini	nessuna delle altre risposte è corretta
1281	Durante l'assistenza ad un paziente che necessita della padella per evacuare, per i pazienti che non possono sollevare il bacino, bisogna:	piegare la biancheria da letto fino alle anche	piegare la biancheria da letto fino alle ginocchia	piegare la biancheria da letto fino alle spalle	evitare di piegare la biancheria
1282	Durante l'assistenza ad un paziente che necessita di padella o pappagallo per la minzione come ultima cosa bisogna:	togliere e gettare i guanti. Lavarsi le mani	identificare il paziente	misurare la respirazione e la pressione	soistemare il cuscino sotto la zona lombare
1283	Durante l'assistenza ad un paziente che necessita di padella o pappagallo per la minzione, dopo essersi lavati le mani ed aver osservato le procedure per il controllo delle infezioni bisogna:	provvedere alla riservatezza del paziente	ignorare la privacy del paziente	forzare il paziente	dimenticare di registrare l'assistenza
1284	Durante l'assistenza ad un paziente nell'uso del pappagallo, dopo aver tirato la tenda intorno al letto o chiuso la porta della stanza e aver indossato i guanti monouso bisogna:	posizionare il pappagallo tra le gambe del paziente	rimuovere la biancheria sporca, prima che sia usato il pappagallo dal paziente	sistemare i cuscini dietro il paziente	posizionare un campanello di chiamata
1285	Durante l'assistenza ad un paziente nell'uso del pappagallo come prima cosa bisogna:	tirare la tenda intorno al letto o chiudere la porta della stanza e indossare i guanti monouso	rimuovere il pappagallo	affidare la pulizia del pappagallo all'infermiere di turno	compilare la cartella clinica
1286	Durante l'assistenza ad un paziente nell'uso del pappagallo come ultima cosa bisogna:	sciogliere il pappagallo e riportare al letto il paziente	ordinare all'infermiere di disinfettare il pappagallo	compilare la cartella clinica	Nessuna delle altre risposte è corretta
1287	Durante l'assistenza al paziente per l'igiene orale come prima cosa bisogna:	preparare il materiale sul carrellino	registrare la frequenza della respirazione e le caratteristiche	compilare la cartella clinica	aspettare il segnale sonoro e procedere dopo due secondi
1288	Durante l'assistenza al paziente per l'igiene orale come ultima cosa bisogna:	rimuovere il materiale	registrare la temperatura	sistemare il poggiatesta	sistemare i cuscini
1289	Durante l'assistenza al paziente per l'igiene orale, bisogna umidificare lo spazzolino e applicare:	il dentifricio	il collutorio	l'alcool etilico	l'ibuprofene
1290	Durante l'assistenza al paziente portatore di gesso sintetico, come prima cosa bisogna:	lavarsi le mani secondo procedure per il controllo delle infezioni	spiegare la procedura	compilare la cartella clinica	ripristinare il microclima
1291	Durante l'attività di mobilizzazione, l'OSS deve:	coinvolgere il paziente cercando di stimolare le funzioni residue	procedere con la manovra di Golgi	effettuare la manovra di Nithingale, cercando di stimolare il linguaggio	nessuna delle altre risposte è corretta
1292	Durante l'attività di mobilizzazione, l'OSS deve:	coinvolgere il paziente cercando di stimolare l'autonomia residua	coinvolgere il paziente affinché si procuri degli strappi muscolari	procedere con manovre decise, anche qualora il paziente avverta dolori forti	nessuna delle altre risposte è corretta

1293	Durante una deambulazione con girello, l'operatore si deve posizionare:	di lato dalla parte più debole	di lato dalla parte più forte	in ginocchio	in posizione prona
1294	Gli accorgimenti di competenza dell'OSS, indispensabili per prevenire il rischio di cadute nell'anziano, sono:	predisporre un ambiente idoneo	trascurare la valutazione del rischio	trascurare il supporto per la mobilità	trascurare l'educazione e l'informazione
1295	Gli arti inferiori nella posizione seduta devono essere:	allineati	incrociati	forzati	sospesi in aria
1296	I disinfettanti vanno conservati:	in appositi locali areati, lontano dalla portata dei degenti, posti in piccole confezioni per esaurirli in tempi indicati	in luoghi fortemente contaminati	in prossimità di sostanze chimiche o materiali reattivi	in contenitori non sigillati ed esposti alla luce diretta del sole
1297	I dispositivi medici utilizzati, prima di essere sterilizzati, vengono sottoposti:	alla raccolta, decontaminazione, lavaggio, asciugatura, controllo, manutenzione, invio, eventuale accettazione e selezione	all'eventuale accettazione, selezione, decontaminazione, raccolta, asciugatura, lavaggio, controllo, manutenzione e invio	all'asciugatura, controllo, manutenzione, raccolta, decontaminazione, lavaggio, eventuale accettazione e selezione	alla selezione, asciugatura, controllo, manutenzione, invio, raccolta, decontaminazione, lavaggio e selezione
1298	I guanti devono essere indossati:	in tutte le attività che possono essere a rischio di imbrattamento con materiale biologico	a fine turno di lavoro	solo durante il ricambio della biancheria del letto	solo durante la disinfezione della strumentazione medica
1299	Il bagno a letto, in vasca o in doccia rientra nelle cure igieniche totali?	Sì, il bagno a letto, in vasca o in doccia rientra nelle cure igieniche totali	No, solo la pulizia delle unghie fa parte delle cure igieniche totali	No, il bagno a letto, in vasca o in doccia rientra tra le cure igieniche alternative	No, solo la cura dei capelli e delle unghie fa parte delle cure igieniche totali
1300	Il cambio della biancheria nel letto di un malato va effettuato:	almeno una volta alla settimana, eccetto che per i pazienti operati e costretti a letto, per i quali è invece necessario il cambio giornaliero della traversa	necessariamente ogni giorno	ogni giorno, eccetto per i pazienti operati e costretti a letto, per i quali è invece necessario il cambio una volta alla settimana	ogni due settimane
1301	Il laccio emostatico va sempre applicato:	a monte di un flusso emorragico per contenere o arrestare la perdita del sangue	deve essere avvolto troppo stretto intorno all'arto	deve essere applicato per un periodo di tempo abbastanza prolungato	deve essere applicato direttamente sulle ferite o sulle abrasioni
1302	Il lavaggio antisettico delle mani deve durare:	dai quaranta ai sessanta secondi	dalle due alle tre ore	dai quindici ai venti minuti	almeno trenta minuti
1303	Il neonato in culla deve essere posizionato:	Pancia in su	Pancia in giù	Sul fianco destro	Sul fianco sinistro
1304	Il processo di sterilizzazione deve essere:	Convalidato	Rettificato	Deabilitato	Complicato
1305	Il rifacimento del letto deve essere eseguito:	quotidianamente e secondo i bisogni della persona	solo quando la persona lo richiede	solo quando l'operatore lo ritiene necessario	dall'infermiere
1306	Il taglio delle unghie deve avvenire senza:	arrotondare gli angoli	con lime particolari	usare creme	nessuna delle altre risposte è corretta
1307	Il trasferimento letto-barella e barella-letto nella modalità a due operatori viene effettuato in:	due tempi	sempre in cinque tempi	senza mai avvisare prima il paziente, contando sull'effetto a sorpresa	sempre a mani nude e senza dispositivi di protezione, ordinando ad un infermiere di procedere
1308	Il trasporto dei campioni biologici viene effettuato:	mediante l'utilizzo di contenitori di trasporto ermetici e infrangibili	esponendo i campioni al calore eccessivo o al freddo estremo	lasciando i campioni esposti all'aria aperta	trattando i campioni in modo negligente
1309	In caso di assistenza a una persona che vomita, l'OSS deve:	rilevare quantità e aspetto del vomito e riferire all'infermiere	somministrare farmaci ad alto contenuto di ibuprofene	far assumere al paziente la posizione prona	evitare di rilevare quantità e aspetto del vomito, poiché è un compito dell'infermiere
1310	In caso di assistenza alla persona che vomita, l'OSS deve:	collaborare con l'infermiere durante la rilevazione delle caratteristiche del vomito	deve evitare la collaborazione con l'infermiere e non avvisarlo	deve procedere con la manovra di Hichlem	deve somministrare forti dosi di ibuprofene
1311	In caso di atteggiamenti aggressivi di un paziente anziano, bisogna intervenire:	tenendo un atteggiamento calmo e non nervoso, senza bloccare fisicamente la persona	rispondere con aggressività	ignorare i segnali di disagio del paziente	costringere il paziente a calmarsi
1312	In caso di colpo di calore bisogna far scendere in modo repentino la temperatura corporea dell'infortunato?	Falso, è da evitare assolutamente	Vero, aiuta a far defluire il sangue	Vero, aiuta ad assimilare meglio i principi attivi dei farmaci	Nessuna delle altre risposte è corretta
1313	In caso di congelamento è opportuno:	coprire bene l'infortunato e trasportarlo in un locale non eccessivamente riscaldato	riscaldare rapidamente il paziente	strofinare la pelle del paziente con forza	ignorare i segni di ipotermia
1314	In caso di congiuntivite a un occhio, l'OSS per poter eseguire l'igiene degli occhi:	deve utilizzare materiale sterile e guanti monouso sterili per ogni occhio	utilizzare lo stesso batuffolo di cotone per entrambi gli occhi	non indossare guanti monouso sterili ed evitare di lavare le mani	ignorare i segni di peggioramento
1315	In caso di dieta a basso residuo di scorie si deve:	evitare verdura, legumi, patate, frutta fresca	incrementare la somministrazione di verdure, ma evitare la frutta fresca	incrementare la somministrazione di patate, cioccolato, evitando verdura	incrementare la somministrazione di frutta fresca, evitando patate
1316	In caso di emergenza con ritrovamento di una persona a terra, la prima cosa da fare è:	Valutare se l'ambiente è sicuro	Controllare la sua temperatura corporea	Iniziare la manovra di Claush	Somministrare morfina
1317	In caso di emiplegia, qual è la tecnica da adottare nella vestizione della persona?	Sfilare prima la manica dell'arto sano e poi quello impedito	Forzare o tirare bruscamente il lato paralizzato	Manipolare in modo brusco o forzato il lato affetto dalla paralisi	Evitare di indossare i guanti monouso sterili
1318	In caso di folgorazione, la prima cosa da fare è:	allontanare l'infortunato dalla corrente con l'ausilio di materiale isolante	dare immediatamente da bare all'infortunato e ricoprirlo con un panno di cotone	nessuna delle altre risposte è corretta	ricoprire l'infortunato con una lozione di aloe
1319	In caso di incidente/infortunio, cosa si intende con il porre l'infortunato in posizione laterale di sicurezza?	Stenderlo su un fianco con la testa leggermente rialzata	Posizionarla pancia in giù	Stenderlo su un fianco con la testa totalmente abbassata e il viso rivolto in giù	Pancia in giù e gambe alzate
1320	In caso di infortunato cosciente con ferita penetrante al torace, che cosa NON si deve fare?	Rimuovere eventuali corpi estranei, tamponando con una garza	Telefonare il 118	Posizionare l'infortunato in posizione semiseduta	Coprire eventuali ferite usando garze sterili
1321	La pulizia del cavo orale nella persona portatrice di protesi dentaria mobile deve essere effettuata:	dopo aver rimosso la protesi	senza rimuovere la protesi	a intervalli di ventiquattro ore	a intervalli di due minuti
1322	L'OSS durante l'assistenza al paziente che vomita, dopo essersi procurati rapidamente una bacinella e i teli per proteggere il letto e l'assistito deve:	posizionare su un fianco il paziente se non può stare seduto	cambiare le lenzuola del letto, anche se pulite	somministrare immediatamente un farmaco, senza avvisare l'infermiere	procedere con la manovra di Clumbing

1323	La doccia o il bagno preoperatori devono essere eseguiti:	il mattino stesso prima dell'intervento	la sera prima dell'intervento	il mattino prima dell'intervento	dipende dalle preferenze dell'assistito, ma non è possibile procedere il mattino stesso prima dell'intervento
1324	Iniziata la somministrazione di un pasto, il paziente inizia a tossire e ad avere una voce modificata. Cosa deve fare l'OSS in questa situazione?	Sospendere l'alimentazione del paziente e avvisare l'infermiere	Far assumere al paziente una posizione più comoda, attendere qualche minuto e continuare ad alimentarla, anche con la forza	Continuare ad alimentare il paziente senza avvisare all'infermiere	Somministrare un farmaco indicato per i dolori addominali, anche senza consultare gli infermieri
1325	L'OSS durante l'assistenza al paziente che vomita, come ultima cosa deve fare:	pulire a terra se necessario o avvisare chi di competenza	togliersi i guanti monouso e prestare assistenza a mano nuda	avvertire l'infermiere affinché possa pulire la camera	somministrare al paziente un forte antidolorifico, senza avvertire l'infermiere
1326	La composizione della salma e trasporto deve essere effettuata:	entro le prime 2-3 ore dalla morte	dopo le ventiquattro ore dalla morte	dopo dodici ore dalla morte	nessuna delle altre risposte è corretta
1327	L'igiene del cavo orale deve essere effettuata:	Sempre dopo i pasti principali	Senza rimuovere l'eventuale protesi dentaria	Solo in caso di pazienti incoscienti	Solo dall'infermiere
1328	In un utente che assume anticoagulanti orali, la rasatura della barba è meglio che avvenga:	Con rasoio elettrico	Con rasoio a lamette affilate	Ammorbidendo meglio la pelle, con lametta	Non si deve mai eseguire
1329	La pulizia dell'unità di degenza dell'assistito deve essere svolta:	almeno quotidianamente	solo quando lo richiede il paziente	solo dall'infermiere	solo dai medici
1330	La padella deve essere disinfettata:	dopo ogni utilizzo	solo su ordine dell'infermiere, anche se usata	solo in caso di diarrea	solo in caso di feci infette
1331	La sacca di raccolta delle urine deve essere mantenuta:	al di sotto del livello della vescica	agganciata al bastone di posizione	pulita con nitroglicerina	completamente piena del liquido anti-odori
1332	Lo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo pungente e tagliente:	deve avvenire utilizzando un contenitore di plastica rigido chiudibile ermeticamente	può avvenire senza troppe accortezze	deve avvenire utilizzando contenitori di amianto	deve avvenire in contenitori con gas idrorepellente
1333	In che modo deve essere eseguita la disinfezione di piccole ferite, abrasioni od escoriazioni?	Partendo dalla zona centrale della ferita e proseguendo circolarmente verso l'esterno	Partendo dalla zona centrale della ferita, con soluzione a ph acido	Tamponando la ferita con pomate al cortisone abrasivo	Eseguendo la disinfezione solo nell'area circostante la ferita
1334	L'Operatore Socio-Sanitario nell'approccio alla persona assistita deve avere:	Un atteggiamento empatico	Un atteggiamento distaccato	Un atteggiamento eccessivamente affettuoso	Nessuna delle altre risposte è corretta
1335	La tricotomia in preparazione di un intervento chirurgico deve essere eseguita di norma:	A ridosso dell'intervento	Con rasoi a lamette affilate e con certificazione IQUO	A domicilio	All'accesso in reparto
1336	Iniziata la somministrazione di un pasto il paziente inizia a tossire e ad avere una voce modificata, che cosa deve fare l'OSS?	Deve sospendere l'alimentazione del paziente ed avvisare l'IP	Deve forzare l'alimentazione, anche contro la volontà del paziente	Deve ordinare all'infermiere di provvedere all'alimentazione del paziente	Deve convocare il primario del reparto per discutere come comportarsi
1337	Indicare la corretta sequenza che l'OSS deve eseguire per aiutare un soggetto affetto da emiplegia a scendere le scale avvalendosi di un ausilio?	Ausilio - gamba plegica - gamba sana	Gamba sana - ausilio - gamba plegica	Nessuna delle altre risposte è corretta	Ausilio - gamba sana - gamba plegica
1338	La manovra GAS (guardare, ascoltare, sentire) finalizzata alla valutazione della presenza di attività respiratoria deve:	protrarsi per 10 secondi	protrarsi per 2 ore	protrarsi per 15 minuti	protrarsi per 20 minuti
1339	In un regime dietetico, in cui prevista una dieta a basso residuo di scorie, si deve evitare:	verdure, patate, legumi e frutta fresca	latte, incrementando la frutta fresca	la carne, incrementando i legumi	la pasta, incrementando patate e legumi
1340	La pulizia del cavo orale in una persona che porta una protesi dentaria, deve essere effettuata:	dopo la rimozione della protesi	senza rimuovere la protesi	con farmaci appositi	con strumenti in amianto sanitario
1341	La sagoma rimovibile della protesi auricolare deve essere pulita con una salvietta asciutta:	quotidianamente	due volte alla settimana	una volta alla settimana	due volte alla settimana, una volta al giorno
1342	In merito all'isolamento dell'assistito come prima cosa si deve:	allestire il carrello pulito con i DPI, la soluzione alcolica e il materiale occorrente per l'igiene	trasferirlo in un reparto che abbia massimo tre pazienti	nessuna delle altre risposte è corretta	rispristinare il materiale al termine dell'isolamento
1343	In merito all'isolamento dell'assistito come ultima cosa si deve:	rispristinare il materiale al termine dell'isolamento	far posizionare dall'infermiere il contenitore per taglienti dentro alla stanza	accertarsi di aver tolto i DPI anche fuori dalla stanza	nessuna delle altre risposte è corretta
1344	In caso di svenimento, la cosa migliore da fare è:	sdraiarsi e alzare le gambe per facilitare l'afflusso sanguigno al cervello	non sdraiarsi	non alzare le gambe per facilitare l'afflusso sanguigno al cervello	disporsi in posizione supina
1345	In caso di traumi vertebrali per spostare il paziente si deve:	fare la manovra in 3-4 soccorritori, mantenendo la colonna in posizione orizzontale	evitare di mantenere la colonna in posizione orizzontale	usare le fasce elastiche	eseguire la manovra di Nothingsh
1346	In caso di un paziente incapace di tagliare il cibo e di portarlo alla bocca, è necessario:	preparare in piccoli pezzi il cibo, aiutarne l'assunzione, imboccando il paziente, lasciandogli il tempo per deglutire e porgendogli acqua con bicchiere o cannuccia a seconda dei casi	evitare di preparare in piccoli pezzi il cibo e trascurare la sicurezza alimentare durante l'assistenza	ignorare le esigenze dietetiche	non rispettare i tempi di deglutizione del paziente e forzarlo a mantenere i nostri ritmi
1347	In che tipo di avvelenamento è consigliabile provocare il rigetto della sostanza ingerita?	In quello da ingerimento di cibi scaduti	In quello da ingerimento di acidi forti, presenti in detersivi, prodotti per la pulizia e batterie (acido cloridrico, acido solforico o acido nitrico)	In quello da ingerimento di alcali forti spesso presenti in detersivi, saponi e prodotti per lo sblocco di tubature (idrossido di sodio -soda caustica - o idrossido di potassio)	Nessuna delle altre risposte è corretta
1348	In merito al bagno a letto di un paziente bisogna preparare una manopola da bagno con:	l'asciugamano piccolo	il gel idrorepellente	un angolo di quarantacinque gradi	nessuna delle altre risposte è corretta
1349	In merito al bagno a letto di un paziente come prima cosa bisogna:	lavarsi le mani ed osservare le procedure per il controllo delle infezioni	ripristinare il microclima	rimuovere i guanti monouso, per poter procedere con le operazioni a mani nude	rifare il letto del paziente, anche senza cambiare la biancheria

1350	In merito al bagno a letto di un paziente come ultima cosa bisogna:	aiutare il paziente e l'ambiente circostante	preparare la persona e posizionarla supina	lavare con cura l'area anale	ripristinare il microclima
1351	In merito al posizionamento corretto nel letto in decubito dorsale bisogna collocare un supporto in fondo al letto per mantenere i piedi:	il più possibile ad angolo retto	il più possibile paralleli	il più possibile raffreddati	nessuna delle altre risposte è corretta
1352	In merito al posizionamento corretto nel letto in decubito dorsale bisogna per prima cosa:	posizionare un cuscino sotto la testa dell'assistito	lavare con cura l'area anale	rifare il letto	se la respirazione è lenta e difficile, osservare lo sterno
1353	In merito al posizionamento corretto nel letto in decubito dorsale per ultima cosa bisogna:	rispettare sempre l'allineamento corretto del corpo	rimuovere i guanti monouso, per poter procedere a mani nude	ripristinare il microclima, con ventole raffreddanti	rifare il letto senza cambiare la biancheria
1354	In merito al posizionamento corretto nel letto in decubito dorsale, bisogna posizionare un archetto perché:	il peso delle coperte può causare lesioni da pressione e/o il piede equino	i piedi devono stare sempre raffreddati	è più facile provvedere al taglio delle unghie	nessuna delle altre risposte è corretta
1355	In merito al posizionamento corretto nel letto in decubito laterale destro e sinistro bisogna collocare un cuscino sotto il ginocchio per:	mantenere l'anca in asse ed evitare pressioni	aumentare pressioni	disallineare il corpo e consentire la pulizia	nessuna delle altre risposte è corretta
1356	In merito al posizionamento corretto nel letto in decubito laterale destro e sinistro come prima cosa bisogna:	posizionare un cuscino sotto la testa dell'assistito	aiutare il paziente a posizionare lo strumento sul sito scelto	flettere le ginocchia e le anche mentre lo si aiuta a sistemarsi sulla sedia	preparare l'ambiente con le ventole raffreddanti
1357	In merito al posizionamento corretto nel letto in decubito laterale destro e sinistro come ultima cosa bisogna:	posizionare un cuscino dietro la schiena	preparare il materiale sul carrello servitore	piegare le coperte ad angolo o piegarle a fisarmonica sul fondo del letto	garantire la privacy
1358	In merito al primo soccorso come ultima cosa bisogna:	preservare la vittima da ulteriori danni	somministrare farmaci per la pressione	indossare i guanti monouso	ordinare all'infermiere di riscaldare il paziente
1359	In merito alla conservazione e all'uso del materiale sterile, quale di queste opzioni corrisponde al secondo passaggio da effettuare per la conservazione dei materiali?	Mantenere la sterilità, conservare il materiale in armadi chiusi, puliti e asciutti, al riparo dalla luce, polvere e calore, a 30 cm dal pavimento	Toccare il materiale sterile con le mani nude	Lasciare il materiale sterile non coperto o esposto all'ambiente	Raccogliere il materiale sterile con strumenti non sterili
1360	In merito alla conservazione a all'uso del materiale sterile, quale di queste opzioni corrisponde all'ultimo passaggio da effettuare per la conservazione dei materiali?	Controllare periodicamente il materiale sterile per valutare lo stato di conservazione e la scadenza	Raccogliere il materiale sterile con strumenti non sterili	Riposizionare il materiale sterile una volta aperto, a contatto con superfici non sterili, per prevenire la contaminazione	Toccare il materiale sterile con le mani nude
1361	(OSS) In merito all'assistenza per l'assunzione dei farmaci il primo passaggio consiste nel:	lavarsi le mani	prescrivere altri farmaci	modificare le dosi, nel caso di intolleranza	ripristinare il microclima
1362	In merito all'assistenza per l'assunzione dei farmaci l'ultimo passaggio consiste:	nell'aiutare il paziente all'assunzione del farmaco e fargli assumere una posizione consona all'azione da svolgere, prestando particolare attenzione ai soggetti con disfagia (alterazione della deglutizione)	nel somministrare farmaci senza una corretta registrazione e documentazione	nel somministrare farmaci senza confermare l'identità del paziente	nell'alterare le dosi prescritte, durante la successiva assistenza
1363	In presenza di un paziente che nel maneggiare una pentola si è ustionato una mano, come si comporta l'OSS?	Per alleviare il dolore applica acqua fredda	Utilizzare ghiaccio direttamente sulla zona ustionata, per almeno dodici minuti	Rompere le bolle che si formano sull'ustione	Rimuovere vestiti attaccati alla pelle
1364	In un paziente epatopatico, gli alimenti da abolire sono:	le bevande alcoliche	i succhi di frutta	tutti gli ortaggi	gli agrumi
1365	In un paziente semiosciente che sta vomitando, l'OSS deve:	posizionare la testa di lato	cercare di risolvarlo	somministrare dei farmaci appositi	ordinare all'infermiere di occuparsi del paziente
1366	In una persona non autosufficiente, l'igiene del cavo orale, va praticata:	tre volte al giorno	due volte alla settimana	una volta al giorno	tre volte alla settimana
1367	Indicare la corretta sequenza delle procedure preliminari alla sterilizzazione.	Disinfezione - detersione - risciacquo - asciugatura - confezionamento	Confezionamento - disinfezione - detersione - risciacquo - asciugatura	Asciugatura - disinfezione - detersione - risciacquo - confezionamento	Risciacquo - confezionamento - disinfezione - detersione - asciugatura
1368	Indicare quale procedura NON è corretta, durante il confezionamento degli oggetti da sterilizzare?	Scrivere direttamente sulla carta delle buste con penna, timbri o pennarelli	Verificare la pulizia, l'asciugatura, l'integrità e il funzionamento dei dispositivi medici prima di eseguire il confezionamento	Scegliere l'adeguato confezionamento	Eseguire una adeguata saldatura delle confezioni
1369	Indicare tra le modalità seguenti quella che NON è corretta per la conservazione dei disinfettanti.	Conservarli in luoghi caldi e asciutti	Indossare i dispositivi di protezione individuale	Tenere i prodotti nelle loro confezioni originali	Il locale adibito alla conservazione di tali prodotti deve essere accessibile all'utenza, ben areato, con temperatura bassa, con armadi non utilizzati per altri materiali
1370	La mobilizzazione di una persona a rischio di sviluppare ulcere da pressione è indicata almeno ogni:	2 ore	10 ore	12 ore	24 ore
1371	La polvere va asportata con il "metodo a umido", utilizzando la scopa a trapezio e la garza monouso. La scopa non va:	sollevata, ma strisciata con dei movimenti ad "S" dall'interno verso l'esterno della stanza	utilizzare una scopa sporca o bagnata	trascurare l'igiene dell'attrezzatura dopo l'uso	nel caso si riscontri acqua stagnante sul pavimento, dopo l'uso della scopa, evitare di asciugarla
1372	La posizione corretta da far assumere a un paziente incosciente che vomita è la:	posizione laterale di sicurezza	posizione supina	posizione sdraiata a pancia in su, con la faccia rivolta verso l'alto	a busto alto con l'addome fasciato e compresso
1373	La posizione di Trendelenburg consiste nel posizionare:	la testa più in basso delle gambe	la testa rivolta verso l'alto	le spalle in posizione obliqua	le gambe sollevate in aria

1374	La posizione Trendelenburg o posizione anti-shock, prevede:	di far assumere al paziente una posizione supina, su un piano inclinato, con la testa più in basso delle ginocchia e del bacino	di permettere al paziente di effettuare movimenti bruschi	di permettere al paziente di effettuare sforzi eccessivi durante la respirazione	nessuna delle altre risposte è corretta
1375	La pulizia dell'ambiente in cui è ospitato l'assistito avviene:	prima della disinfezione	dopo della disinfezione	una volta al mese	solo dopo la sua dimissione
1376	La somministrazione di farmaci per via sottocutanea prevede come prima cosa di:	verificare l'identità del paziente	utilizzare delle siringhe speciali, in vetro ossigenato	evitare di indossare i guanti monouso	non smaltire i taglienti nell'apposito contenitore, prima delle 24 ore, affinché siano utili nel caso di eventuali controlli post iniezione
1377	La sudorazione eccessiva va controllata soprattutto:	in neonati e anziani	e soltanto durante gli interventi chirurgici	e soltanto durante gli esami fisici	e soltanto durante le visite mediche
1378	La temperatura ottimale della stanza del degente è di:	22 gradi - 25 gradi in estate e 17 gradi - 20 gradi in inverno	22 gradi - 25 gradi in inverno e 17 gradi - 20 gradi in estate	30 gradi - 35 gradi in estate e 17 gradi - 20 gradi in inverno	22 gradi - 25 gradi in estate e 30 gradi - 35 gradi in inverno
1379	L'agopuntura può essere eseguita:	solo da un medico	solo da un OSS	sia da un medico sia da un OSS	nessuna delle altre risposte è corretta
1380	Le ferite infette, come vanno pulite?	Con movimenti circolari, dal margine esterno verso l'interno	Con l'uso di antisettici aggressivi	Usando acqua torbida	Rimuovendo i tessuti necrotici in modo aggressivo
1381	Le padelle utilizzate dai pazienti devono essere sottoposte:	a pulizia e disinfezione	a pulizia, ma non a disinfezione	a pulizia, senza l'uso dei guanti monouso	nessuna delle altre risposte è corretta
1382	L'eliminazione intestinale può essere influenzata dalla posizione?	Sì	No, è influenzata solo dalla fermentazione intestinale	No, è influenzata solo del sistema nervoso enterico	No, è influenzata solo dall'assorbimento dei nutrienti
1383	L'impacco caldo umido ha come obiettivo quello di:	aumentare il flusso ematico	diminuire il flusso ematico	favorire la digestione di cibi ricchi di fibre	favorire l'assunzione di alcuni tipi di farmaci
1384	L'OSS è tenuto a comunicare le informazioni sulla patologia che affligge l'assistito?	No, mai	Sì, senza aver troppa cura della privacy, poiché si tratta di informazioni sanitarie	Sì, solo nel caso in cui non ci siano i familiari	Sì, nel caso di persone incapaci di intendere e di volere
1385	L'OSS è tenuto ad indossare i guanti, nella misurazione della temperatura, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria?	Non è tenuto a indossare i guanti	Sì, obbligatoriamente	Sì e deve cospargere l'intera superficie delle mani con la pomata antigermi	Non è tenuto ad indossare i guanti nella misurazione della frequenza cardiaca, ma deve indossare i guanti nella misurazione della temperatura e della frequenza respiratoria
1386	L'OSS addetto al trasporto del materiale biologico esegue questo compito:	nel rispetto di disposizioni specifiche, nel più breve tempo possibile	senza indossare i guanti monouso	concordando con l'infermiere il tempo necessario per effettuare tutte le operazioni	nessuna delle altre risposte è corretta
1387	Quali di queste azioni l'OSS non deve compiere nell'assistere un bambino disfagico?	Evitare, se il paziente necessita di essere imboccato, di continuare nella manovra, se si verificano problemi o difficoltà, come tosse, cianosi, o altri segni di soffocamento	Accogliere il paziente e fare in modo che la sua postazione sia in ordine e completa di tutto.	Posizionare il paziente a letto o accompagnarlo al tavolo se necessario	La dispensazione e la somministrazione dei pasti
1388	Quali dispositivi di protezione gli Operatori sanitari devono indossare prima di procedere al lavaggio manuale del materiale sanitario?	Sopracamice protettivo, mascherina con visiera, guanti di gomma.	Guanti in pelle, mascherina senza visiera	Non devono indossare nessun tipo di dispositivo di protezione	Esclusivamente il sopracamice protettivo
1389	Quali fra le seguenti attività non sono di competenza dell'OSS?	Somministrazione di ossigeno su prescrizione medica	Supporta e assiste la persona nelle attività quotidiane e di igiene personale dell'assistito	Nella mobilità e nell'assunzione dei cibi dell'assistito	Si adopera per mantenere le capacità motorie dell'assistito
1390	Quali interventi assistenziali sono di competenza dell'OSS, in caso di temperatura corporea elevata nel bambino?	Interventi che favoriscono la perdita di calore corporeo	Somministrare bevande gassate	Non può svolgere nessun tipo di intervento assistenziale	Applicare la borsa termica laddove passano i grossi vasi
1391	Quali interventi assistenziali sono di competenza dell'OSS, in caso di temperatura corporea elevata.	Interventi che favoriscono la perdita di calore corporeo	Somministrare bevande alcoliche	Effettuare spugnature con acqua ossigenata	Non può svolgere nessun tipo di intervento assistenziale
1392	Quali materassi sono più adatti per prevenire le piaghe da decubito?	Materassi ad aria	Un materasso espanso a cellule chiuse	Materassi mantenuti rigidi da un telaio a molle	Un materasso ad acqua
1393	Quali materassi sono più comunemente usati nei reparti di ortopedia e traumatologia?	Materassi mantenuti rigidi da un telaio a molle	Materasso gonfiabile	Materasso in schiuma	E' consigliabile cambiare tipo di materasso ogni mese
1394	Quali scopi può avere l'impiego del clistere evacuativo?	Per la pulizia del colon, per stimolare l'evacuazione e terapeutico	Effetto analgesico e idratante	Effettua la diagnosi per eventuali disturbi al fegato	Per la la stimolazione ma non per la pulizia del colon
1395	Quali sono gli obiettivi che l'OSS deve tener conto nell'assistenza al bambino che vomita?	Assicurare l'igiene e il comfort del paziente	Assicurarsi che il bambino sia sdraiato con le gambe sollevate	Effettuare un clistere evacuativo per la pulizia del colon	Non è di sua competenza l'assistenza al bambino che vomita
1396	Quali sono gli obiettivi della sanificazione?	Ridurre la carica microbica presente su superfici ed oggetti	Ed eliminare esclusivamente la polvere ma non a ridurre la carica microbica	A rimuovere lo sporco "visibile" di qualsiasi natura, ma non a debellare i batteri e gli agenti patogeni	Aumentare la carica microbica presente su superfici ed oggetti
1397	Quali sono i parametri che maggiormente influenzano la sterilizzazione a vapore?	La pressione del vapore, la temperatura e il tempo di esposizione	Temperatura d'esercizio, vuoto vapore	La sterilizzazione a vapore non viene più applicata	Temperatura d'esercizio e galleggiamento
1398	Quali sono le azioni necessarie per il trasporto di un assistito in barella?	Alzare le spondine, tenerlo coperto, controllare le sue reazioni	Adagiare delicatamente la persona sulla barella, ma in nessun caso posizionare un cuscino al di sotto della testa.	Deve solamente mettere il paziente in sicurezza con le apposite cinture	Non è di competenza dell'OSS il trasporto di un assistito in barella
1399	Quali sono le caratteristiche del bastone per la deambulazione?	Altezza sopra la linea del polso, impugnatura comoda, gomma antiscivolo	Altezza fino al ginocchio	Altezza sopra la linea del polso, gomma antiscivolo, impugnatura scomoda	Impugnatura comoda, gomma antiscivolo e altezza sotto la linea del polso

1400	Quali sono le condizioni da rispettare e le operazioni da compiere, per raccogliere un campione di urine per un esame colturale?	La pulizia dei genitali, lavaggio delle lavate, un contenitore sterile, urine del mitto intermedio	La pulizia dei genitali, lavaggio delle lavate, un contenitore sterile, urine del primo getto	La pulizia dei genitali deve avvenire esclusivamente tramite salviettina intima, contenitore sterile, urine del primo getto e riempire completamente il contenitore delle urine	La raccolta delle urine deve avvenire precedentemente alla pulizia dei genitali, raccolte in un qualsiasi contenitore di plastica o vetro.
1401	Quali sono le funzioni dell'OSS nei confronti della persona assistita?	Osservare e ascoltare la persona e riferire all'infermiere quanto rilevato	Prescrivere farmaci	Somministrare ossigeno	Tracciare un eventuale terapia del dolore
1402	Quali sono le principali attività dell'OSS nella gestione delle piaghe da decubito:	igiene personale mattutina del malato, mobilitazione, alimentazione, massima attenzione all'eventuale incontinenza del paziente	Prescrizione di antidolorifici	Spugnature di acqua ossigenata	La gestione delle piaghe da decubito non rientra nell'attività dell' OSS
1403	Quali sono le zone a rischio per lesioni da pressione quando il malato assume il decubito laterale?	Orecchio, parte laterale della spalla, coste, trocantere, malleolo	Bocca,collo,parte laterale della spalla	Orecchio, gomito, polso	Parte laterale della spalla,ginocchio, caviglia
1404	Quali sono, tra quelli indicati di seguito, gli elementi che assieme caratterizzano una corretta deambulazione?	La posizione del bacino, del tronco, dell'arto sospeso e dell'arto di appoggio	La posizione del bacino,dell'arto sospeso e del tronco	La posizione del tronco e del bacino	La posizione dell'arto di appoggio e del bacino
1405	Quali tra le seguenti caratteristiche deve avere una poltrona di una camera di degenza?	Essere realizzata in materiale impermeabile e lavabile	Realizzata esclusivamente in cotone bianco	Di plastica dotata di cuscini in lattice	Non deve essere dotata di rotelle
1406	Quali tra queste è la posizione più idonea per un paziente che presenta difficoltà respiratoria?	Posizione semiseduta	Posizione supina	Posizione di Trendeleburg	Posizione genu-pettorale
1407	Quali tra questi, sono gli accessori del letto di degenza?	staffa o trapezio	Staffa curva di legno	Staffa o triangolo	Staffa Buugeng
1408	Quali, tra le seguenti alternative, sono sedi più comuni di rilevazione della temperatura corporea esterna?	Ascellare, inguinale	Ascellare, cavo popliteo	Inguinale,fossa anticubitale, ascellare	Cavo popliteo, inguinale
1409	Qualora l'infermiere assegni all'O.S.S. di effettuare un'iniezione sottocutanea, quest'ultimo dovrà:	rifiutare la prescrizione	Accettare la prescrizione	Chiedere il consenso ad un parente dell' assistito	L'OSS può effettuare un'iniezione sottocutanea, senza l'assegnazione da parte dell' infermiere
1410	Qualsiasi cambiamento osservato nell'anziano durante il turno di lavoro deve essere:	riferito all'Infermiere	riferito al medico	riferito al caposala	riferito all'infermiere solo nel caso l'anziano manigesta azioni violente
1411	Quando deve essere effettuato il lavaggio antisettico delle mani?	Prima dell'esecuzione di procedure su cute o mucose non integre, anche se si indossano i guanti	Prima di eseguire manovre invasive nel torrente circolatorio	All'inizio e alla fine del turno di servizio	Dopo l'uso dei servizi igienici
1412	Quando il paziente è incapace di tagliare il cibo e di portarlo alla bocca, è necessario:	preparare in piccoli pezzi il cibo, aiutarne l'assunzione, imboccando il paziente, lasciandogli il tempo per deglutire e porgendogli acqua con bicchiere o cannuccia a seconda dei casi	Alimentarlo esclusivamente con cibi liquidi	Preparare in piccoli pezzi il cibo,tornare dopo 20 minuti per vedere se ha finito	Preparare in piccoli pezzi il cibo,tornare dopo 30 minuti per vedere se ha finito
1413	Quando l'OSS aiuta un bambino a deambulare, quali dei seguenti comportamenti deve osservare?	Fare indossare all'assistito delle scarpe allacciate, sostenerlo da sotto l'ascella, farlo guardare in avanti	Far indossare delle pantofole,sostenerlo da sotto i gomiti, aiutarlo a far scivolare piano i piedi	Sostenerlo da sotto l'ascella,fargli guardare la posizione dei piedi aiutandolo a far scivolare lentamente i piedi	Non è di competenza dell'Oss aiutare un bambino a deambulare
1414	Quando l'Oss controlla la presenza degli accessori del letto, che cosa deve verificare?	Che nella stanza ci siano le spondine, gli archetti e la staffa	Che nella stanza ci siano comodini,campanelli e archetti	Che nella stanza ci siano sedia, schienale e campanello	Che nelle stanza ci siano sedia, comodini e la staffa
1415	Quando l'OSS lascia il paziente in posizione supina, sa che potrebbero svilupparsi lesioni da pressione nelle seguenti zone:	nuca, sacro, scapole, talloni	Orecchio,sacro, ginocchio	Cavo popliteo,scapole e talloni	Orecchio,nuca e gomito
1416	Quando NON è utile praticare la respirazione artificiale?	Avvelenamento	Incidenti stradali	Annegamento	Arresto cardiaco
1417	Quando non si usa il caldo?	Emorragia acuta, tumori maligni, subito dopo un trauma	Mal di schiena	Dolore alla cervicale	Contratture ed affaticamento muscolare
1418	Quando per un paziente è prevista una dieta a basso residuo di scorie si deve/devono evitare:	Contorni a base di verdure	Uova	Olio extra vergine di oliva	Carne bianca o rossa magra
1419	Quando si aiuta una persona a deambulare bisogna:	far indossare scarpe allacciate, sostenere da sotto l'ascella e far guardare in avanti	Far camminare il paziente scalzo e sostenerlo dal collo	Non è di competenza dell'OSS far deambulare un paziente	Far indossare delle pantofole,sostenerlo da sotto i gomiti, aiutarlo a far scivolare piano i piedi
1420	Quando si aiuta una persona a deambulare, cosa si deve fare:	fare indossare scarpe allacciate, sostenere da sotto l'ascella, far guardare in avanti	Non è di competenza dell'OSS far deambulare un paziente	Sostenerlo da sotto l'ascella,fargli guardare la posizione dei piedi aiutandolo a far scivolare lentamente i piedi	Far camminare il paziente scalzo e sostenerlo dal collo
1421	Quando si assiste un paziente in fin di vita è necessario:	usare contatto fisico e ascolto attivo	Somministrare morfina	Lavarlo spesso con amuchina	Usare contatto fisico ma non ascolto attivo
1422	Quando si assiste un paziente morente è necessario:	usare contatto fisico e ascolto attivo	Effettuare ogni 3 ore un'iniezione sottocutanea	Prescrivere una terapia del dolore	Somministrare morfina
1423	Quando si deve mobilizzare un anziano con catetere vescicale, il sacchetto di drenaggio delle urine non provvisto di valvola antireflusso deve essere posizionato:	sotto il livello della vescica	Sopra il livello della vescica	Non è previsto un sacchetto di drenaggio	Il sacchetto di drenaggio deve essere obbligatoriamente provvisto di valvola
1424	Quando si effettua una presa per spostare il residente, le mani vanno posizionate:	a livello di scapole e bacino	Sotto il gomito	intorno al collo	Sopra la testa
1425	Quando si esegue la pulizia dell'unità di degenza dell'assistito?	almeno quotidianamente	Una volta al mese	ogni quindici giorni	Una volta a settimana

1426	Quando si fa assumere ad un paziente allettato la posizione di Fowler, le zone del corpo maggiormente esposte al rischio di lesioni da frizione sono:	i glutei e la regione scapolare e quella sacrale	Teca cranica e condili	Esclusivamente la regione costale	Esclusivamente la zona sacrale
1427	Quando si fa assumere ad un paziente allettato la posizione di Fowler, quali sono le zone del corpo maggiormente esposte al rischio di lesioni da frizione?	I glutei e la regione scapolare e quella sacrale	Condili mediali e laterali,zona sacrale	Teca cranica e condili	Esclusivamente la regione costale
1428	Quando si mobilita un paziente per la prima volta dopo un intervento chirurgico devono essere presenti:	un infermiere	Due infermieri e un medico	Una coppia di OSS	Un OSS e un parente
1429	Quando si prepara un pacco da sterilizzare, dove deve essere collocato l'indicatore di sterilizzazione:	all'interno della confezione	All'esterno della confezione	Bordi esterni del pacco	Zone nascoste o difficilmente accessibili
1430	Quando si raccoglie un campione biologico per urinocoltura si deve:	raccogliere il getto intermedio, dopo la pulizia dei genitali	Contaminare il campione con germi provenienti da fonti esterne	Raccogliere il primo getto	Utilizzare un qualsiasi contenitore anche se non è specificatamente progettato per la raccolta dell'urina
1431	Quando si tagliano le unghie dei piedi si deve procedere, per evitare lesioni:	tagliandole dritte e non stondate	tagliare le unghie dei piedi mentre sono bagnate o umide	Tagliarle molto corte	Non tagliarle dopo una doccia o un bagno quando sono asciutte.
1432	Quando si toglie la maschera monouso occorre:	smaltirla subito	Scambiare la maschera con altre persone	Toccare gli occhi il naso e la bocca durante la rimozione	Reindossare la maschera monouso
1433	Quando si trasporta un assistito in barella si deve:	alzare i cancellini, tenerlo coperto, controllare le sue reazioni	Evitare di fissare correttamente il paziente sulla barella con cinghie di sicurezza	alzare i cancellini, tenerlo coperto e lasciarlo incustodito	Trascurare l'ergonomia
1434	Quando si trasporta una persona con la carrozzina o la barella, è necessario attenersi a uno dei seguenti accorgimenti:	se il paziente non è in grado di mantenere la postura da solo, assicurarlo con appositi dispositivi	Se il trasporto richiede l'aiuto di più persone,puoi rivolgerti ai parenti ma non a colleghi	alzare i cancellini, tenerlo coperto e lasciarlo incustodito	Trascurare l'ergonomia
1435	Quando siamo ad applicare una medicazione:	Occorre garantire che sia rispettata la privacy del paziente scoprendo unicamente la parte interessata dalla medicazione	Fissa la medicazione utilizzando nastro adesivo medico o bende elastiche, assicurandoti che sia molto stretta in modo che limiti il movimento del paziente	Scoprirlo totalmente	Somministrare antidolorifici anche senza consulto medico
1436	Quando su una superficie è presente del materiale organico bisogna:	decontaminare, asportare il materiale organico e detergere	Toccare il materiale organico a mani nude	Soffiare e agitare il materiale organico	Sfregare il materiale organico sulla superficie
1437	Quando un letto chiuso diventa aperto?	Quando il lenzuolo superiore e le coperte vengono ripiegate verso il fondo del letto	La coperta e il copriletto vengono ripiegate verso la parte superiore del letto	Viene assegnato ad un paziente	Le sponde laterali sono alzate
1438	Quando un paziente da movimentare non è collaborativo, per la movimentazione manuale:	occorrono almeno due operatori	Bisogna richiedere il trasferimento in una clinica ortopedica	Non è consentito chiedere l'aiuto di un collega	Non è possibile utilizzare dispositivi di sollevamento meccanici come le barelle a rullo
1439	Quando un utente anziano è a forte rischio di caduta e non è cognitivamente integro è:	utile pianificare, solo per il tempo necessario, interventi di tutela, individualizzati e riguardanti della dignità umana, da parte dell'intera équipe professionale	Non implementare misure preventive	Sottostimare il rischio di caduta	Non utilizzare dispositivi di sicurezza
1440	Quando una ferita è di colore giallo:	è infetta	In fase iniziale di guarigione	Una ferita più profonda o un ematoma sottocutaneo	Una ferita superficiale
1441	Quando una persona con limitazione funzionale ad un arto superiore deve infilare una camicia, deve:	infilare prima il braccio leso fino alla spalla, sistemare la camicia dietro alla schiena, portare il braccio sano dietro e introdurlo nella manica	Evitare di indossare camicie	Infilare prima il braccio sano fino alla spalla,sistemare la camicia dietro la schiena,portare il braccio leso dietro e introdurlo nella manica	Chiedere aiuto almeno ad altri 3 colleghi
1442	Quando va effettuato il cambio della biancheria nel letto del paziente?	Almeno una volta alla settimana	Una volta al giorno	Una volta la mese	Ogni qualvolta il paziente lo richiede
1443	Quante compressioni toraciche devono essere fatte in un soggetto in arresto cardiaco?	Almeno 100 al minuto	Almeno 10 al minuto	Almeno 50 al minuto	Almeno 200 al minuto
1444	Quante devono essere al minuto le compressioni toraciche al minuto in un soggetto in arresto cardiaco?	Almeno 100	Almeno 30	Almeno 5	Almeno 50
1445	Quanti operatori sono necessari per il rifacimento del letto di un malato non in grado di alzarsi?	Due	Quattro	Cinque	Tre operatori e un medico
1446	Quanti sono in un minuto gli atti respiratori di una persona a riposo?	dodici-venti	cinque-sei	Cinquanta-cinquantadue	Trenta-quaranta
1447	Quanto deve durare il lavaggio antisettico delle mani?	Almeno 1-2 minuti	Almeno 5 minuti	5 secondi	10 minuti
1448	Relativamente ad un soggetto con catetere vescicale a permanenza, quale è da ritenersi una prassi non corretta per la prevenzione delle infezioni delle vie urinarie?	Eseguire periodiche irrigazioni nella vescica con antibiotici o disinfettanti	Igiene del catetere	utilizzare cateteri a breve termine anziché cateteri a permanenza per ridurre il rischio di infezione	È fondamentale lavarsi sempre le mani con acqua e sapone prima e dopo ogni contatto con il catetere o il sito di inserimento
1449	Riguardo al lavaggio antisettico delle mani, quale di queste opzioni elencate corrisponde al primo passaggio da effettuare?	Bagnare con acqua le mani e i polsi	Utilizzare una quantità eccessiva di sapone o disinfettante	Bagnare le mani con acqua bollente	Strofinare la mani per almeno 5 minuti

1450	Riguardo al lavaggio antisettico delle mani, quale di queste opzioni elencate corrisponde all'ultimo passaggio da effettuare?	Smaltire le salviette utilizzate gettandole nell'apposito cestino	Utilizzare una quantità eccessiva di sapone o disinfettante	Bagnare con acqua le mani e i polsi	Asciugare le mani velocemente lasciandole un po' umide
1451	Riguardo al lavaggio e alla preparazione del materiale per la sterilizzazione dopo aver indossato i DPI bisogna:	Preparare la soluzione decontaminante	Ordinare all'infermiere di avvertire i familiari del paziente prima di effettuare la sterilizzazione del materiale	Effettuare una TAC al paziente	Ordinare al medico di preparare la soluzione decontaminante
1452	Riguardo al lavaggio sociale delle mani dell'operatore occorre frizionare accuratamente le mani per almeno:	15 secondi	un minuto	due minuti	40 secondi
1453	Riguardo al lavaggio sociale delle mani dell'operatore, nella fase del risciacquo con acqua corrente, bisogna:	tenere le mani più in alto dei gomiti	Utilizzare acqua troppo calda o acqua troppo fredda	Tenere le mani più in basso dei gomiti	Trascurare le aree tra le dita e sotto le unghie
1454	Riguardo al lavaggio sociale delle mani dell'operatore, qual è il primo passaggio da effettuare?	Bagnare le mani e gli avambracci con acqua	Regolare la temperatura della acqua oltre i 35°gradi	Regolare la temperatura dell'acqua sotto un grado	Non utilizzare acqua corrente
1455	Riguardo al posizionamento del condom-catetere vescicale esterno bisogna applicarlo:	senza stringere troppo	Forzare il posizionamento	Applicare su pella bagnata o sporca	Utilizzare una taglia più grande rispetto alle dimensioni del pene
1456	Riguardo al posizionamento del paziente in decubito di Sims come prima cosa bisogna:	spiegare al paziente come può collaborare	Posizionare il paziente sulla zona di lesione	Comprimere eccessivamente i vasi sanguigni	Non utilizzare lenzuola o coperte è preferibile che il paziente rimanga scoperto
1457	Riguardo al posizionamento del paziente in decubito di Sims come ultima cosa bisogna:	documentare sulla cartella infermieristica orario, cambi di posizione e mobilitazione secondo i protocolli utilizzati	Somministrare antistaminici	Documentare sulla propria agenda personale orario, cambi di posizione e mobilitazione senza tener conto dei protocolli	Comprimere eccessivamente i vasi sanguigni
1458	Riguardo al posizionamento del paziente in decubito di Sims sotto la testa del paziente bisogna:	mettere un cuscino piccolo	mettere qualcosa di scivoloso	Sotto la testa del paziente non si può mettere nulla	mettere cuscini troppo spessi e rigidi
1459	Riguardo al posizionamento del paziente in decubito di Sims, bisogna lavarsi le mani e, se necessario, indossare:	i guanti	Braccialetti	Anelli	guanti in lana
1460	Riguardo al posizionamento dell'assistito nel letto in posizione seduta o semi seduta come ultima cosa bisogna:	sollevare il bacino (nel letto articolato) per prevenire lo scivolamento del paziente	Se il letto è dotato di ruote, assicurarsi di sbloccare le ruote prima di posizionare il paziente in posizione seduta o semi-seduta	Posizionare il paziente più vicino possibile al bordo del letto	sollevare il paziente in modo veloce e brusco durante il posizionamento nel letto in posizione seduta o semi-seduta.
1461	Riguardo al posizionamento dell'assistito nel letto in posizione seduta o semi seduta cosa bisogna mettere dietro la schiena del paziente per sostenere la nuca e la testa?	Un cuscino	Dei libri	Minimo 2 cuscini spessi	Non si può mettere nulla dietro la schiena del paziente per sostenere la nuca e la testa
1462	Riguardo al posizionamento di catetere vescicale esterno come prima cosa bisogna:	lavarsi le mani	Lavarsi le mani senza utilizzare sapone	Ignorare le norme di asepsi	Non utilizzare disinfettanti per le mani a base di alcol
1463	Riguardo al posizionamento di catetere vescicale esterno come ultima cosa bisogna:	cambiare il condom secondo le indicazioni e provvedere alla cura della cute	Durante il monitoraggio del paziente dopo il posizionamento del catetere, ignorare segni di disagio o complicanze.	E' vietato registrare e monitorare l'output urinario del paziente	Rimuovere il catetere ogni qual volta si ritiene necessario anche senza autorizzazione o competenza
1464	Riguardo alla procedura della tricotomia, l'OSS NON deve:	effettuarla 24 ore prima di un intervento chirurgico	assistere il professionista sanitario responsabile fornendo supporto e aiuto secondo necessità	Posizionare cuscini o supporti sotto il paziente per garantire comfort e stabilità.	Assicurarsi che l'ambiente sia pulito, ben illuminato e fornito di tutti gli strumenti necessari per la procedura.
1465	Rispetto al controllo della diuresi, l'OSS deve saper osservare e riferire:	la quantità, il colore, la trasparenza, l'odore delle urine	la presenza di glucosio, proteine, corpi chetogeni nelle urine	Non è di competenza dell'OSS l'osservazione nella variazione della diuresi del paziente	dovrebbe fare inferenze mediche riguardo alla causa dei cambiamenti nella diuresi del paziente o prescrivere trattamenti in base alle osservazioni fatte.
1466	Rispetto all'uso del bastone come ausilio della mobilitazione, l'operatore sociosanitario dovrà dire al paziente che:	l'ausilio deve essere usato dalla parte opposta rispetto all'arto inferiore debole	dovrebbe minimizzare l'importanza dell'uso del bastone come ausilio alla mobilità	dovrebbe limitare l'uso del bastone solo all'interno di casa.	l'ausilio deve essere usato dalla parte dell'arto inferiore debole
1467	Quali di queste azioni l'OSS non deve compiere nell'assistere un paziente disfagico?	Evitare, se il paziente necessita di essere imboccato di continuare nella manovra, se si verificano problemi o difficoltà, come tosse, cianosi, o altri segni di soffocamento.	La verifica degli alimenti.	Evitare di somministrare alimenti e bevande di consistenza e temperatura non adeguata a quanto prescritto	Posizionare il paziente a letto o accompagnarlo al tavolo se necessario
1468	Scollegare la sacca di drenaggio delle urine dal catetere facilita il rischio di:	infezioni delle vie urinarie	Infezioni delle vie aeree	Crisi epilettiche	Perdita della peluria
1469	Se abbiamo necessità di energia immediatamente utilizzabile, quali sono i principi nutritivi che ce la possono fornire facilmente?	I carboidrati semplici	Assumere alcolici dopo i pranzi	Saltare i pasti principali	Bere elevati quantitativi di caffeina
1470	Se all'assistito dà fastidio l'impacco caldo umido, si deve:	Togliere l'impacco, osservare la cute e riferire all'infermiere	Ignorare o minimizzare il disagio dell'assistito	Continuare a utilizzare l'impacco senza apportare modifiche	Forzare l'assistito a sopportare l'impacco
1471	Se dopo un intervento chirurgico il paziente ritorna nello stesso letto è necessario:	Sostituire tutta la biancheria e portare il letto ad un livello che consenta all'operatore movimenti agevoli	Non è necessario sostituire la biancheria	L'oss ordina all'infermiere di farsi aiutare con il cambio biancheria	Tutte le risposte sono corrette

1472	Se durante il pasto la persona inizia improvvisamente a vomitare, l'oss deve:	Posizionare la testa di lato, chiamare l'infermiere, mettere asciugamano/telo sul torace	Forzare il paziente a continuare a mangiare	Se il vomito è legato a problemi digestivi o altri disturbi, è importante somministrare farmaci senza una valutazione medica appropriata.	Posizionare la testa di lato e fargli bere acqua ghiacciata
1473	Se durante la consumazione del pasto il bambino inizia improvvisamente a vomitare, quali azioni deve compiere l'OSS?	Deve posizionare la testa di lato, chiamare l'infermiere, posizionare un asciugamano o un telo sul torace del paziente	Non interrompere il pasto	Lasciare che il paziente si pulisca solo	Se il vomito è legato a problemi digestivi o altri disturbi, è importante somministrare farmaci senza una valutazione medica appropriata.
1474	Se il paziente è portatore di protesi dentaria, l'OSS:	sa che la frequenza dell'igiene della bocca e della protesi non cambiano	Maneggiare la protesi in modo brusco	Forzare la protesi nella bocca del paziente	Ignorare segni di disagio del paziente
1475	Se il paziente assume una posizione supina, quali delle seguenti aree sono da controllare perché a rischio di sviluppare lesioni da pressione?	Nuca, scapole sacro, colonna vertebrale, talloni	Nuca, gomiti, spalle	Colonna vertebrale, talloni, fianchi	Gomiti, fianchi, spalle
1476	Se la rianimazione ha avuto esito positivo ed è ricomparsa l'attività respiratoria, il paziente deve essere posto in posizione:	Laterale di sicurezza per favorire la fuoriuscita di eventuale vomito	Porre il paziente in posizione di recupero	Porre il paziente sdraiato a pancia in giù	Far alzare immediatamente il paziente dal letto
1477	Se la zona sacrococcigea di un paziente arrossata, l'OSS:	Disinfetta con cura la cute	Applicare bendaggi abbastanza stretti	Applicare prodotti irritanti	Ignorare il problema
1478	Se l'infermiere assegna all'O.S.S. il compito di effettuare un'iniezione sottocutanea, cosa deve fare l'O.S.S.?	Deve rifiutare la prestazione in quanto non rientrante nei suoi compiti. La somministrazione di terapia per via intramuscolare o sottocutanea va effettuata invece dall'O.S.S. con formazione complementare	L'oss inizia a somministrare la terapia	Ignorare sempre e comunque le istruzioni ed attendere il medico	L'infermiere non può mai assegnare compiti all'OSS
1479	Se l'infermiere dice all'OSS di eseguire cure igieniche parziali al malato, l'OSS:	Sa che sono cure di parti del corpo	L'oss inizia le cure ma ordina al medico di turno di farsi aiutare	L'infermiere non può mai assegnare compiti all'OSS	L'oss deve rifiutarsi
1480	Una normale frequenza cardiaca in un adulto a riposo, è tale quando si registrano:	60-80 battiti/minuto	150-170 battiti/minuto	30-50 battiti/minuto	60-80 battiti/secondo
1481	Se l'operatore sociosanitario rileva in un paziente valori della pressione arteriosa pari a 175/110 mmHg:	è necessario che li comunichi immediatamente all'infermiere	è necessario somministrare un antidolorifico	è necessario che chiami un altro operatore ma non l'infermiere	Modificare la terapia farmacologica
1482	Se l'OSS deve aiutare un bambino affetto da emiplegia a scendere le scale avvalendosi di un ausilio, deve sapere che la corretta sequenza dei movimenti è la seguente:	ausilio - gamba plegica - gamba sana	L'oss non può aiutarlo ed ordina al medico di farlo	Ausilio -gamba sana -gamba plegica	L'oss non aiuta il paziente gli da solo dei consigli utili
1483	Se l'OSS deve aiutare un soggetto affetto da emiplegia a scendere le scale avvalendosi di un ausilio deve sapere che la corretta sequenza dei movimenti è la seguente	Ausilio -gamba plegica- gamba sana	Ausilio -gamba sana -gamba plegica	L'oss non aiuta il paziente gli da solo dei consigli utili	L'oss non può aiutarlo ed ordina al medico di farlo
1484	Se l'OSS nell'ambito dell'attività di igiene personale al bambino non autosufficiente o allettato rileva che la zona sacrococcigea è arrossata:	Informa l'infermiere e applica una crema barriera senza massaggiare	Senza informare nessuno procede ad applicare creme anti arrossamento	L'oss non svolge attività di igiene	Ordina al medico di applicare le dovute attività
1485	Se si deve procedere a sollevare dalla poltrona una persona con difficoltà motorie, qual è il sistema più corretto?	Mettere un piede davanti a quelli della persona assistita, posizionare le mani sotto al bacino, con le braccia dell'assistito al collo dell'operatore	Assicurarsi di eseguire movimenti bruschi e repentini	Non è importante adottare un sistema di sollevamento sicuro	Nessuna delle risposte è corretta
1486	Se si mobilita una persona allettata passando dalla posizione supina a quella seduta o semiseduta in letto:	Si migliora l'espansione toracica della persona	Iniziare la procedura senza mai comunicare al paziente le modalità di svolgimento	Iniziare la procedura con movimenti bruschi e repentini	Non si hanno mai miglioramenti
1487	Se un operatore viene a contatto con materiale biologico, come deve effettuare il lavaggio delle mani?	Con un prodotto antisettico	Iniziare il lavaggio senza rimuovere anelli o accessori	Strofinare le mani insieme per non più di 10 secondi	Tutte le risposte sono corrette
1488	Se un paziente rifiuta di alimentarsi, l'operatore sociosanitario:	Informa l'infermiere e chiede indicazioni	Costringere il paziente a mangiare	Deve ignorare i segnali di avvertimento	Minimizzare il problema
1489	Se un paziente tossisce e diventa cianotico mentre l'operatore sociosanitario lo sta imboccando, è necessario sospendere l'alimentazione e:	Chiamare immediatamente l'infermiere	Attendere 5 minuti e riprendere ad imboccare il paziente	Minimizzare il problema	Non è importante prestare attenzione alla respirazione
1490	Se un paziente tossisce e diventa cianotico mentre l'OSS lo sta imboccando:	Sospende l'alimentazione e chiama l'infermiere	Minimizzare il problema	Non è importante prestare attenzione alla respirazione	Nessuna delle risposte è corretta
1491	Se un paziente tossisce e diventa colorito rosso o cianotico, mentre l'OSS sta somministrando il pasto bisogna:	Sospende l'alimentazione e chiama l'infermiere	Aspettare che sparisca il rossore	Ordinare al medico di aiutare il paziente con il pranzo	Minimizzare sempre il problema con il paziente
1492	Se un paziente/anziano lamenta mancanza di respiro mentre è a letto come primo intervento:	Lo si mette seduto	Lo si mette su un sedia a rotelle e si porta fuori dalla struttura	Ci si assicura di avere una stanza ben arieggiata , se non fosse così , aprire immediatamente porte e finestre	Ordino all'infermiere la respirazione bocca a bocca
1493	Se viene indicata una dieta con scorie/fibre, quali di questi alimenti occorre incrementare?	Verdura	Cereali	Legumi	Noci

1494	Secondo il principio di giustizia, l'OSS deve:	Distribuire il proprio tempo tra i pazienti in base alle reali necessità di aiuto ed assistenza	Garantire un accesso non a tutti in maniera equa ai servizi sanitari	Non occorre rispettare la privacy e la riservatezza	Fornire cure di alta qualità ma non in modo imparziale
1495	Secondo la normativa vigente, l'uso del defibrillatore semiautomatico è consentito:	Ai medici, agli infermieri ed al personale non sanitario qualificato	Solo all'infermiere con più di 7 anni di esperienza	Solo al medico	A tutti coloro sappiano usarlo
1496	Secondo le più recenti raccomandazioni nelle linee guida per la cura della cute, quale di queste manovre un tempo considerata utile per la guarigione delle piaghe non è più permessa?	Massaggiare e frizionare in corrispondenza di prominente ossee	Applicazione di creme idratanti o emollienti	Esaminare regolarmente la pelle del paziente per rilevare segni di danni, irritazioni o infezioni.	Le pratiche di igiene generale, come il cambio regolare dei vestiti e della biancheria da letto
1497	Secondo le raccomandazioni per l'utilizzo dei guanti, occorre sostituirli o rimuoverli:	Dopo il contatto con un'area contaminata e prima del contatto con un'area pulita	Mai cambiare i guanti tra le diverse attività	Dopo la rimozione dei guanti mai lavare le mani	Non occorre mai sostituirli
1498	Secondo le raccomandazioni per l'utilizzo dei guanti, quando occorre sostituirli o rimuoverli:	Dopo il contatto con un'area contaminata e prima del contatto con un'area pulita dell'ambiente sanitario	Mai cambiare i guanti tra le diverse attività	Chiedere consigli al medico su quando e come occorre sostituirli	Nessuna delle risposte è corretta
1499	Sul carrello per le cure igieniche deve essere sempre presente:	Una confezione di guanti monouso	Gli strumenti chirurgici avanzati o specializzati	Strumenti per procedure specifiche	Documentazione medica sensibile
1500	Tra gli interventi di assistenza rivolti al bambino affetto da stitichezza, quale tra quelli indicati è da ritenersi non corretto?	Limitare l'apporto di liquidi	Una dieta ricca di fibre e acqua	Aumento dell'attività fisica	Igiene intestinale
1501	Tra le azioni che si svolgono per il lavaggio delle mani, qual è la prima da mettere in atto?	Rimuovere anelli, bracciali e orologio	Applicare il sapone	Bagnare le mani con acqua bollente	Nessuna delle risposte è corretta
1502	Tra le seguenti manovre è maggiormente causa nel determinare una infezione ospedaliera?	Inserire un catetere urinario	Effettuare una flebo su un paziente	Compilazione della cartella clinica	Lavaggio sociale delle mani
1503	Tra quelle elencate qual è la metodologia più corretta nel praticare la respirazione artificiale?	Bocca-bocca	Applicare detergente prima di praticare la respirazione artificiale	Sedare il paziente e solo dopo effettuare la respirazione artificiale	Tutte le risposte sono corrette
1504	Trovando una persona in apparente stato di incoscienza bisogna:	Controllare il livello di coscienza chiamandola	Porre il paziente in posizione di recupero	Monitorare il paziente senza fornire assistenza ed attendere l'arrivo dei medici	Nessuna delle risposte è corretta
1505	Tutti i disinfettanti vanno conservati:	In appositi locali areati, lontano dalla portata dei degeni, posti in piccole confezioni per esaurirli in tempi indicati. Inoltre i flaconi devono essere richiusi immediatamente dopo l'uso	In luoghi aperti o ben arieggiati, possibilmente in ambienti umidi che mantenghino la temperatura sotto i 10°C	Posti in grandi confezioni per far sì che non si esauriscano in breve termine. Inoltre i flaconi devono essere richiusi immediatamente dopo l'uso	Non ha importanza di come vengano conservati
1506	Un ciclo completo di RCP è costituito da:	30 compressioni e 2 insufflazioni per un totale di 5 volte	20 compressioni e 3 insufflazioni per un totale di 5 volte	10 compressioni e 2 insufflazioni per un totale di 5 volte	30 compressioni e 1 insufflazioni per un totale di 3 volte
1507	Un esempio di attività attribuibile all'OSS in cooperazione con l'infermiere può essere:	La mobilizzazione e il cambio biancheria personale e del letto a pazienti politraumatizzati in fase acuta	L'OSS insieme all'infermiere può prescrivere farmaci	Solo ed esclusivamente il cambio di biancheria personale	L'OSS non svolge in nessun caso attività insieme all'infermiere
1508	Un letto chiuso diventa aperto quando:	Il lenzuolo superiore e le coperte vengono ripiegate verso il fondo del letto	Quando le sponde del letto vengono alzate per creare una barriera intorno al paziente.	Quando il paziente della struttura passa almeno due notti in quel determinato letto	Nessuna delle risposte è corretta
1509	Un massaggio cardiaco è efficace quando:	Il soggetto è adagiato per terra	Quando il cuore è in fibrillazione ventricolare	Quando si presentano gravi lesioni toraciche o addominali:	Il paziente ha altre condizioni mediche critiche non trattate che contribuiscono all'arresto cardiaco
1510	Un OSS ha accidentalmente rovesciato una brocca d'acqua nel corridoio del reparto. Il primo intervento che l'infermiere dovrebbe attuare per evitare le cadute è:	Restare dov'è avvenuto l'incidente e mandare qualcun altro a chiamare il personale delle pulizie per fare asciugare	Spostarsi immediatamente ed avvisare il personale delle pulizie	Lasciare l'area bagnata ma segnalarla con gli opportuni cartelli di pericolo	Ordinare all'infermiere o al medico di turno di chiamare il servizio di pulizia
1511	Un pannolone sporco, proveniente da un paziente non infetto, è da considerare...	Rifiuto assimilabile agli urbani	Rifiuti radiologici	Rifiuti infettivi o biologici	Rifiuti pericolosi
1512	Un paziente è iperpiretico. Quali parametri si devono rilevare?	La temperatura corporea	Pressione arteriosa	Pulsossimetria	Parametri respiratori
1513	Un paziente chiede da molti giorni di bere tantissima acqua, la cosa migliore da fare è:	Avvisare il capo sala/reparto	Ordinare al medico di controllare i parametri vitali del paziente	Assecondare le richieste del paziente	Nessuna delle risposte è corretta
1514	Un paziente di 3 mesi presenta temperatura rettale di 38,5°, quali provvedimenti adottati?	Segnalare il caso all'Infermiera Pediatrica di reparto	Attendo qualche ora per contattare un medico	L'Oss inizia immediatamente a somministrargli la cura	Somministrare bagni freddi o ghiaccio al bambino
1515	Un paziente semiosciente sta vomitando. Cosa deve fare l'OSS?	Posizionare la testa di lato	Offrire cibo o liquidi prima di stabilizzare il paziente	Deve portarlo immediatamente in bagno	Ignorare il vomito
1516	Un utente anziano, cognitivamente integro, non riesce a prendere sonno. L'OSS può:	Cercare di convincerlo a dormire spiegandogli che il sonno è importante per la sua salute.	Somministrare sonniferi per aiutare il paziente a dormire	Ordinare all'infermiere di portare al paziente 1 camomilla	Promuovere un uso frequente di dispositivi elettronici prima di coricarsi
1517	Una buona pulizia perineale contribuisce a:	Prevenire le infezioni	Contribuisce poco alla salute del paziente	Non è necessaria nel paziente Under 50	Nessuna delle risposte è corretta
1518	Una parente vi chiede notizie su un paziente ricoverato nel vostro reparto:	Lo indirizzate dal medico o al caposala o all'infermiere	Aiutate il parente portandolo dal paziente	Divulgare informazioni mediche confidenziali	Promettere risposte immediate o dettagliate
1519	Una persona che ha perso conoscenza ma mantiene i segni vitali (polso e respiro). Che cosa deve fare l'OSS ?	La pone in posizione laterale di sicurezza chiamando subito soccorso	La pone in posizione sdraiata a pancia in giù chiamando subito il soccorso	Ordinare al medico di controllare i parametri vitali del paziente	Attende 5 minuti e procede nuovamente alla misurazione dei parametri vitali

1520	Una persona contaminata da sostanza caustica, per soccorrerla immediatamente bisogna:	Indossare i guanti	Indossare occhiali protettivi e camice con pettorina giallo/nera per segnalare il problema	Ordinare al medico di aiutare il paziente	Mai soccorrere una persona contaminata da sostanza caustica
1521	Una soluzione disinfettante può essere contaminata da quale delle seguenti manovre?	Lasciare aperta la confezione dopo l'uso	Utilizzando guanti sterili	Seguendo il protocollo	Non può essere mai contaminata
1522	Per il bagno del neonato, la temperatura dell'acqua deve essere:	fra 36 e 37 ° C	fra i 34 e 35° C	La temperatura dell'acqua non deve essere mai simile alla temperatura del corpo	La vasca per il bagno del neonato deve essere riempita con acqua a 40° C ed aspettare che si raffreddi
1523	Per il giusto confort del bambino ospedalizzato, l'ambiente dove soggiorna deve essere:	Ben arieggiato	Non arieggiato	Sempre riscaldato con umidità superiore al 30%	Il confort del bambino non è mai importante
1524	Per il rifacimento di un letto occupato, bisogna piegare il lenzuolo inferiore alla metà del letto e unire con una piega:	Ad angolo retto	Rettangolare	Non è importante piegare il lenzuolo	Rifare il letto insieme al paziente secondo le sue esigenze
1525	Per il rifacimento di un letto occupato, come prima cosa bisogna:	Lavarsi le mani ed osservare le procedure per il controllo delle infezioni, indossando i guanti monouso ove necessario	Indossare dei guanti monouso e cambiare le lenzuola utilizzate dal paziente	Attendere l'arrivo del nuovo paziente e rifarlo a seconda delle sue esigenze	Tenere la stanza ben arieggiata
1526	Per il rifacimento di un letto occupato, come ultima cosa bisogna:	Sempre garantire la sicurezza del paziente	Assicurarsi di avere la stanza ben arieggiata	Non ci sono delle procedure da seguire	Chiedere al paziente che tipo di lenzuola preferisce
1527	Per il trasporto dei rifiuti biologici a rischio infettivo, i campioni devono essere	Confezionati secondo il sistema a più involucri	Trasportati in pacchi di polistirolo	Non è importante su come si trasportano	Aperti e subito pronti all'uso
1528	Per il trasporto di materiale biologico e campioni diagnostici, come prima cosa bisogna:	Lavarsi le mani	Utilizzare guanti monouso	Non esistono procedure standard	Ordinare al medico di trasportarlo
1529	Per il trasporto di sangue ed emoderivati come prima cosa bisogna:	Provvedere al ritiro ed al trasporto del sangue in tempi rapidi servendosi dell'apposito contenitore	Controllare sulle mappe sanitarie il tragitto da seguire per il trasporto	Mai avvertire il personale infermieristico dell'avvenuto ritiro	Ordinare al medico di tenere la struttura aperta
1530	Per la disinfezione di una ferita sporca di terra dopo una caduta rovinosa cosa si deve utilizzare?	Acqua ossegenata	Alcool	Antidolorifici	Acqua pulita non troppo fredda
1531	Per la distribuzione dei pasti l'oss deve:	Avere a disposizione il menù giornaliero	Chiedere ai pazienti della struttura cosa gradiscono mangiare	Non ci sono delle procedure sanitarie da seguire	Nessuna delle altre risposte è corretta
1532	Per la misurazione della pressione arteriosa arti inferiori, bisogna aiutare il paziente ad assumere:	Una posizione prona	Posizionarsi a pancia in giù	Posizionare il paziente con le gambe accavallate	Nessuna posizione in particolare
1533	Per la misurazione della pressione arteriosa - arti inferiori, come prima cosa bisogna:	Spiegare al paziente come collaborare	Ordinare al medico come bisogna procedere	Lavarsi le mani con alcool	Nessuna delle altre risposte è corretta
1534	Per la misurazione della pressione arteriosa - arti inferiori, come ultima cosa bisogna:	Ripetere la procedura, se necessario, per conformare la misurazione	Assicurarsi di avere la stanza ben arieggiata	Non occorre rispettare regole fondamentali	Tutte le altre risposte sono corrette
1535	Per la misurazione della pressione arteriosa - arto inferiori, bisogna posizionare il fonendoscopio sopra:	L'arteria poplitea	Arteria branchiale	Arteria ascellare	Non c'è un metodo di posizionamento
1536	Per la misurazione della temperatura corporea con il termometro timpanico la sonda sulla quale deve essere sempre posizionata la protezione monouso va inserita con cautela nel condotto auricolare:	Tirando il lobo dell'orecchio indietro e verso il basso	Tirando il lobo dell'orecchio avanti e poi in alto	Tirando il lolo dell'orecchio 3 volte verso il basso	Nessuna delle risposte è corretta
1537	Per la misurazione della temperatura corporea con termometro timpanico come prima cosa bisogna:	Controllare le condizioni del condotto uditivo	Chiamare sempre l'otorino ed assicirarsi di effettuare la procedura corretta	Farsi aiutare dal paziente per la misurazione	Inserire il termometro con un colpo deciso nella cavità uditiva
1538	Per la misurazione della temperatura corporea con termometro timpanico come ultima cosa bisogna:	Indicazioni della ditta produttrice per la pulizia e disinfezione del termometro	Contattare i familiari e spiegare come aiutare il paziente nelle ore successive alla misurazione della temperatura	Chiamare sempre l'otorino ed assicirarsi di effettuare la procedura corretta	Tutte le risposte sono corrette
1539	Per la misurazione della temperatura corporea, come prima cosa bisogna:	Lavarsi le mani e indossare i guanti se si misura la temperatura rettale	Farsi aiutare dal paziente per la misurazione	Far stendere il paziente sul letto	Non ci sono delle procedure prestabilite
1540	Per la misurazione della temperatura corporea, come ultima cosa bisogna:	Riportare il valore della temperatura nella cartella infermieristica del paziente	Accompagnare di persona il paziente fuori dalla struttura ospedaliera	Lavare il termometro e conservarlo	Nessuna delle risposte è corretta
1541	Per la misurazione della temperatura corporea:	Non è indicato l'uso dei guanti	E'obbligatorio l'uso dei guanti	Ordinare al medico di eseguire la procedura	Farsi aiutare dal paziente per eseguire una corretta misurazione
1542	Per la movimentazione manuale di un ospite dal letto alla barella trasporto è assolutamente necessario:	Lavorare in coppia e avere un piano di scorrimento	Ordinare al medico di aiutarlo	Farsi aiutare dal paziente	Lavorare insieme ad almeno altre 2 persone per eseguire lo spostamento
1543	Per la persona che non si alimenta per bocca, la pulizia del cavo orale deve essere svolta:	Al mattino e alla sera	Tutti i giorni 4 volte al giorno	Tutti i giorni al mattino	Non è essenziale svolgere la pulizia
1544	Per la preparazione del paziente di sesso femminile alla raccolta di un campione di urina, l'OSS prima di tutto deve:	Preparare il materiale da utilizzare e lavarsi le mani	Utilizzare dei guanti monouso senza lavare le mani	Leggere le istruzioni sul contenitore di raccolta e ordinare all'infermiere la procedura da svolgere	Nessuna delle risposte è corretta
1545	Per la procedura di mobilitazione di un paziente che necessita di bastone per camminare, come prima cosa l'OSS deve:	Identificare il paziente	Ordinare al medico di aiutarlo	Non ci sono delle procedure da seguire	Avvertire i familiare del paziente prima di iniziare la procedura

1546	Per la pulizia del materiale da sterilizzare, al fine di evitare incidenti, è necessario che il personale addetto utilizzi...	Robusti guanti in gomma.	Camici riutilizzabili	Occhiali protettivi e mai guanti in gomma	Non è obbligatorio utilizzare strumenti protettivi
1547	Per la rilevazione del polso periferico, l'operatore sanitario provvede a:	Poggiare i polpastrelli di indice, medio e anulare, o indice e medio, della mano utilizzata per la rilevazione sul polso del paziente	Far accomodare il paziente ed attendere sempre l'arrivo del medico	Poggiare i polpastrelli di pollice e anulare, della mano utilizzata per la rilevazione sul polso del paziente	Nessuna delle risposte è corretta
1548	Per la rilevazione della temperatura corporea, quale di queste affermazioni è corretta?	la temperatura timpanica riflette quella interna del corpo	Far accomodare il paziente ed aiutarlo con le dovute precauzioni a misurarsi da solo la temperatura	Misurare la temperatura sempre nelle ore diurne	Tutte le risposte sono corrette
1549	Per la sanificazione di una superficie si utilizzano:	Detergenti (saponi)	Soluzioni a base di ibuprofene	Nessun tipo di detergente, lavare solo con acqua	Tutte le risposte sono sbagliate
1550	Per la sostituzione di una medicazione asciutta come prima cosa bisogna:	Spiegare al paziente come può collaborare	Applicare, se necessario, una protezione ai margini della ferita.	Eseguire una valutazione olistica completa della ferita.	Ordinare al medico di sostituirla
1551	Per la sostituzione di una medicazione asciutta come ultima cosa bisogna:	Rimuovere i guanti e lavarsi le mani	Pulire la ferita e l'area circostante.	Asciugare tutte le parti della ferita	Ordinare all'infermiere di eseguire la medicazione
1552	Per la vestizione e la svestizione sicura del paziente emiplegico, per la parte superiore del corpo (maglie, magliette, felpe);	Si procederà vestendo sempre prima il braccio plegico, che sarà sempre l'ultimo ad essere svestito	Si procederà svestendo sempre prima il braccio plegico, che sarà sempre l'ultimo ad essere vestito	Si vestiranno e svestiranno le due braccia contemporaneamente	Non esistono procedure standard per la vestizione e svestizione sicura del paziente emiplegico
1553	Per l'esecuzione di un prelievo di sangue venoso a scopo di coltura ematica, il campione deve essere di norma prelevato:	Durante un episodio di aumento della temperatura corporea	Quando l'oss lo ritiene più opportuno	Può essere prelevato in presenza di flebite	Tutte le risposte sono corrette
1554	Per l'igiene perianale e genitale come prima cosa bisogna:	Lavarsi le mani ed osservare le procedure per il controllo delle infezioni	Indossare dei guanti monouso senza mai lavarsi le mani	Disinfettare tutto il luogo di lavoro	Spiegare le procedure al paziente e mai disinfettarsi le mani
1555	Per l'igiene quotidiana dell'assistito, è opportuno utilizzare:	Detergenti a pH fisiologico	Saponi a base di alcool	Guanti monouso e acqua sempre calda	Nessuna delle risposte è corretta
1556	Per l'uso corretto del disinfettante è opportuno:	Eseguire le diluizioni con i dispositivi di sicurezza individuale	Disinfettarsi le mani con alcool	Ordinare all'infermiere di disinfettare il paziente	Non indossare nessun dispositivo di sicurezza
1557	Per mantenere la pervietà delle vie aeree si deve:	Sollevare il mento con due dita	Sollevare il mento con la mano destra	Chiedere al paziente di sollevare il capo	Con l'aiuto dell'infermiere spiegare le procedure al paziente e farglielo fare da solo
1558	Per mantenere un ambiente quanto più possibile pulito, secondo le norme di asepsi, quale delle seguenti azioni risulta corretta?	Coprire la padella con un telino pulito dopo l'uso e rimuoverla dalla stanza tempestivamente	Aprire 3 volte al giorno le finestre della camera del paziente	Disinfettare l'ambiente con alcool e acqua calda	Tutte le risposte sono corrette
1559	Per misurare le capacità di deambulazione di una persona, qual è la scala di valutazione più usata?	La scala di Barthel o Indice di Barthel	La scala di mohns	Non esistono scale di valutazione	La scala di Norton
1560	Per preparare 500cc di soluzione disinfettante al 2%, occorrono:	490 cc di acqua e 10 cc di disinfettante	400 cc di acqua e 100 cc di disinfettante	480 cc di acqua e 20 cc di disinfettante	500 cc di acqua e 2 cc di disinfettante
1561	Per preparare un litro di soluzione disinfettante al 2% occorrono:	980 cc di acqua e 20 cc di disinfettante	900 cc di acqua e 100 cc di disinfettante	980 cc di acqua e 20 cc di disinfettante	1000 cc di acqua e 2 cc di disinfettante
1562	Per preparare un litro di soluzione per la sanificazione di un locale alla concentrazione del 5 %, quanta acqua e quanto disinfettante sono necessari:	950 ml di acqua e 50 ml di disinfettante	930 ml di acqua e 70 ml di disinfettante	900 ml di acqua e 100 ml di disinfettante	1000 ml di acqua e 5 ml di disinfettante
1563	Per preparare una soluzione disinfettante al 2% occorrono:	980 cc di acqua e 20 cc di disinfettante	900cc di acqua e 100 cc di disinfettante	960 cc di acqua e 40 cc di disinfettante	1000cc di acqua e 2 cc di disinfettante
1564	Per preservare e migliorare la tolleranza dei tessuti cutanei è bisogna evitare:	Il talco	Saponi neutro	Acqua	Nessuna delle risposte è corretta
1565	Per prevenire il rischio da movimentazione dei carichi l'operatore deve:	Piegare le gambe e non la schiena quando deposita o solleva un carico	Piegare sempre la schiena	Piegare le gambe ma supportare il carico con la schiena	Nessuna delle risposte è corretta
1566	Per prevenire la lesione da decubito è necessario:	Mantenere la cute pulita e asciutta	Mantenere la cute sempre pulita ma un po' umida	Lavare ogni 3 ore la cute con acqua calda	Non utilizzare disinfettanti
1567	Per prevenire la lesione da pressione è necessario:	Mantenere la cute pulita e asciutta	Lavare ogni 3 ore la cute con acqua calda	Mantenere la cute sempre pulita ma un po' umida	Nessuna delle risposte è corretta
1568	Per prevenire le infezioni urinarie in un portatore di catetere vescicale è necessario:	Non manipolare i punti d'inserzione	Somministrare una dose di insulina	Porre sui punti d'inserzione delle creme detergenti	Attuare delle manovre sulla schiena
1569	Per quali delle seguenti prestazioni è corretto il lavaggio sociale delle mani?	Prima di fare i letti	Quando si utilizzano oggetti non contaminati	Quando si svolgono attività che non coinvolgono il contatto diretto con pazienti o materiali contaminati	Non è mai opportuno il lavaggio sociale delle mani
1570	Per quanto tempo può essere mantenuta la posizione laterale di sicurezza?	Non più di 30 minuti	Non più di 60 minuti	Non più di 10 minuti	Non più di 40 minuti
1571	Per quanto tempo viene mantenuta la sterilità dal materiale sterilizzato in busta semplice?	30 giorni	3 giorni	40 giorni	10 giorni
1572	Per raccogliere oggetti da terra, il modo corretto è:	Piegare le ginocchia e tenere l'oggetto vicino a sé	Piegare la schiena e tenere l'oggetto vicino a sé	Chiedere l'aiuto del paziente	Abbassarsi accuratamente, sedersi per terra e raccoglierlo

1573	Per riposizionare un paziente che è scivolato verso i piedi del letto, compiendo la manovra a due operatori, quale azione gli OSS devono compiere per evitare traumi alla propria colonna?	Appoggiarsi con un ginocchio sul letto per avere una leva favorevole	Appoggiarsi con le due ginocchia sul letto per avere una leva favorevole	Chiedere l'aiuto di una seconda persona	Non poggiarsi mai sul letto
1574	Per scrivere in modo corretto le consegne è utile impiegare un linguaggio:	Sintetico	Articolato	Articolato utilizzando massimo 1000 caratteri	Nessuna delle risposte è corretta
1575	Per soccorrere immediatamente una persona contaminata da sostanza caustica si deve :	Indossare i guanti	Tamponare le ferite con sostanze disinfettanti	Non indossare guanti	Applicare pomata abrasiva
1576	Per spostare correttamente un peso è necessario:	Mantenere i piedi ben distanziati, in modo da allargare la base d'appoggio e distribuire il peso sugli arti inferiori	Appoggiarsi sulla schiena e spostare con cura il peso	Ordinare al medico di farlo	Tutte le risposte sono corrette
1577	Per svuotare la sacca di raccolta delle urine:	Disinfetto il rubinetto prima dell'apertura, svuoto la sacca in un contenitore monopaziente, disinfetto il rubinetto prima di chiuderlo	Svuoto la sacca in un contenitore monopaziente, senza mai disinfettare	Svuoto la sacca direttamente nel wc del paziente	Tutte le risposte sono corrette
1578	Per trasportare gli alimenti, l'operatore sociosanitario deve:	Utilizzare camice pulito e copricapo che contenga perfettamente i capelli, avere mani pulite con unghie corte	Utilizzare solo guanti monouso	Utilizzare guanti monouso, occhiali protettivi ma non camice o copricapo	Nessuna delle risposte è corretta
1579	Per un assistito per il quale è prevista una dieta a basso residuo di scorie, è necessario :	Evitare contorni a base di verdure	Utilizzare solo verdure 100% bio	Fargli assumere solo sostanze liquide	Assumere poca frutta e molte verdure
1580	Per un paziente allettato esposto al rischio di lesioni da decubito, quale posizione può essere mantenuta per periodi più prolungati senza necessità di spostamenti?	E' indifferente in quanto nessuna posizione deve essere mantenuta per un periodo superiore alle due ore	Posizione laterale sul fianco sinistro	Posizione laterale sul fianco destro	Qualsiasi posizione ma non per più di 12 minuti
1581	Per usare le sostanze disinfettanti:	Non si deve aggiungere acqua	Sempre aggiungere acqua	Aggiungere 20 cc di acqua e 10 cc di alcool	Aggiungere 50 cc di alcool
1582	Per utilizzare le spondine del letto è necessario un atto medico prescrittivo?	Si, deve essere documentato nella cartella clinica del paziente, e può essere ammessa solo in casi strettamente necessari e motivati.	No mai	Si , senza documentare nulla in cartella	Nessuna risposta è corretta
1583	Prima della sterilizzazione i ferri chirurgici utilizzati devono essere:	Decontaminati e poi puliti	Ordinare all'infermiere di pulirli	Lavarli con solo acqua ossigenata	Sterilizzarli solo con Alcool
1584	Prima di essere posizionato il termometro clinico a mercurio deve essere scosso per far abbassare la colonna di mercurio al di sotto di:	35°C	30°C	34°C	32°C
1585	Prima di indossare una mascherina monouso bisogna:	Lavarsi le mani	Tagliare la barba con lame affilate	Utilizzare guanti monouso e occhiali protettivi	Coprire il viso con pomate di glicerina
1586	Per la misurazione della temperatura, quanto va tenuto il termometro clinico di vetro a mercurio sotto l'ascella ?	5-7 minuti	1-2 minuti	4-7 minuti	8-10 minuti
1587	Prima di procedere alla rilevazione del polso è opportuno invitare e/o aiutare la persona assistita ad assumere la posizione supina e a posizionare l'avambraccio sul torace o lungo il fianco con:	Il polso esteso ed il palmo verso il basso	Il polso curvo e il palmo verso l'alto	Il polso esteso ed il palmo verso l'alto	Nessuna delle risposte è corretta
1588	Prima di procedere alla rilevazione del polso è opportuno invitare e/o aiutare la persona assistita ad assumere la posizione supina e a posizionare l'avambraccio sul torace o lungo il fianco:	Con il polso esteso ed il palmo verso il basso	Con il polso curvo ed il palmo verso l'alto	Con il polso esteso ed il palmo verso l'alto	Tutte le risposte sono corrette
1589	Prima di procedere alla rilevazione del polso è opportuno invitare la persona assistita ad assumere la posizione supina e a posizionare l'avambraccio sul torace o lungo il fianco con:	Il polso esteso ed il palmo verso il basso	Il polso curvo ed il palmo verso il basso	Il polso esteso ed il palmo verso l'alto	Nessuna delle risposte è corretta
1590	Qual è il comportamento corretto dell'OSS nella vestizione di una persona con disabilità parzialmente autonoma?	Aiutare la persona solo nei gesti che gli riescono difficili, coinvolgendolo e incoraggiandolo	Chiamare l'infermiere e far aiutare il paziente	Ordinare al medico di visionare la procedura di vestizione effettuata dall'OSS	Nessuna delle risposte è corretta
1591	Qual è il materiale necessario per la cura della salma?	Teli, acqua e detergente, guanti monouso, paravento, garze e cotone, contenitore per rifiuti	Mascherine monouso e camici riutilizzabili	Teli riutilizzabili, alcool e detergente , contenitore per rifiuti	Nessuna delle risposte è corretta
1592	Qual è il primo intervento assistenziale in un utente incosciente con emesi?	Garantire la posizione di sicurezza	Ordinare all'infermiere di chiamare un medico	Posizionare un paziente su una sedia a rotelle e portarlo di corsa dal medico di turno	Tutte le risposte sono corrette
1593	Qual è il primo sentimento che l'operatore sanitario deve trasmettere al paziente?	Fiducia	Diffidenza	Sospetto	Tutte le risposte sono corrette
1594	Qual è la corretta modalità di raccolta del campione di urine per urinocoltura?	Igiene delle mani, pulizia dei genitali, contenitore sterile, urine del mitto intermedio	Pulizia dei genitali, contenitore sterile, urine del mitto intermedio, igiene delle mani	Ordinare all'infermiere di effettuare la procedura	Nessuna delle risposte è corretta
1595	Qual è la corretta modalità di raccolta del campione di urine per urocultura?	Pulizia dei genitali, mani lavate, contenitore sterile, urine del mitto intermedio	Mani lavate, contenitore non sterile, urine del mitto intermedio	L'esame viene richiesto dal medico di base ed è effettuato esclusivamente da esso	Ordinare all'infermiere di effettuare la procedura

1596	Qual è la corretta posizione delle gambe in un soggetto in posizione prona?	Devono essere lievemente abdotte	Devono essere estese in modo eccessivo le gambe	Il paziente possibilmente deve rimanere in piedi	L'oss deve ordinare al medico di far assumere al paziente la posizione corretta
1597	Qual è la corretta sequenza delle procedure preliminari alla sterilizzazione?	Disinfezione, detersione, risciacquo, asciugatura, confezionamento	Risciacquo, detersione, asciugatura, confezionamento	Disinfezione, risciacquo, confezionamento	Nessuna delle risposte è corretta
1598	Qual è la cosa migliore da fare quando un paziente chiede da molti giorni di bere tantissima acqua?	Avvisare il capo sala/reparto	Somministrare una dose di insulina	Ordinare al medico di aiutare il paziente	Diminuire drasticamente le dosi di acqua del paziente
1599	Qual è la giusta posizione per una persona a cui si deve praticare una rianimazione cardiopolmonare?	Supina su parti rigide	Con le ginocchia piegate e la schiena rigida	Sdraiato su un fianco , possibilmente quello destro	Sdraiato su un fianco , possibilmente quello sinistro
1600	Qual è la giusta sequenza delle fasi della "catena della sopravvivenza"?	Riconoscimento e allarme precoci; BLS precoce; defibrillazione precoce; soccorso avanzato precoce	Riconoscimento e allarme precoci, defibrillazione precoce, soccorso avanzato precoce, BLS precoce	Soccorso avanzato precoce, defibrillazione precoce, BLS precoce, riconoscimento e allarme precoci	Non esistono sequenze specifiche
1601	Qual è la posizione corretta da far assumere a un paziente incosciente che vomita?	Posizione laterale di sicurezza	Far posizionare il paziente sulle ginocchia col capo in avanti	Sdraiato su un letto	Supina su parti rigide
1602	Qual è la posizione più adatta del paziente per la nutrizione tramite sondino?	Semiseduto con la testa sollevata	Semiseduto con il capo chino	Con le ginocchia piegate e la schiena rigida	Sdraiato su un letto
1603	Qual è la posizione più idonea in cui deve essere tenuto un bambino che presenta difficoltà respiratorie?	Posizione semiseduta	Posizione seduta	Sdraiato su un lato	Posizione laterale di sicurezza
1604	Qual è la posizione più idonea in cui deve essere tenuto un paziente che presenta difficoltà respiratorie?	Posizione semiseduta	Posizione laterale di sicurezza	Con le ginocchia piegate e la schiena rigida	Sdraiato sul lato sinistro
1605	Qual è la posizione più opportuna da far assumere al paziente per la somministrazione dell'enteroclisma?	Posizione di decubito laterale sinistro con ginocchio destro flesso	Posizione di decubito laterale destro con ginocchio sinistro flesso	Posizione semiseduta	In piedi con la schiena leggermente piegata
1606	Qual è la prima cosa da fare in caso di folgorazione?	Allontanare l'infortunato dalla corrente con l'ausilio di materiale isolante	Ordinare al medico di allontanare il paziente folgorato	Con dispositivi di protezione allontanare velocemente il paziente con l'aiuto dell'infermiere senza l'ausilio di materiale isolante	Nessuna delle risposte è corretta
1607	Qual è la temperatura ottimale dell'acqua utilizzata per il bagno del degente ?	38°C	40°C	39°C	45°C
1608	Qual è la zona del muscolo deltoide utile per la somministrazione farmacologica per via intramuscolare?	La parte centrale della faccia laterale del braccio	La parte laterale della faccia centrale del braccio	Ordinare al medico di somministrare il farmaco	Nessuna delle risposte è corretta
1609	Qual è l'obiettivo del BLS?	Ritardare l'insorgenza del danno anossico cerebrale in un soggetto privo di coscienza, respiro e circolo	Interrompere le manovre di rianimazione	Trascurare la qualità delle compressioni toraciche	Ignorare l'emergenza
1610	Quale alimento, tra i seguenti, non è opportuno proporre ad un paziente disfagico?	Pastina in brodo	Purea di verdure	Yogurt e budino	Tutte le risposte sono corrette
1611	Quale aspetto è prioritario nel trasferimento dalla sedia al letto di una persona parzialmente autosufficiente?	Garantire la sicurezza della persona in modo che non cada	Completare nel modo più rapido il passaggio dalla sedia al letto	Permettere al paziente di effettuare il passaggio in autonomia	Nessuna delle risposte è corretta
1612	Quale attività NON può essere svolta dall'OSS?	La somministrazione della terapia endovenosa	Vestizione deambulazione	Somministrazione pasti	Eliminazione urinaria e fecale
1613	Quale azione è corretta quando si usa il sollevatore:	Le fasce di sostegno vanno posizionate sotto il paziente	Le fasce di sostegno vanno posizionate sopra il paziente	Le fasce di sostegno vanno posizionate di fianco al paziente	Nessuna delle risposte è corretta
1614	Quale degli attrezzi indicati di seguito è utilizzato per prevenire le ulcere da decubito?	Ciambella ad aria	Sedia a rotelle	Bisturi	Tutte le risposte sono corrette
1615	Quale dei seguenti comportamenti deve mettere in pratica l'OSS che assiste una persona nella deambulazione?	Deve lasciare che sia il paziente a fare l'andatura	L'OSS sempre e comunque decide l'andatura	Ordinare al medico di farsi aiutare	Nessuna delle risposte è corretta
1616	Quale dei seguenti materiali va smaltito nei rifiuti speciali?	Sondini nasogastrici	Teli monouso	Vetro	Tetrapak
1617	Quale dei seguenti non è un comportamento opportuno in caso di congelamento?	Frizionare le zone congelate con acqua calda	Si deve riscaldare il tessuto congelato il più presto possibile in un bagno d'acqua calda che sia tollerabile al tatto (da 37 a 39° C); la somministrazione di analgesici è solitamente necessaria.	Si deve evitare lo scongelamento e il ricongelamento.	Le aree colpite devono essere mantenute scoperte, pulite, asciutte e sollevate.
1618	Quale delle seguenti affermazioni corrisponde in modo corretto al concetto di dieta equilibrata?	La ripartizione dei nutrienti deve essere proporzionata e l'assunzione di alimenti nell'arco della giornata deve essere correttamente distribuita	Alimenti ad alto contenuto di grassi saturi	Cibi e bevande ad alto contenuto di zucchero	Non esiste un concetto di dieta equilibrata
1619	Quale delle seguenti affermazioni NON è corretta a proposito del catetere vescicale?	È il sistema più indicato per la semplice incontinenza urinaria e per la prevenzione dei decubiti	Il cateterismo vescicale è una procedura medica in cui si adoperano dei cateteri per svuotare la vescica dall'urina.	Può essere utilizzato da chi non può recarsi in bagno perché infermo	Può essere utilizzato da chi soffre di una momentanea occlusione dell'uretra
1620	Quale delle seguenti affermazioni non è corretta circa le misure da adottare per prevenire le lesioni da decubito?	Evitare di cambiare spesso la posizione del paziente allettato per evitare trazioni o sfregamenti che possono danneggiare il derma	Utilizzo di materassi e cuscini appropriati	Controllo dell'umidità e dell'igiene: Mantenere la pelle pulita, asciutta e ben idratata	Alimentazione adeguata , mobilitazione e attività fisica

1621	Quale delle seguenti affermazioni sul lavaggio sociale delle mani è corretta?	Prevede che non venga effettuato con anelli, bracciali e orologi	Non è importante lavarsi le mani frequentemente	Basta passare velocemente le mani sotto l'acqua per pulirle	Non c'è bisogno di lavarsi le mani dopo aver toccato solo oggetti apparentemente puliti
1622	Quale delle seguenti affermazioni sulla raccolta dei campioni di escreato NON è corretta?	La raccolta dei campioni dovrebbe essere effettuata dopo la terapia antimicrobica	Assicurarsi che il paziente non abbia mangiato, bevuto, fumato o utilizzato alcun tipo di prodotto per l'igiene orale almeno 30 minuti prima della raccolta del campione.	Esistono diversi modi per raccogliere il escreato.	Una volta raccolto, il campione deve essere conservato in un contenitore sterile e chiuso ermeticamente per evitare la contaminazione.
1623	Quale delle seguenti azioni è corretta nell'effettuare l'igiene degli occhi?	Detergere gli occhi procedendo dall'interno verso l'esterno, senza ripassare mai dallo stesso punto	Utilizzare oggetti appuntiti o taglienti per rimuovere qualcosa dall'occhio	Utilizzare salviette o fazzoletti sporchi	Non importante avere cura dell'igiene degli occhi
1624	Quale delle seguenti azioni è estranea all'attività di lavaggio dei genitali maschili?	Pulire il glande dalla base al meato urinario	Pulire delicatamente: Utilizzare le mani per pulire delicatamente l'area genitale.	Prestare attenzione alla pulizia sotto il prepuzio	Asciugare accuratamente: Dopo aver lavato l'area genitale
1625	Quale delle seguenti manovre è maggiormente causa nel determinare una infezione ospedaliera?	Inserire un catetere urinario	Smaltire in modo sicuro i rifiuti biologici e medici	Sterilizzazione e disinfezione degli strumenti	Tutte le risposte sono corrette
1626	Quale delle seguenti non costituisce una delle regole a cui l'operatore socio sanitario deve attenersi nella raccolta delle feci?	Assicurarsi che il paziente abbia avuto una adeguata alimentazione prima della raccolta delle feci	Utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati, come guanti monouso, camici protettivi e mascherine	Lavaggio accurato delle mani prima e dopo la manipolazione delle feci, utilizzando acqua e sapone o soluzioni disinfettanti	Rispetto della dignità e della privacy del paziente durante la raccolta delle feci
1627	Quale delle seguenti prestazioni possono essere affidate all'OSS?	Sterilizzazione dei ferri chirurgici in sala operatoria	Prescrivere farmaci	Procedure mediche invasive	Interpretare esami diagnostici complessi
1628	Quale deve essere il tasso ottimale di umidità nella stanza di un paziente?	Fra il 30 e il 60%	Fra il 30 e il 50%	Fra il 20 e il 40%	Fra il 40 e il 70%
1629	Quale deve essere la temperatura ottimale della stanza di un malato?	Tra 18 e 25° C	Tra i 18 e 22°C	Tra 20 e 25°C	Nessuna delle risposte è corretta
1630	Quale di queste affermazioni riferite al paziente portatore di catetere vescicale è ERRATA?	Il sacchetto in mancanza di supporto può essere posto a terra	Il catetere vescicale è un tubo sottile che viene inserito attraverso l'uretra nella vescica per drenare l'urina in modo controllato.	Ci sono diversi tipi di cateteri vescicali	È importante seguire le raccomandazioni del medico riguardo all'utilizzo e alla cura del catetere per prevenire complicazioni come le infezioni del tratto urinario e garantire il benessere del paziente.
1631	Quale di queste azioni è specifica e prioritaria nel posizionamento di un soggetto emiplegico?	L'arto plegico va posizionato su un cuscino	L'arto plegico non va posizionato su un cuscino	Trasferimento del paziente in un ambiente esterno	Estetica del posizionamento
1632	Quale di questi interventi assistenziali rivolti all'anziano con stipsi, è da ritenersi scorretto?	L'apporto di liquidi va contenuto	Assicurarsi che l'anziano riceva una dieta ricca di fibre, frutta, verdura e cereali integrali può favorire il regolare transito intestinale.	Attività fisica	Mantenere una regolare routine intestinale può essere utile. Ad esempio, incoraggiare l'anziano a provare ad evacuare la mattina dopo la colazione
1633	Quale disinfettante, tra i seguenti, viene utilizzato per la disinfezione delle mani senza acqua?	Alcol etilico	Acqua ossigenata	Ibuprofene	Tutte le risposte sono corrette
1634	Quale fra le seguenti affermazioni sulla misurazione della temperatura corporea non è corretta?	Il sito orale è indicato nelle persone che respirano attraverso la bocca	E' misurabile con termometri a distanza	Esistono diversi modi per misurare la temperatura corporea	Tutte le risposte sono corrette
1635	Quale fra le seguenti manovre è indicata per prevenire lo sviluppo di infezioni alle vie urinarie nel paziente portatore di catetere vescicale?	Utilizzare un sacchetto di raccolta sterile, munito di apposita valvola per lo svuotamento	Irrigazione sistematica della vescica	Utilizzo di lubrificanti non sterili o irritanti durante l'inserimento del catetere	Uso prolungato di cateteri a permanenza
1636	Quale fra le seguenti manovre può contaminare una soluzione disinfettante?	Lasciare aperta la confezione dopo l'uso	Mani pulite	Diluizione corretta	Utilizzo di guanti
1637	Quale intervento assistenziale è di competenza dell'OSS nel caso di un paziente con colostomia?	Applicazione della placca e del sacchetto per la raccolta delle feci	Gestione di una vasta gamma di complicanze associate alla colostomia	Valutazione e decisioni chirurgiche	Regolazione dei farmaci
1638	Quale manovra risulta scorretta nell'esecuzione della procedura per la pulizia della cute peristomale?	Utilizzare un disinfettante	Applicare una barriera cutanea o una crema protettiva sulla pelle peristomale per proteggerla dall'irritazione e dalla formazione di lesioni cutanee.	Segnalare al personale sanitario qualsiasi anomalia.	Prima di iniziare la procedura, lavarsi sempre accuratamente le mani con acqua e sapone per ridurre il rischio di contaminazione
1639	Quale manovra si esegue per prima in un soggetto che ha un'ostruzione delle vie aeree completa?	5 colpi dorsali in regione interscapolare	Controllare accuratamente la bocca e la gola del paziente per assicurarsi che le vie respiratorie siano completamente libere	Valutare la respirazione del paziente.	Tutte le risposte sono corrette
1640	Quale metodica va seguita per la medicazione di una ferita asettica?	La medicazione deve essere eseguita partendo dal centro della ferita sino alla sua periferia	Indossare guanti non sterili	Pulire la ferita con alcool etilico	Tutte le risposte sono corrette
1641	Quale metodo di pulizia prevede anche l'uso del MOP?	Pulizia con mezzi meccanici	Pulizia manuale	Non esistono metodi di pulizia	Nessuna delle risposte è corretta
1642	Quale posizione è preferibile far assumere ad un paziente cui deve essere praticato un clistere?	Decubito laterale sinistro	Decubito laterale destro	Posizione Supina	Posizione prona
1643	Quale procedura deve essere adottata nel caso in cui le confezioni di garza sottoposte a processo di sterilizzazione si presentano umide?	Distuggere le confezioni	Porre le garze umide al sole	Aspettare che si asciugino naturalmente prima di utilizzarle con i pazienti	Nessuna delle risposte è corretta
1644	Quale tessuto è più adatto per le lenzuola del letto del malato?	Cotone	Seta	Raso	Flanella
1645	Quale tra le condizioni di seguito riportate NON influisce in modo positivo sul processo di cicatrizzazione di una ferita?	La temperatura fredda	Mantenere la ferita pulita e sterile	Una dieta equilibrata e ricca di nutrienti	Evitare comportamenti nocivi come il fumo e l'eccessivo consumo di alcol

1646	Quale tra le seguenti affermazioni relative alla raccolta delle urine nelle 24 ore NON è corretta?	È necessario terminare la raccolta con le seconde urine del mattino successivo	Raccogliere il campione di urine in un contenitore sterile	Conservare il campione di urine in modo appropriato fino al momento del trasporto al laboratorio o alla struttura sanitaria.	Prima di iniziare la raccolta delle urine, lavarsi sempre accuratamente le mani
1647	Quale tra le seguenti alternative relative alle compressioni toraciche durante il BLS-D è corretta perché siano efficaci?	È necessario comprimere il torace a una profondità di circa 5 cm ma senza superare i 6 cm per un adulto medio	È necessario comprimere il torace a una profondità di circa 15 cm ma senza superare i 16 cm per un adulto medio	È necessario comprimere il torace a una profondità di circa 3 cm ma senza superare i 4 cm per un adulto medio	Nessuna delle risposte è corretta
1648	Quale tra le seguenti attività l'OSS può eseguire in autonomia e su indicazione dell'infermiere?	La rilevazione dei parametri vitali nel paziente	Gestione di terapie avanzate o invasive	Somministrazione di farmaci per via endovenosa o intramuscolare	Gestione delle emergenze mediche
1649	Quale tra le seguenti indicazioni deve essere fornita alla persona prima della deambulazione assistita?	Mantenere la posizione eretta guardando avanti	Rimanere sdraiati ed attendere il medico	Ordinare all'infermiere di far assumere la posizione corretta al paziente	Nessuna delle risposte è corretta
1650	Quale, fra i seguenti atteggiamenti, è più appropriato assumere con il paziente che non si alimenta autonomamente?	Alla persona va fornito incoraggiamento e sostegno	Forzare il paziente a mangiare	Alimentare il paziente velocemente	Alimentare il paziente in posizione supina
1651	Quale, tra i seguenti alimenti, non deve essere scelto per un soggetto con difficoltà di deglutizione?	Brodo e minestrina	Pasta e riso cotti al dente	Pollo, pesce o carne tritata	Puree di frutta e verdura
1652	Quale, tra i seguenti alimenti, non deve essere scelto per un soggetto con difficoltà di masticazione?	Frutta secca	Frutta morbida	Verdure cotte	Legumi schiacciati o in purea
1653	Quale, tra le seguenti, è la regola di lavaggio comune a tutti i tipi di lavaggio	Usare acqua tiepida, la durata del lavaggio, risciacquare bene le mani, asciugare bene le mani con salviette monouso	Usare acqua calda a temperatura vicino i 40°, risciacquare bene le mani, asciugare bene le mani con salviette monouso	Non vi è alcuna regola	Nessuna delle risposte è corretta
1654	Quali accortezze bisogna utilizzare quando si trasportano bombole contenenti ossigeno?	Utilizzare appositi carrelli, mantenerle in posizione verticale e fissarle con cinghie	Trasportare le bombole contenenti ossigeno nel modo più rapido possibile	Assicurarsi che le bombole di ossigeno siano posizionate in modo orizzontale e poco stabile	Tutte le risposte sono corrette
1655	Quali alimenti, tra i seguenti, sono da evitare nella persona con difficoltà nella deglutizione?	Alimenti fibrosi	Yogurt e gelatine	Pollo, pesce o carne tritata	Prodotti lattiero-caseari morbidi
1656	Quali aspetti generali devono essere tenuti presenti dagli operatori per la cura e l'igiene delle mani?	Unghie corte, non deve essere usato smalto, non portare anelli, bracciali e orologio da polso, cute idratata, medicare o coprire ferite o abrasioni	Non usare mai il sapone	Non pulire accuratamente sotto le unghie	Tutte le risposte sono corrette
1657	Quali caratteristiche deve avere il bastone usato per la deambulazione?	Impugnatura comoda, gomma antiscivolo nell'estremità inferiore e altezza di quattro dita sopra la linea del polso	Impugnatura instabile e assenza di punta antiscivolo	Bastone pesante in modo da essere ben saldo a terra	Non esistono bastoni per la deambulazione
1658	Quali caratteristiche deve avere un'alimentazione equilibrata in una persona sana ?	Normocalorica e variata	Carne 6 giorni su 7	Cibi ad alto contenuto di zuccheri aggiunti	Dieta monotona e limitata
1659	Quali dei seguenti accorgimenti aiuta a prevenire la costipazione nell'anziano:	Dieta ricca di liquidi, vitamine della frutta e vegetali	Cibi ad alto contenuto di zuccheri aggiunti	Dieta monotona e limitata	Tutte le risposte sono corrette
1660	Quali comportamenti adotto se, accidentalmente, nel corridoio di un reparto di oncologia, si ha la rottura di una sacca contenente farmaco citotossico?	Copro con qualsiasi mezzo (lenzuolo, telino) il farmaco disperso, invito tutti i presenti a rientrare nelle proprie camere e chiudere le porte, utilizzo, in collaborazione del personale infermieristico, il kit di emergenza per la dispersione di chemioterapici	Mi avvicino immediatamente al liquido fuoriuscito senza precauzioni	Ignoro la segnalazione dell'incidente	Ordino immediatamente al medico di provvedere alla pulizia del corridoio
1661	Quali delle seguenti caratteristiche occorre attenzionare per valutare la normalità della funzione urinaria?	Quantità, limpidezza, colore, odore	Limpidezza ed odore	Esclusivamente il colore	Nessuna delle risposte è corretta
1662	Quali di queste azioni l'OSS non deve compiere nell'assistere un bambino disfagico?	Evitare, se il paziente necessita di essere imboccato, di continuare nella manovra, se si verificano problemi o difficoltà, come tosse, cianosi, o altri segni di soffocamento	Assistenza durante i pasti	Monitoraggio dell'assunzione di liquidi	Seguire le indicazioni del personale sanitario
1663	L'OSS addetto al trasporto di materiale biologico:	esegue questo compito nel rispetto di disposizioni specifiche nel più breve tempo possibile	esegue questo compito nel rispetto di disposizioni specifiche nel più lungo tempo possibile	esegue questo compito nel rispetto di disposizioni generali	esegue questo compito nel rispetto di disposizioni nel regolamento europeo nel più breve tempo possibile
1664	L'OSS che assiste il paziente disfagico durante il pasto deve prestare attenzione alla comparsa di:	tosse	dolori muscolari	perdita di capelli	anemia
1665	L'OSS durante l'assistenza dei pazienti con deambulazione deve aiutarlo a sedersi:	sulla poltrona o sul letto	su una sedia solo dopo aver pranzato	sul letto dopo 4 ore di allenamento	sulla poltrona esclusivamente nelle ore serali
1666	L'OSS durante l'assistenza dei pazienti con deambulazione deve assicurarsi che indossino:	scarpe ben comode, possibilmente chiuse o allacciate	scarpe poco comode, possibilmente chiuse o allacciate	scarpe comode, possibilmente aperte	scarpe comode
1667	L'OSS durante l'attività di mobilizzazione, deve:	coinvolgere il paziente cercando di stimolare le funzioni residue	non coinvolgere il paziente	effettuare movimenti veloci ed incisivi	indurre il paziente a lavarsi da solo
1668	L'OSS in base alle sue competenze può miscelare una soluzione disinfettante a base di clorexidina con una soluzione a base di ammoniacca?	Non può effettuare tale miscela poiché sprigionerebbe gas tossici	Si, può farlo	Si, può farlo solo in determinati casi	Si, può farlo in determinati orari

1669	L'OSS nel controllare la presenza degli accessori del letto, verifica che nella stanza ci siano:	spondine, archetti, staffa	acqua e fette biscottate	le lenzuola 100% cotone	Nessuna delle altre risposte è corretta
1670	L'OSS nel rifare il letto deve:	maneggiare il meno possibile le lenzuola usate	maneggiare il più possibile le lenzuola usate	odorare le lenzuola usate	maneggiare il meno possibile le lenzuola pulite
1671	L'OSS per la persona con colostomia, che attività svolge?	Applicazione di sacchetto per la raccolta delle feci	Analisi delle feci	Prelievo del sangue	Analisi del colore e della composizione delle feci
1672	L'OSS per mettere un bambino emiplegico in carrozzina deve:	affiancare la carrozzina al letto e stimolare l'utente a trasferirsi sulla carrozzina	affiancare la carrozzina al letto, in seguito il bambino emiplegico si siederà in autonomia sulla carrozzina	guardare se il bambino emiplegico si siede sulla carrozzina nel modo corretto	allontanare la carrozzina al letto e stimolare l'utente a trasferirsi sulla carrozzina
1673	L'OSS può eseguire l'igiene al paziente portatore di catetere vescicale?	Sì, sempre	No, mai	Sì, solo in alcuni casi	Dipende dall'età del paziente
1674	L'OSS si occupa in piena autonomia delle medicazioni:	semplici	avanzate	articolate	fisse
1675	L'OSS si occupa:	delle medicazioni semplici	delle medicazioni avanzate	delle medicazioni articolate	delle medicazioni fisse
1676	L'OSS, davanti ad una persona con crisi epilettica deve:	Fare in modo che non si ferisca durante la fase convulsiva, senza contenerla	Aspettare che la crisi epilettica termini e poi intervenire	Tenerle le braccia congiunte	Nessuna delle altre risposte è corretta
1677	L'OSS, dinanzi ad una persona con crisi epilettica deve:	fare in modo che non si ferisca durante la fase convulsiva, senza contenerla	Aspettare che la crisi epilettica termini e poi intervenire	Tenerle le palpebre degli occhi aperte	Nessuna delle altre risposte è corretta
1678	L'OSS, un paziente diabetico, può consigliare di avere cura dei suoi piedi:	utilizzando calze morbide e senza cuciture e scarpe comode	utilizzando calze morbide e senza cuciture e scarpe scomode	utilizzando calze morbide con cuciture e scarpe scomode	utilizzando scarpe di determinati marchi
1679	L'uso dei guanti sostituisce il lavaggio delle mani?	No	Sì	Quasi sempre	Solo in alcuni casi
1680	L'utilizzo appropriato della mascherina chirurgica al termine dell'assistenza ad un paziente infetto prevede di:	indossarla coprendo naso e bocca e rimuoverla prendendola dai lacci posti sul capo o dagli elastici dietro alle orecchie	indossarla coprendo naso e bocca e rimuoverla prendendola dal tessuto in corrispondenza della bocca	indossarla coprendo solo la bocca e rimuoverla prendendola dai lacci posti sul capo o dagli elastici dietro alle orecchie	indossarla coprendo solo il naso e rimuoverla prendendola dai lacci posti sul capo o dagli elastici dietro alle orecchie
1681	L'utilizzo dei guanti è una misura:	aggiuntiva al lavaggio delle mani	non necessaria	aggiuntiva poiché non sempre vengono lavate le mani	utilizzata solo in alcuni reparti ospedalieri
1682	L'utilizzo dei guanti:	è corretto quando si prevede il contatto con sangue o altri materiali potenzialmente infetti, mucose, cute non integra o potenzialmente contaminata	non è corretto quando si prevede il contatto con sangue o altri materiali potenzialmente infetti, mucose, cute non integra o potenzialmente contaminata	è corretto quando non si prevede il contatto con sangue ma solo con altri materiali potenzialmente infetti, mucose, cute non integra o potenzialmente contaminata	non è mai corretto
1683	Nei metodi di trasferimento manuali del paziente si utilizzano:	la forza muscolare degli operatori e, se possibile, la capacità di movimento residua del paziente	esclusivamente macchinari specifici	solo dei lettini	la forza muscolare del paziente
1684	Nei pazienti portatori di sondino nasale per ossigeno terapia, la pulizia del naso deve avere frequenza:	in base al protocollo del reparto	frequenza giornaliera	frequenza mensile	frequenza assoluta
1685	Nei pazienti portatori di sondino nasale per ossigenoterapia, la frequenza della pulizia del naso deve essere:	in base al protocollo del reparto	frequenza giornaliera	frequenza mensile	frequenza assoluta
1686	Nei soggetti con difficoltà relative alla deglutizione, la scelta degli alimenti deve essere effettuata in base a:	consistenza e omogeneità	gusto del paziente	sapore	consistenza e limpidezza
1687	Nei trasferimenti di una persona emiplegica si deve evitare di:	trazionare la spalla emiplegica	sollevare il braccio plegico in alto	flettere l'avambraccio sul braccio	mobilizzare la spalla emiplegica
1688	Nei traumi chiusi addominali quali sono gli organi più frequentemente interessati?	Fegato e milza	Tibia e femore	Tallone del piede	Duodeno e pancreas
1689	Nel BL-SD, se la vittima respira normalmente bisogna:	collocarla in posizione laterale di sicurezza e chiamare i soccorsi	tranquillizzarla	collocarla in posizione supina di sicurezza e chiamare i soccorsi	collocarla in posizione prona di sicurezza e chiamare i soccorsi
1690	Nel caso di contatto accidentale con materiale biologico che tipo di lavaggio deve effettuare l'OSS?	Il lavaggio antisettico	Il lavaggio con detergente neutro	Il lavaggio con solo acqua	Nessun tipo di lavaggio
1691	Nel caso di contatto con materiale biologico, che tipo di lavaggio deve effettuare l'OSS?	Il lavaggio antisettico	Il lavaggio con solo acqua	Nessun tipo di lavaggio	Il lavaggio con detergente neutro
1692	Nel caso di paziente parzialmente autosufficiente e costretto a letto per la somministrazione del cibo e assistenza ai pasti, l'OSS come prima cosa deve:	consentire al malato di assumere una posizione comoda, alzando la testata del letto o servendosi dei cuscini	consentire al malato di assumere una posizione scomoda, alzando la testata del letto o servendosi dei cuscini	cucinare un pasto leggero	Nessuna delle altre risposte è corretta
1693	Nel caso di paziente parzialmente autosufficiente e costretto a letto per la somministrazione del cibo e assistenza ai pasti, l'OSS come ultima cosa deve:	compiere tutte le azioni utili a favorire il riposo post-prandiale	consentire al malato di assumere una posizione comoda, alzando la testata del letto o servendosi dei cuscini	compiere tutte le azioni utili a favorire il riposo pre-prandiale	compiere tutte le azioni non utili a favorire il riposo post-prandiale
1694	Nel caso di persone anziane istituzionalizzate, a rischio di insorgenza di uno stato confusionale, non è opportuno:	predisporre un ambiente con luci soffuse in modo che il letto sia in penombra	sottoporre l'anziano ad una visita medica	portare l'anziano al pronto soccorso	rassicurare il soggetto con voce calma e tono basso
1695	Nel caso di un paziente con ipertensione, quale parametro deve essere rilevato?	La temperatura corporea	Colesterolo alto	Urine torbide	Piastrine basse
1696	Nel caso di un soggetto con catetere vescicale a permanenza, è opportuno:	adottare un sistema di drenaggio delle urine a circuito chiuso	adottare un sistema di drenaggio delle urine a circuito aperto	non adottare un sistema di drenaggio delle urine a circuito chiuso	adottare un sistema di drenaggio delle urine senza l'utilizzo di guanti

1697	Nel caso di una persona con crisi epilettica, l'O.S.S. deve:	fare in modo che non si ferisca durante la fase convulsiva, senza contenerla	Aspettare che la crisi epilettica termini e poi intervenire	Tenerle le braccia congiunte	Nessuna delle altre risposte è corretta
1698	Nel caso in cui le confezioni di garza sottoposte a processo di sterilizzazione si presentano umide, quale procedura deve essere adottata?	Distruggere le confezioni	Asciugarla accuratamente con il phon	Effettuare il reso delle confezioni danneggiate	Distruggere solo le garze che si presentano meno umide
1699	Nel caso in cui l'infermiere chieda aiuto per gestire la somministrazione dei farmaci agli assistiti, l'OSS può:	aiutare l'assistito ad assumere il farmaco per via orale	somministrare della morfina al paziente	rifiutarsi di aiutare l'infermiere	non aiutare l'assistito ad assumere il farmaco per via orale
1700	Nel caso in cui si verifichi una 'emergenza clinica' è possibile chiedere farmaci stupefacenti ad un altro reparto?	Si, ma occorre redigere una richiesta firmata dal medico	Si	No non possibile chiedere farmaci stupefacenti ad altri reparti	Dipende dalla gravità dell'emrgenza clinica
1701	Nel caso in cui un parente chiede notizie su un paziente ricoverato nel vostro reparto, l'OSS:	lo indirizza dal medico o al caposala o all'infermiere	non è tenuto a prestare supporto ai parenti del paziente	lo indirizza esclusivamente dal medico	lo indirizza esclusivamente dall'infermiere
1702	Nel caso in cui un paziente rifiuti l'assunzione degli alimenti, l'OSS deve:	Informare l'infermiere e chiedere indicazioni di comportamento	Ordinare al medico di prescrivere al paziente una flebo	Non informare l'infermiere e chiedere indicazioni di comportamento	Redigere una lettera di richiamo indirizzata al direttore sanitario
1703	Nel caso l'infermiere assegni all'OSS l'effettuazione di un'iniezione sottocutanea, l'OSS deve sempre:	rifiutare la prestazione	eseguire la prestazione	chiedere il consenso scritto ad un parente	spalmare una pomata abrasiva prima dell'iniezione sottocutanea
1704	Nel caso l'infermiere assegni all'oss l'effettuazione di un'iniezione sottocutanea, l'oss deve:	rifiutare la prestazione	eseguire la prestazione	chiedere il consenso scritto ad un parente	spalmare una pomata abrasiva prima dell'iniezione sottocutanea
1705	Nel caso L'OSS nell'ambito dell'attività di igiene personale al paziente non autosufficiente o allettato rileva che la zona sacro-coccigea è arrossata deve:	informare l'infermiere, e applica una crema barriera senza massaggiare	nascondere l'accaduto all'infermiere, e applica una crema barriera senza massaggiare	applicare una pomata abrasiva prima di effettuare un massaggio	informare l'infermiere, e applica una crema barriera con relativo massaggio
1706	Nel caso L'OSS nell'ambito dell'attività di igiene personale al paziente non autosufficiente o allettato rileva che la zona sacro-coccigea è arrossata:	informa l'infermiere, e applica una crema barriera senza massaggiare	applicare una pomata abrasiva prima di effettuare un massaggio	informare l'infermiere, e applica una crema barriera con relativo massaggio	nascondere l'accaduto all'infermiere, e applica una crema barriera senza massaggiare
1707	Nel caso l'OSS si punge accidentalmente il dito con ago contaminato, esiste il rischio di contagio?	Il rischio di contrarre il virus dell'epatite C in seguito a puntura con ago contaminato sono basse	Il rischio di contrarre il virus dell'epatite C in seguito a puntura con ago contaminato sono alte	Il rischio di contrarre il virus dell'epatite A in seguito a puntura con ago contaminato sono basse	Il rischio di contrarre il virus dell'epatite E in seguito a puntura con ago contaminato sono basse
1708	Nel caso un paziente segnali dolorabilità come si deve comportare l'OSS?	Effettua la segnalazione all'infermiere/caposala	Non effettua la segnalazione all'infermiere/caposala	Somministra un farmaco senza avvertire prima l'infermiere o il caposala	Prescrive una dieta ipocalorica
1709	Nel controllare la presenza degli accessori del letto, l'OSS verifica che nella stanza ci siano:	spondine, archetti, staffa	acqua e fette biscottate	esclusivamente le spondine	le lenzuola 100% cotone
1710	Nel controllare la presenza degli accessori del letto, l'OSS:	verifica che nella stanza ci siano spondine, archetti, staffa	acqua e fette biscottate	esclusivamente la staffa	le lenzuola 100% cotone
1711	Nel corso della mobilizzazione di un assistito in letto:	Deve essere lasciato solo un cuscino, salvo diversa e specifica indicazione dell'infermiere	Devono essere lasciati solo due cuscini, salvo diversa e specifica indicazione dell'infermiere	Deve essere lasciato solo un set di lenzuola di pura seta, salvo diversa e specifica indicazione dell'infermiere	Deve essere lasciato solo un cuscino, salvo diversa e specifica indicazione del parente
1712	Nel far indossare i pantaloni a un paziente emiplegico, l'OSS deve inserire:	prima l'arto inferiore plegico	prima l'arto superiore plegico	le scarpe comode	prima l'arto inferiore non plegico
1713	Nel lavaggio antisettico delle mani la temperatura ideale dell'acqua deve essere:	36° - 37°	26° - 27°	46° - 47°	86° - 87°
1714	Nel lavaggio dei capelli a letto il piano del letto deve essere tenuto:	il più possibile alto	il più possibile basso	obliquo verso destra	obliquo verso sinistra
1715	Nel lavaggio dei genitali femminili individuare tra le seguenti azioni quella estranea:	riposizionare il prepuzio dopo il lavaggio	lavare accuratamente con un sapone liquido la vulva	lavare accuratamente con un sapone liquido la vagina	lavare i genitali femminili con un sapone intimo
1716	Nel lavaggio delle mani, il prodotto da utilizzare può essere:	un detergente liquido	il sapone utilizzato generalmente per lavare i piatti	uno sgrassatore	la candeggina
1717	Nel lavaggio sociale delle mani, quali di questa azioni non deve essere svolta?	spazzolare le unghie con l'apposito spazzolino, per rimuovere a fondo lo sporco	lavare le mani per una durata che varia dai 40 ai 60 secondi	lavare le mani con acqua tiepida corrente	lavare le mani con un detergente liquido (sapone) erogato da dispenser con valvola unidirezionale
1718	Nel mettere in atto la procedura per l'igiene degli occhi in un paziente comatoso, quale delle seguenti azioni NON è corretta?	Eliminare l'eccesso di liquido e passare la garza sulle palpebre, procedendo dall'angolo esterno dell'occhio verso l'interno	Eliminare l'eccesso di liquido e passare la garza sulle palpebre, procedendo dall'angolo interno dell'occhio verso l'esterno	Controllo entrambi gli occhi per rilevare eventuali alterazioni: (infiammazioni, arrossamenti, secrezioni anomali, gonfiori)	Mi lavo le mani e indosso i guanti sterili
1719	Nel mobilizzare un paziente parzialmente dipendente, l'operatore sociosanitario dovrà:	utilizzare una presa prossimale e una presa distale nella mobilizzazione degli arti (es. coscia e caviglia)	utilizzare una presa non prossimale e una presa distale nella mobilizzazione degli arti (es. coscia e caviglia)	Somministra un farmaco senza avvertire prima l'infermiere o il caposala	Nessuna delle altre risposte è corretta
1720	Nel mobilizzare un soggetto con catetere vescicale, il sacchetto delle urine deve essere posizionato:	Sotto il livello della vescica	Sopra il livello della vescica	Dal medico di turno	Con la sacca delle urine sopra l'addome del paziente
1721	Nel paziente, in posizione supina, le aree corporee a maggior rischio per la formazione di lesioni da decubito sono:	regione sacrale, apofisi spinose vertebrali, spina della scapola, nuca e talloni	Dita dei piedi, apofisi spinose vertebrali, spina della scapola, nuca e talloni	regione sacrale, apofisi spinose vertebrali, spina della scapola, nuca e palpebre degli occhi	Solo regione sacrale, apofisi e spinose vertebrali
1722	Nel posizionamento del paziente sul fianco, il cuscino tra gli arti inferiori va messo sempre?	Si	No	Quasi sempre	Solo a richiesta del paziente

1723	Nel posizionamento di un soggetto emiplegico, quale tra le seguenti azioni ritieni prioritaria e specifica?	Posizionare l'arto plegico su un cuscino	Posizionare l'arto non plegico su un cuscino	Non posizionare l'arto plegico su un cuscino	Posizionare l'arto plegico su quattro cuscini
1724	Nel posizionamento di un soggetto emiplegico, quali azioni, tra le seguenti, sono prioritarie e specifiche?	Posizionare l'arto plegico su un cuscino	Posizionare l'arto non plegico su un cuscino	Non posizionare l'arto plegico su un cuscino	Posizionare l'arto plegico su quattro cuscini
1725	Nel posizionamento di una persona allettata l'oss deve:	Attuarlo in base ai protocolli del servizio	Ordinare all'infermiere come posizionare il paziente sul letto	Ordinare all'infermiere come posizionare il paziente sulla poltrona	Chiedere aiuto ad un parente per muovere il paziente allettato
1726	Nel posizionamento sul fianco, il cuscino tra gli arti inferiori va messo:	Sempre	Quasi sempre	Solo a richiesta del paziente	Mai
1727	Nel posizionare una persona allettata, l'O.S.S. deve:	seguire i protocolli del servizio	Ordinare all'infermiere come posizionare il paziente sul letto	Ordinare all'infermiere come posizionare il paziente sulla poltrona	Chiedere aiuto ad un parente per muovere il paziente allettato
1728	Nel praticare la respirazione artificiale, indicare, tra quelle elencate la metodologia più corretta.	Bocca-bocca	Bocca-Naso	Bocca-Orecchio	Naso-Bocca
1729	Nel preparare il paziente non autosufficiente e allettato, per il pasto, l'OSS:	lo pone in posizione seduta	lo pone in posizione supina	lo pone in posizione prona	lo pone in posizione allettata
1730	Nel preparare un pacco da sterilizzare, l'indicatore di sterilizzazione deve essere collocato:	all'interno della confezione	fuori dalla confezione	Vicino la confezione	Sopra la confezione
1731	Nel procedere al posizionamento di una persona allettata come deve comportarsi l'OSS?	Deve attenersi esclusivamente al protocollo di servizio	Ordinare all'infermiere come posizionare il paziente sul letto	Nessuna delle altre risposte è corretta	Chiedere aiuto ad un parente per muovere il paziente allettato
1732	Nel processo assistenziale l'analisi dei dati raccolti viene inserita:	nel piano di assistenza individualizzato	nel piano di assistenza generalizzato	nel piano di assistenza assoluto	nel piano di assistenza figurativo
1733	Nel processo di osservazione del paziente l'OSS è tenuto a comunicare al personale diplomato responsabile lo stato di coscienza dell'assistito quando:	si verificano cambiamenti rilevanti nello stesso	si verificano cambiamenti irrilevanti nello stesso	non si verificano cambiamenti rilevanti nello stesso	Nessuna delle altre risposte è corretta
1734	Nel rapporto con l'assistito, l'operatore deve:	mostrarsi comprensivo, tenendo distinti i propri sentimenti da quelli dell'assistito	mostrarsi asociale, tenendo distinti i propri sentimenti da quelli dell'assistito	mostrarsi irrispettoso, tenendo distinti i propri sentimenti da quelli dell'assistito	mostrarsi sfuggente, tenendo distinti i propri sentimenti da quelli dell'assistito
1735	Nel rifacimento del letto occupato con 2 operatori:	girare il paziente di lato, arrotolare la biancheria sotto la schiena del paziente, stendere la biancheria pulita nella parte di materasso rimasta libera	posizionare il paziente in posizione supina, arrotolare la biancheria sotto la schiena del paziente, stendere la biancheria pulita nella parte di materasso rimasta libera	posizionare il paziente in posizione seduta, arrotolare la biancheria sotto la schiena del paziente, stendere la biancheria pulita nella parte di materasso rimasta libera	girare il paziente di lato, arrotolare la biancheria sotto la schiena del paziente, stendere la biancheria usata nella parte di materasso rimasta libera
1736	Nel rifacimento del letto occupato con due operatori bisogna:	girare il paziente di lato, arrotolare la biancheria sotto la schiena del paziente, stendere la biancheria pulita nella parte di materasso rimasta libera	posizionare il paziente in posizione supina, arrotolare la biancheria sotto la schiena del paziente, stendere la biancheria pulita nella parte di materasso rimasta libera	posizionare il paziente in posizione seduta, arrotolare la biancheria sotto la schiena del paziente, stendere la biancheria pulita nella parte di materasso rimasta libera	girare il paziente di lato, arrotolare la biancheria sotto la schiena del paziente, stendere la biancheria usata nella parte di materasso rimasta libera
1737	Nel rifacimento del letto occupato tra le operazioni proposte la prima in ordine di importanza è che:	la traversa sia collocata evitando che il bordo inferiore e superiore siano a contatto con la cute del paziente	coinvolgere l'infermiere di turno nell'operazione	la traversa sia collocata in modo che il bordo inferiore e superiore siano a contatto con la cute del paziente	Nessuna delle altre risposte è corretta
1738	Nel rifacimento del letto occupato, l'O.S.S. deve gestire la rimozione del lenzuolo sottostante l'assistito:	raccogliendolo a ventaglio sotto la persona posta in decubito laterale	raccogliendolo a ventaglio sopra la persona posta in decubito laterale	raccogliendolo a ventaglio senza spostare l'assistito	raccogliendolo a ventaglio sotto la persona posta in decubito supina
1739	Nel rifare un letto occupato:	bisogna evitare di collocare la traversa in modo che il bordo superiore e quello inferiore, siano in contatto con la cute dell'assistito	coinvolgere l'infermiere di turno nell'operazione	la traversa sia collocata in modo che il bordo inferiore e superiore siano a contatto con la cute del paziente	Nessuna delle altre risposte è corretta
1740	Nel soggetto portatore di colostomia, si deve accuratamente evitare:	Che l'elastico dei pantaloni prenda sulla sacca di raccolta delle feci	Di far mangiare cibi cotti al vapore	Di preferire il consumo di carote crude	Nessuna delle altre risposte è corretta
1741	Nel sollevare oggetti caduti a terra è necessario:	piegare le ginocchia	piegare solo il busto	piegarsi con la schiena	piegarsi lateralmente
1742	Nel turno di oggi ha lavorato in coppia con Francesca. Dopo aver assistito ospiti in isolamento poiché positivi al virus Sars-CoV-2, durante la procedura di rimozione dei DPI, lei si accorge che Francesca non rispetta l'ordine corretto delle azioni e, inoltre, smaltisce i DPI nei rifiuti indifferenziati. Come si comporta?	fa immediatamente presente alla collega la procedura corretta, sia per la rimozione dei DPI che per il loro smaltimento e la invita ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni date. In caso di ripetuta inosservanza da parte di Francesca, informerà i Responsabili del Servizio.	Fa finta di non aver notato il non rispetto dell'ordine corretto delle azioni per non andare incontro ad eventuali scontri tra colleghe	Lo segnala al paziente positivo al virus Sars-CoV-2 che ha appena assistito	Lo segnala ai parenti dei pazienti positivi al virus Sars-CoV-2 che ha appena assistito
1743	Nel vestire una persona che presenti immobilità di un arto superiore si deve procedere:	infilando per prima la manica dalla parte dell'arto immobile, successivamente l'altra	infilando per prima la manica dalla parte dell'arto mobile, successivamente l'altra	infilando esclusivamente il pantalone in quanto non vi è possibilità di vestire anche la parte superiore	infilando per seconda la manica dalla parte dell'arto immobile
1744	Nella assistenza alla persona morente, l'Operatore SocioSanitario deve:	Favorire il benessere ed il comfort della persona morente supportando anche i familiari	Non favorire il benessere ed il comfort della persona morente supportando anche i familiari	Favorire il benessere ed il comfort della persona morente, senza supportare anche i familiari	Somministrare una dose di morfina
1745	Nella collaborazione ai progetti educativo/animativi l'OSS:	Deve essere un facilitatore ed aiutare l'utente a raggiungere il suo obiettivo	Deve essere un deviatore così da non far raggiungere l'obiettivo all'utente	Deve essere un facilitatore ma non può aiutare l'utente a raggiungere il suo obiettivo	Nessuna delle altre risposte è corretta
1746	Nella comunicazione con il bambino malato bisogna:	comprendere i sentimenti che il piccolo malato esprime e rispondere in modo efficace	comprendere i sentimenti che il piccolo malato esprime e rispondere in modo vago	non comprendere i sentimenti che il piccolo malato esprime e rispondere in modo efficace	astenersi da qualsiasi contatto con il bambino malato
1747	Nella deambulazione assistita con bastone a quattro punti di appoggio l'operatore si deve posizionare:	a lato della persona	sotto la persona	avanti la persona	lontano dalla persona

1748	Nella deambulazione assistita per un paziente emiplegico, l'operatore deve posizionarsi:	Dal lato colpito, per la sua sicurezza	Dal lato non colpito, per la sua sicurezza	lontano dalla persona	sotto la persona, per la sua sicurezza
1749	Nella dieta idrica è permessa l'assunzione di:	acqua e liquidi chiari con basso apporto nutritivo, tè, camomilla con eventuale aggiunta di zuccheri	cibi complessi come pasta e pane	tutti i tipi di cibo tranne quelli liquidi	esclusivamente verdure
1750	Nella dieta iposodica quale di queste indicazioni non è adeguata?	non aggiungere zucchero al caffè	è priva di alcolici	è priva di caffeina	è ad alto contenuto di acqua
1751	Nella dieta iposodica, quale di queste indicazioni non è pertinente?	non aggiungere zucchero al caffè	è priva di alcolici	è priva di caffeina	è ad alto contenuto di acqua
1752	Nella distribuzione dei vassoi del pasto, l'OSS deve utilizzare:	il carrello economale	cibo scaduto o non sicuro	le mani nude, senza guanti monouso, per manipolare il cibo	Nessuna delle altre risposte è corretta
1753	Nella distribuzione dei vassoi del pasto, l'OSS deve:	utilizzare il carrello economale	cibo scaduto o non sicuro	le mani nude, senza guanti monouso, per manipolare il cibo	Nessuna delle altre risposte è corretta
1754	Nella donna l'igiene dei genitali deve essere effettuata:	Ritraendo delicatamente le labbra e procedendo dall'orifizio uretrale a quello vaginale	utilizzando detergenti o saponi aggressivi nella zona genitale	di consueto effettuando lavaggi vaginali interni	utilizzando strumenti abrasivi o spugnette ruvide per pulire la zona genitale
1755	Nella fase di aiuto all'assunzione del pasto un Operatore Socio Sanitario dovrà assicurare innanzitutto:	una posizione adeguata e comoda, compatibilmente con le condizioni della persona, che permetta la consumazione del pasto in modo sicuro, riducendo il rischio di aspirazione di alimenti e liquidi nelle vie aeree con conseguenze gravi, come polmoniti o soffocamento	non monitorare la quantità di cibo consumato	non assicurarsi che il paziente sia pulito e confortevole durante il pasto	non fornire assistenza dopo il pasto
1756	Nella gestione di una persona con catetere vescicale per ridurre il rischio di infezione delle vie urinarie è importante:	favorire l'idratazione	astenersi dal seguire le raccomandazioni del medico per la sostituzione regolare del catetere,	non mantenere pulito e disinfettato l'ambiente intorno al paziente	assicurarsi che la procedura venga eseguita in modo non sterile da personale qualificato per ridurre il rischio di contaminazione
1757	Nella misurazione con il termometro timpanico la sonda deve essere introdotta nel condotto auricolare tirando con cautela:	il lobo dell'orecchio indietro e verso l'alto	il naso indietro e verso l'alto	il lobo dell'orecchio chiudendolo	Nessuna delle altre risposte è corretta
1758	Nella misurazione del peso corporeo è opportuno:	Utilizzare la stessa bilancia	Non rispettare la privacy e la dignità del paziente	Non tenere traccia del peso corporeo del paziente nel tempo per valutare eventuali cambiamenti significativi	Non tenere conto di altri fattori che potrebbero influenzare il peso corporeo
1759	Nella misurazione della temperatura, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, l'OSS è tenuto a indossare i guanti?	Non è tenuto a indossare i guanti	Si è tenuto a indossare i guanti	Dipende dall'opinione dei parenti del paziente	Si in ogni caso
1760	Nella mobilitazione di un paziente parzialmente dipendente l'atteggiamento corretto che l'operatore sociosanitario deve tenere sarà caratterizzato da:	atteggiamento di aiuto, fornendo un intervento proporzionale al grado di dipendenza della persona, preservandone l'autonomia	atteggiamento superficiale, fornendo un intervento proporzionale al grado di dipendenza della persona	una comunicazione veloce e poco chiara	Nessuna delle altre risposte è corretta
1761	Nella modalità a due operatori, il trasferimento dalla posizione supina al letto a quella seduta in poltrona o in carrozzina viene effettuata in:	quattro tempi	dieci tempi	due tempi	sette tempi
1762	Nella persona portatrice di catetere vescicale, la sacca di drenaggio delle urine va posizionata:	sempre sotto il livello della vescica	sempre sopra il livello della vescica	sempre sotto il livello del femore	sempre sopra il livello della tibia
1763	Nella posizione laterale, gli arti inferiori vanno posizionati nel modo seguente:	arto del lato sul quale viene posizionata la persona: disteso o leggermente flesso con il piede ad angolo retto; arto opposto: ginocchio flesso sostenuto da un cuscino	arto del lato sul quale viene posizionata la persona: non disteso ma leggermente flesso con il piede ad angolo retto; arto opposto: ginocchio flesso sostenuto da un cuscino	arto del lato sul quale viene posizionata la persona: disteso o leggermente flesso con il piede ad angolo retto; arto opposto: ginocchio piegato verso il basso	arto del lato sul quale viene posizionata la persona: disteso o leggermente flesso con il piede ad angolo retto
1764	Nella posizione seduta in poltrona come deve essere mantenuto lo schienale ?	Perpendicolare al sedile	totalmente sdraiato	piegato verso le gambe	Non perpendicolare al sedile
1765	Nella posizione semi-seduta la testata del letto deve essere sollevata a:	45 gradi	55 gradi	35 gradi	40 gradi
1766	Nella posizione semi-seduta la testata del letto deve essere sollevata a:	45°	55°	35°	40°
1767	Nella posizione supina gli arti superiori vanno posizionati nel modo seguente:	avambraccio esteso, polso in posizione supina ed esteso, mano aperta	avambraccio contorto, polso in posizione supina ed esteso, mano aperta	avambraccio esteso, polso in posizione prona ed esteso, mano aperta	avambraccio esteso, polso in posizione supina ed esteso, mano chiusa
1768	Nella posizione supina gli arti superiori vanno posizionati nelle seguenti modalità:	avambraccio esteso, gomito leggermente flesso, polso in posizione supina ed esteso, mano aperta	avambraccio contorto, gomito leggermente flesso, polso in posizione supina ed esteso, mano aperta	avambraccio esteso, gomito leggermente flesso, polso in posizione prona ed esteso, mano aperta	avambraccio esteso, gomito leggermente flesso, polso in posizione supina ed esteso, mano chiusa
1769	Nella preparazione di un carrello per lo svolgimento dell'igiene mattutina, quale dei seguenti materiali va sistemato sul piano inferiore?	Contenitore con acqua fredda	Contenitore con acqua calda	Contenitore con acqua e sali minerali	Contenitore con acqua e oli essenziali
1770	Nella prevenzione delle lumbalgie, dovendo movimentare un peso, per l'operatore è importante:	tenere il peso da movimentare vicino al corpo il più possibile	tenere il peso da movimentare vicino al corpo il meno possibile	tenere il peso da non movimentare vicino al corpo il più possibile	Nessuna delle altre risposte è corretta

1771	Nella pulizia degli occhi, la rimozione delle secrezioni deve essere effettuata procedendo	Dall'angolo palpebrale interno verso quello esterno	Dall'angolo palpebrale esterno verso quello interno	Ruotando in senso antiorario	Ruotando in senso orario
1772	Nella pulizia del cavo orale del soggetto con protesi, è indicato il lavaggio con:	acqua corrente	acqua bollente	acqua e sali minerali	acqua e oli essenziali
1773	Nella pulizia delle orecchie di un paziente adulto, qual è la procedura corretta da seguire?	Tenere il padiglione dell'orecchio con una mano (senza tirare troppo) in dietro e in basso	Tenere il padiglione dell'orecchio con una mano (tirando) in dietro e in basso	Non tenere il padiglione dell'orecchio con una mano (senza tirare troppo) in dietro e in basso	Tenere il padiglione dell'orecchio con una mano (senza tirare troppo) in dietro e in alto
1774	Nella pulizia perineale in letto della donna, la salvietta per la detersione deve essere usata:	procedendo dalla vagina verso l'ano	procedendo dall'ano verso la vagina	procedendo con movimenti a zig zag	solo nelle donne in età adulta
1775	Nella raccolta della diuresi 24 ore, l'urina della prima minzione:	Non deve esser tenuta	Deve essere tenuta	Non vi sono indicazioni specifiche in merito	Ha sempre un colore di tipo giallo paglierino
1776	Nella raccolta delle urine delle 24 ore, si deve far attenzione a:	avviare la raccolta scartando la prima minzione del mattino	avviare la raccolta scartando la seconda minzione del mattino	avviare la raccolta scartando la terza minzione del mattino	avviare la raccolta scartando la quarta minzione del mattino
1777	Nella relazione con la persona ansiosa, è opportuno mantenere:	un atteggiamento calmo non direttivo	un atteggiamento direttivo non calmo	un atteggiamento di rabbia	un atteggiamento menefreghista
1778	Nella relazione con l'assistito demente, non è importante:	accentuare la mimica facciale guardandolo	è fondamentale adottare un approccio empatico, rispettoso e adattato alle esigenze individuali del paziente	Utilizzare una comunicazione semplice, chiara e rassicurante, adattata al livello di comprensione del paziente	Creare un ambiente sicuro, familiare e rassicurante per il paziente, riducendo al minimo le fonti di confusione o stress
1779	Nella relazione con l'assistito non udente è importante:	parlargli lentamente e guardandolo	Ignorare le esigenze specifiche dell'assistito non udente	Mancare di pazienza e comprensione	Non fornire supporto aggiuntivo quando necessario
1780	Nella sterilizzazione in autoclave, non si utilizza:	calore secco	strumenti chirurgici, apparecchiature mediche, utensili e altri oggetti che devono essere completamente sterilizzati	una combinazione di acqua, pressione, temperatura, controllo e monitoraggio accurati per garantire la completa eliminazione dei microbi	in nessun caso
1781	Nell'aiutare una persona a deambulare si deve:	far indossare scarpe allacciate, sostenere sotto l'ascella, far guardare in avanti	non far indossare scarpe allacciate, sostenere sotto l'ascella, far guardare in avanti	far indossare scarpe allacciate, sostenere con le mani congiunte, far guardare in avanti	far indossare scarpe allacciate, sostenere sotto l'ascella, far guardare indietro
1782	Nell'aiuto alla somministrazione della terapia per via rettale il paziente è posturato in:	posizione laterale sinistra o di Sims	esclusivamente posizione laterale sinistra	esclusivamente posizione di Sims	posizione supina
1783	Nell'aiuto alla vestizione del paziente l'operatore:	deve rispettare i tempi del paziente	deve indurre il paziente a velocizzare il processo di vestizione	non deve rispettare i tempi del paziente	deve restare in disparte
1784	Nell'aiuto alla vestizione e svestizione del paziente, l'OSS deve:	rispettare i tempi della persona	non rispettare i tempi della persona	deve restare in disparte	deve indurre il paziente a velocizzare il processo di vestizione
1785	Nell'aiuto alla vestizione e svestizione dell'utente si deve sempre:	rispettare i tempi della persona	non rispettare i tempi della persona	deve restare in disparte	deve indurre il paziente a velocizzare il processo di vestizione
1786	Nell'aiuto alla vestizione e svestizione dell'utente, l'OSS deve sempre:	rispettare i tempi della persona	non rispettare i tempi della persona	deve restare in disparte	deve indurre il paziente a velocizzare il processo di vestizione
1787	Nell'aiuto all'assunzione di un pasto in una persona con disfagia, l'OSS posiziona la persona:	Seduta con la testa leggermente inclinata in avanti	Seduta con la testa leggermente inclinata indietro	In piedi con la testa leggermente inclinata in avanti	Nessuna delle altre risposte è corretta
1788	Nell'alimentazione di un paziente disfagico, è essenziale il posizionamento:	seduto, con il tronco a 90°, e con la testa flessa in avanti	seduto, con il tronco a 90°, e con la testa flessa indietro	seduto, con il tronco a 50°, e con la testa flessa in avanti	seduto, con il tronco a 30°, e con la testa flessa in avanti
1789	Nell'ambito dell'assistenza notturna, per mantenere un buon modello di riposo e sonno è raccomandato di:	Fare in modo che la camera da letto sia fresca, buia e silenziosa	Fare in modo che la camera da letto sia calda, buia e silenziosa	Fare in modo che la camera da letto sia fresca, soleggiata e silenziosa	Fare in modo che la camera da letto sia fresca, buia e rumorosa
1790	Nell'approccio alla persona con atteggiamento delirante cercare un rapporto diretto:	è sempre opportuno	è opportuno in alcuni casi	non è mai opportuno	Dipende dall'età del paziente
1791	Nell'approccio alla persona con demenza, per l'aiuto nell'assunzione dei pasti, quale azione, tra le seguenti, è errata?	Offrire alla persona tutti i piatti che compongono il pasto contemporaneamente	Creare un ambiente rilassato e privo di distrazioni	Rispettare le preferenze alimentari del paziente	Comunicare in modo chiaro e rassicurante
1792	Nell'assistenza ad un paziente affetto da Tubercolosi contagiosa delle vie aeree, sospetta o accertata, quale DPI deve essere adoperato dall'operatore per proteggere le vie aeree?	Facciale filtrante FFP2	Mascherina chirurgica	Un panno in cotone	Non c'è bisogno di nessun DPI
1793	Nell'assistenza al morente, l'OSS deve:	alleggerire il più possibile l'ansia e il dolore del paziente, aiutando al contempo i familiari a sopportarne la perdita	non mantenere la privacy e il rispetto del paziente e della sua famiglia	non deve prestare alcuna assistenza psicologica al paziente	non deve prestare alcuna assistenza psicologica ai familiari
1794	Nell'assistenza al paziente demente è utile:	mantenere più a lungo possibile le capacità residue, stimolandolo a fare da solo	mantenere più a lungo possibile le capacità residue, non stimolandolo a fare da solo	assicurarsi che l'ambiente in cui il paziente trascorre il suo tempo sia provvisto di potenziali pericoli	comunicare utilizzando frasi lunghe e complesse
1795	Nell'assistenza alla persona con difficoltà respiratoria, quali sono gli interventi corretti da seguire durante il pasto?	La faccio accomodare con la schiena eretta, le braccia appoggiate, l'ambiente è tranquillo, la invito a masticare lentamente, somministro alimenti morbidi e facilmente digeribili, evito di farla parlare mentre mangia	La faccio accomodare con la schiena piegata in avanti, le braccia appoggiate, l'ambiente è tranquillo, la invito a masticare lentamente, somministro alimenti morbidi e facilmente digeribili, evito di farla parlare mentre mangia	La faccio accomodare con la schiena eretta, le braccia appoggiate, l'ambiente è tranquillo, la invito a masticare velocemente, somministro alimenti morbidi e facilmente digeribili, evito di farla parlare mentre mangia	La faccio accomodare con la schiena eretta, le braccia appoggiate, l'ambiente è tranquillo, la invito a masticare lentamente, somministro alimenti morbidi e facilmente digeribili, cercando di farla parlare mentre mangia

1796	Nell'assistenza alla persona disabile è necessario:	porre attenzione alla persona nella sua globalità e non solo alla sua malattia, malformazione o mutilazione	non rispettare l'autonomia e la dignità della persona disabile	non promuovere l'inclusione sociale	ignorare le esigenze mediche
1797	Nell'assistenza del malato terminale, l'OSS deve:	alleggerire l'ansia e il dolore del paziente aiutando i familiari a sopperire la perdita	non mantenere la privacy e il rispetto del paziente e della sua famiglia	non deve prestare alcuna assistenza psicologica al paziente	non deve prestare alcuna assistenza psicologica ai familiari
1798	Nell'assistenza domiciliare a un soggetto anziano disidratato, l'OSS può consigliare di:	bere regolarmente, soprattutto acqua	bere regolarmente, soprattutto vino	bere poco, soprattutto acqua	bere regolarmente, soprattutto tisane
1799	Nell'assistenza domiciliare a un soggetto anziano disidratato, Quali dei seguenti consigli può dare un OSS?	Bere regolarmente, soprattutto acqua	Bere regolarmente, soprattutto vino	Bere poco, soprattutto acqua	Bere regolarmente, soprattutto tisane
1800	Nell'assistenza domiciliare ad un soggetto anziano disidratato, quale di questi consigli può dare l'O.S.S.?	Bere regolarmente, anche se non si ha sete, soprattutto lontano dai pasti	Bere poco, anche se non si ha sete, soprattutto lontano dai pasti	Bere regolarmente, anche se non si ha sete, soprattutto nei pasti	Bere regolarmente vino, anche se non si ha sete, soprattutto lontano dai pasti
1801	Nell'assistenza postoperatoria l'OSS deve:	su indicazione del personale medico o infermieristico, accompagnare in reparto il paziente in barella con la documentazione relativa all'intervento subito	su indicazione del personale medico o infermieristico, non accompagnare in reparto il paziente in barella con la documentazione relativa all'intervento subito	su indicazione dei parenti, accompagnare in reparto il paziente in barella con la documentazione relativa all'intervento subito	su indicazione di un tirocinante, accompagnare in reparto il paziente in barella con la documentazione relativa all'intervento subito
1802	Nell'assistito con afasia postictus è opportuno:	utilizzare rappresentazioni grafiche	fornire un supporto efficace e imponente alla persona con afasia postictus	non utilizzare rappresentazioni grafiche	Nessuna delle altre risposte è corretta
1803	Nell'attività di lavaggio dei genitali femminili, quale delle seguenti azioni è errata?	divisa e grembiule puliti, nonché la cuffia	assicurarsi di avere tutto il necessario prima di iniziare, inclusi acqua tiepida, sapone neutro	prima di iniziare, lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone	posizionare la persona assistita in una posizione comoda e sicura
1804	Nelle operazioni di rifacimento del letto, quale norma igienica è necessaria osservare per evitare la diffusione di microrganismi?	Lavare le mani prima di toccare la biancheria pulita e dopo aver manipolato quella sporca	Lavare le mani dopo di toccare la biancheria pulita e prima aver manipolato quella sporca	Non cambiare le lenzuola al bisogno	Non ci sono norme igieniche da seguire
1805	Nell'effettuare l'igiene degli occhi l'uso dei guanti:	è indicato solo in presenza di secrezioni	è sempre indicato	non è mai indicato	è indicato solo in presenza di cosmetici
1806	Nell'effettuazione del lavaggio sociale delle mani si utilizza:	detergente liquido in dispenser	un detergente con un'alta percentuale di candeggina	un detergente neutro e in seguito una pomata abrasiva	un asciugamano già utilizzato in precedenza
1807	Nell'eseguire l'igiene degli occhi è necessario:	cambiare garza ad ogni passaggio sulla rima palpebrale	non cambiare garza ad ogni passaggio sulla rima palpebrale	tamponare con alcool	utilizzare un massaggio con forza
1808	Nell'eseguire l'igiene dei genitali, l'OSS:	effettua sempre la pulizia andando dalla zona più pulita a quella più sporca	effettua sempre la pulizia andando dalla zona più sporca a quella più pulita	utilizzare un detergente con un'alta percentuale di candeggina	utilizzare un asciugamano già utilizzato in precedenza
1809	Nell'eseguire l'igiene dei genitali, si deve procedere:	andando dalla zona più pulita alla zona più sporca	andando dalla zona più sporca a quella più pulita	utilizzare un detergente con un'alta percentuale di candeggina	utilizzare un asciugamano già utilizzato in precedenza
1810	Nell'eseguire l'igiene perineale, l'OSS deve:	versare l'acqua sul pube, genitali e glande, dopo aver retratto il prepuzio	versare l'acqua sul pube, genitali e glande, prima di aver retratto il prepuzio	utilizzare una spugna ruvida imbevuta con sapone neutro	utilizzare un detergente con un'alta percentuale di candeggina
1811	Nell'igiene degli arti inferiori, il frizionamento è SCONSIGLIATO in pazienti affetti da:	vene varicose o flebiti	problemi circolatori	pelle secca	insufficienza venosa
1812	Nell'igiene genito perineale della donna si deve procedere:	dalla regione genitale a quella perianale	dalla regione perianale a quella genitale	utilizzando un asciugamano usato	Nessuna delle altre risposte è corretta
1813	Nello spostare un paziente parzialmente dipendente dal letto alla poltrona, è necessario:	utilizzare i dispositivi idonei alla movimentazione dei carichi pesanti	utilizzare i dispositivi idonei alla movimentazione dei carichi leggeri	utilizzare i dispositivi non idonei alla movimentazione dei carichi pesanti	favorire lo spostamento i autonomia
1814	Nello svolgimento dei propri compiti l'O.S.S. opera:	su precisa attribuzione dell'infermiere	su precisa attribuzione del tirocinante	in autonomia	su precisa attribuzione dei parenti del paziente
1815	Nell'occuparsi dell'igiene dei piedi di un paziente diabetico, dopo averli lavati, l'OSS:	li asciugherà facendo attenzione agli spazi interdigitali	non li asciugherà facendo attenzione agli spazi interdigitali	li asciugherà non facendo attenzione agli spazi interdigitali	fornirà un asciugamano usato al paziente
1816	Nell'uomo l'igiene dei genitali deve essere effettuato procedendo:	Con movimenti circolari dal meato urinario verso l'esterno	Con movimenti lineari dal meato urinario verso l'esterno	Con movimenti circolari dal meato urinario verso l'interno	Con movimenti obliqui dal meato urinario verso l'esterno
1817	Nell'uomo, al termine della pulizia dei genitali, il prepuzio deve essere riportato sul glande:	per prevenire l'edema del glande	per favorire l'edema del glande	per favorire il sorgere di infezioni	per mantenere la zona sporca
1818	Nell'uso del sollevatore si deve:	sistemare le fasce di sostegno sotto al paziente	sistemare le fasce di sostegno sopra al paziente	non sistemare le fasce di sostegno sotto al paziente	Nessuna delle altre risposte è corretta
1819	Per aiutare un soggetto emiplegico a deambulare su una superficie piana, avvalendosi di un ausilio, è necessario sapere che la corretta sequenza è:	Ausilio -> gamba plegica -> gamba sana	Gamba plegica -> gamba sana -> ausilio	Gamba sana -> ausilio -> gamba plegica ->	Non esiste una corretta sequenza
1820	Per allievare lo stato depressivo di un paziente ricoverato in ospedale, l'operatore deve:	dimostrare comprensione empatica e condivisione	evitare di coinvolgerlo emotivamente in attività sociali	non è importante adottare un approccio compassionevole e professionale per offrire sostegno e assistenza	non promuovere l'attività fisica
1821	Per alzare una persona dalla poltrona, il sistema migliore è:	un piede davanti a quelli della persona, mani sotto al bacino, braccia dell'assistito al collo dell'operatore	un piede dietro a quelli della persona, mani sotto al bacino, braccia dell'assistito al collo dell'operatore	un piede davanti a quelli della persona, mani sopra al bacino, braccia dell'assistito al collo dell'operatore	un piede davanti a quelli della persona, mani sotto al bacino, braccia dell'assistito ai fianchi dell'operatore
1822	Per assicurare la soddisfazione del bisogno di riposo e sonno, l'operatore deve intervenire:	sia sull'utente che sull'ambiente	esclusivamente sull'utente	esclusivamente sull'ambiente	solo in determinati casi
1823	Per curare la lesione da decubito è necessario:	mantenere la cute pulita e asciutta	mantenere la cute sporca e asciutta	mantenere la cute pulita e umida	spalmare una pomata abrasiva

1824	Per erogare un maggior quantitativo di ossigeno ad un paziente è preferibile utilizzare? (Indicare la risposta errata)	L'aerosol	le maschere ad alta concentrazione, come la maschera Venturi o la maschera a risonanza	Le cannule nasali ad alto flusso	un ventilatore meccanico
1825	Per eseguire un enteroclima, il paziente deve assumere la posizione:	laterale sul fianco sinistro con la gamba destra flessa	laterale sul fianco sinistro con la gamba sinistra flessa	supina sul fianco sinistro con la gamba destra flessa	prona sul fianco sinistro con la gamba destra flessa
1826	Per evitare che l'anziano posizionato su un seggiolone polifunzionale scivoli in avanti con il sedere:	Basculare la carrozzina evitando di inclinare lo schienale oltre i 90°	Basculare la carrozzina inclinando lo schienale oltre i 90°	Basculare la carrozzina inclinando lo schienale oltre i 85°	Basculare la carrozzina inclinando lo schienale oltre i 95°
1827	Per evitare lesioni all'occhio in un paziente in coma si deve:	Applicare frequentemente sugli occhi garze umide	Applicare raramente sugli occhi garze umide	Non mantenere gli occhi del paziente idratati utilizzando soluzioni saline oftalmiche o lubrificanti oculari	Non monitorare attentamente la pressione intracranica del paziente
1828	Per evitare lesioni all'occhio in un paziente in coma si deve:	Pulire e applicare frequentemente sugli occhi garze sterili umide	Pulire e applicare raramente sugli occhi garze sterili umide	Non mantenere gli occhi del paziente idratati utilizzando soluzioni saline oftalmiche o lubrificanti oculari	Non monitorare attentamente la pressione intracranica del paziente
1829	Per far passare un paziente dalla posizione supina al decubito laterale si devono porre:	una mano a livello del bacino e l'altra a livello della scapola del paziente	una mano a livello della scapola e l'altra a livello del bacino del paziente	una mano a livello del bacino e l'altra a livello della fronte del paziente	una mano a livello della gamba e l'altra a livello della scapola del paziente
1830	Per garantire un adeguato riposo e sonno, durante il pasto serale è opportuno che la persona consumi:	amidi del riso e della pasta, fruttosio, saccarosio	cibi pesanti ricchi di grassi saturi	cibi pesanti con zuccheri raffinati	pasti abbondanti
1831	Di regola quante volte al giorno viene misurata la temperatura corporea?	Dalle 2 alle 4 volte al giorno	Dalle 4 alle 8 volte al giorno	Dalle 3 alle 6 volte al giorno	Basta 1 sola volta al giorno
1832	Dopo aver alimentato un assistito, l'O.S.S. deve riferire all'infermiere:	Il risultato ottenuto e/o le difficoltà incontrate	Le difficoltà incontrate ma mai il risultato	Ordinare al medico di farsi aiutare	L'oss non deve riferire nulla, può procedere a somministrare la cura
1833	Dopo che l'operatore è venuto a contatto con materiale biologico il lavaggio delle mani deve essere effettuato:	Con prodotto antisettico	Non è cruciale il lavaggio delle mani	Effettuare il lavaggio solo con acqua calda	Tutte le risposte sono corrette
1834	Dopo un intervento addominale, per eseguire esercizi respiratori il paziente deve assumere la posizione:	Di Fowler	Posizione di Trendelenburg	Posizione prona	Posizione laterale
1835	Dove si misura il polso radiale?	In corrispondenza dell'articolazione del polso	Sul torace	Vicino la vena aorta	Nessuna delle risposte è corretta
1836	Dovendo disinfettare una ferita sporca di terra, quale tra i seguenti disinfettanti è opportuno utilizzare?	Acqua ossigenata	Acqua calda	Acqua + bicarbonato	Solo acqua ma a temperature fredde
1837	Dovendo predisporre il materiale per un esame colturale, il contenitore non deve essere sterile in caso di raccolta di:	Feci	Liquidi batterici	Urina	Tutte le risposte sono corrette
1838	Durante il pasto di un bambino disfagico a cosa bisogna prestare attenzione?	Tosse	Alla temperatura corporea	Alla quantità di battiti al minuto	Tutte le risposte sono corrette
1839	Durante il pasto un bambino, in età scolare, presenta nausea e vomito incoercibile. Quale comportamento adottato?	Informo immediatamente l'Infermiere dell'accaduto	Preparo un pasto caldo ed aiuto il bambino	Ignoro il problema	Ordino al medico di effettuare una visita al bambino
1840	Durante il pasto una persona riferisce nausea. L'oss deve:	Sospendere il pasto, tenerla seduta, avvisare il personale infermieristico	Ampliare notevolmente le dosi del pasto	Si consiglia al paziente di idratarsi più del dovuto bevendo almeno 4 litri d'acqua al giorno	Ignoro il problema
1841	Durante la mobilizzazione di un soggetto con catetere vescicale, il sacchetto delle urine deve essere posizionato:	Sotto il livello della vescica	Sopra il livello della vescica	Il sacchetto delle urine deve essere posizionato sul pavimento	Ordinare al medico di posizionare in modo corretto il sacchetto
1842	Durante la procedura di posizionamento del sondino naso gastrico, quale postura va fatta assumere all'utente?	Posizione di Fowler alta	Posizione prona	Posizione di Trendelenburg	Posizione laterale
1843	Durante la somministrazione dei pasti ad un ospite disfagico l'OSS deve stare attento alla comparsa di:	Tosse	Febbre	Gastrite	Insufficienza renale
1844	Durante l'allattamento è importante evitare:	Bevande alcoliche	Assumere posizione corretta	Fare attenzione alla frequenza delle poppate	Ascoltare i segnali del bambino
1845	La cartella infermieristica è:	uno strumento di raccolta di informazioni che il modello concettuale indica come essenziali	uno strumento che il mansionario indica come utile per l'assistenza	uno strumento che serve per la raccolta dei dati	uno strumento che raccoglie tutte le informazioni del paziente
1846	Per dati soggettivi si intendono:	sintomi riferiti direttamente dal paziente o dai familiari	dati anagrafici del paziente	dati ricavati dalla rilevazione dei parametri vitali	segnali osservabili e misurabili
1847	L'attestato di qualifica di Oss è valido:	su tutto il territorio nazionale	nel territorio di competenza dell'Asl	solo nella Regione dove è stato conseguito	solo nella Provincia dove è stato conseguito
1848	Il segreto professionale:	è normato deontologicamente e nello stesso tempo è normato giuridicamente	l'operatore sociosanitario non può avere accesso direttamente alla cartella sanitaria del soggetto assistito	nessuna delle altre risposte è corretta	è una norma deontologica che non ha valore giuridico
1849	I dati sensibili sono:	dati idonei a rilevare lo stato di salute, nonché convinzioni religiose che richiedono il consenso scritto della persona per il loro trattamento	sono dati che non richiedono il consenso al trattamento	dati identificativi che consentono di identificare direttamente il paziente	nessuna delle altre risposte è corretta
1850	Per PAI si intende:	il piano assistenziale individualizzato	il progetto assistenziale informatizzato	il percorso autonomo individuale	la personalizzazione attenta e informata
1851	Il Direttore sanitario:	è un medico	è un infermiere	può essere un ingegnere	non è un medico

1852	Gli utenti del Centro Diurno sono anziani:	non autosufficienti	autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti	ultra settantenni	parzialmente autosufficienti
1853	Gli utenti delle RSA sono persone:	adulte e/o anziane con gravi problemi sanitari e/o sociali	non autosufficienti	anziane della città metropolitana	molto giovani non autosufficienti
1854	Per APSP si intende:	aziende pubbliche di servizi alla persona	agenzie per servizi pubblici	aziende pubbliche sanitarie provinciali	aziende private di servizi alla persona
1855	Ai sensi del D.lgs. 419/1999 e s.m.i. e del DPR 70/2001 e s.m.i., l'Istituto superiore della sanità:	svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica	esprime pareri obbligatori in materia di regolamenti predisposti dalle Amministrazioni centrali che interessino la salute pubblica	redige con il Ministero della salute il Piano sanitario nazionale	elegge il Ministro della salute
1856	_____ è la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale.	La L. 23.12.1978 n. 833	La L. 12.2.1968 n. 132	La L. 20.03.1865 n. 2248	Il DPR 23.01.1968 n.34
1857	Chi provvede, secondo il D.lgs. 502/1992 e s.m.i., all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture pubbliche o private a fornire prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale?	Le Regioni	Il Governo	Le Asl	Il Collegio di revisione
1858	Quale autorità emana i provvedimenti di riconoscimento degli IRCCS?	Il Ministero della salute	La Conferenza dei sindaci	Il Collegio di revisione	La Regione
1859	Il processo di aziendalizzazione delle strutture di produzione ed erogazione dei servizi sanitari è stato avviato:	dal D.lgs. 502/1992	dalla Carta dei servizi sanitari	dalla Legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale	dalle Linee guida comunitarie
1860	_____ individua i LEA (Livelli essenziali di Assistenza).	Lo Stato	La Conferenza dei comuni	L'Asl	Il Collegio di revisione
1861	Chi deve essere a conoscenza degli obiettivi del PAI?	Tutti gli operatori	Solo il personale sanitario	Il responsabile dell'obiettivo e dei monitoraggi	Solo il personale dell'area amministrativa
1862	Il codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni allegato al CCNL, del comparto sanità recita, tra le altre cose, che il dipendente pubblico:	ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato	nessuna delle altre risposte è corretta	ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse esclusivamente personale	ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse esclusivamente privato
1863	_____ compete la determinazione degli obiettivi della "Programmazione sanitaria nazionale".	Allo Stato, nell'ambito della programmazione economica nazionale, con il concorso delle Regioni	Al Collegio dei revisori	Al Presidente del consiglio, con il concorso del Ministero dell'interno	Al Ministero del lavoro in via esclusiva
1864	Il Piano sanitario nazionale può essere modificato dopo essere stato approvato?	Sì	No	Solo per volere esclusivo del Presidente della Repubblica	Può essere modificato, ma con voto unanime del Collegio di revisione nazionale
1865	Il Direttore di dipartimento:	è nominato dal Direttore generale	viene eletto dai componenti del Collegio di direzione	è il Direttore più anziano delle unità operative ricomprese nel Dipartimento	è stato eliminato dalla nuova legislazione
1866	La rappresentanza legale spetta al Direttore:	generale	amministrativo	sanitario	collegiale
1867	_____ è il medico competente dell'azienda sanitaria.	Il medico nominato dal datore di lavoro, ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.	Il medico di base degli ospiti	Il direttore sanitario della struttura	Il direttore del collegio di revisione
1868	_____ deve indicare al lavoratore un pericolo grave e immediato e le disposizioni da prendere in materia di protezione.	Il preposto	Il rappresentante della sicurezza dei lavoratori	Il collega	Il collegio di revisione
1869	Il concetto di assistenza sociale è apparso per la prima volta:	nell'art. 38 della Costituzione	nell'art. 8 della Costituzione	nella legge 104/1992	nel DPR 62/1998
1870	La formazione dell'operatore socio-sanitario è di competenza:	della regione e delle province autonome	dello stato	della regione	del tar locale
1871	Il Consiglio superiore della sanità viene rinnovato ogni _____ anni.	3	4	2	7
1872	_____ adotta il bilancio consuntivo di un'azienda sanitaria.	Il Direttore generale	Il Direttore sanitario	Il Collegio sindacale	Il Collegio di speculazione
1873	Nel _____ fu aziendalizzata la Usl.	1992	1999	1978	1968
1874	Con il DL 217/1978 (convertito dalla L. 317/2001) è stato istituito:	il Ministero della salute	il Servizio sanitario nazionale	l'Istituto superiore di sanità	l'Istituto di Statistica
1875	La durata del Piano sanitario regionale è di _____ anni.	3	2	4	15
1876	Con la riforma sanitaria Ter il ruolo dei Comuni viene rafforzato nell'ambito:	della programmazione	della gestione delle risorse finanziarie	della nomina dei referenti delle aziende	nessuna delle altre risposte è corretta
1877	Secondo quanto previsto dalla Costituzione italiana, lo sciopero è considerato come un:	diritto esercitabile nell'ambito delle leggi che lo regolano	diritto esercitabile liberamente, senza alcuna limitazione	interesse collettivo legittimo	nessuna delle altre risposte è corretta
1878	_____ ha la responsabilità della direzione dell'Azienda sanitaria locale.	Il Direttore generale	Il Sindaco della città	Il Presidente della regione	Il Collegio di revisione
1879	La Carta dei servizi sanitari, adottata con DPCM 19.5.1995 è:	un decalogo che garantisce la qualità dei servizi erogati dalle strutture sanitarie	il documento contenente le regole ministeriali per il controllo di gestione qualitativa	il decalogo dei diritti e dei doveri dei dipendenti del comparto sanità	un documento di identità personale degli operatori delle strutture sanitarie
1880	Il principio del silenzio-assenso in materia di trapianti di organi:	è principio fondante della L. 1.4.1999 n. 91	non è recepito dalla legislazione ordinaria	è principio sancito dalla Carta dei servizi sanitari	nessuna delle altre risposte è corretta

1881	L'OMS è:	l'organizzazione mondiale della sanità	l'organizzazione del ministero della salute	l'organizzazione mondiale sociale	l'organizzazione microstatale della sanità
1882	Le liste di attesa sono l'elenco:	dei pazienti che attendono di ricevere prestazioni sanitarie	delle persone che attendono l'assunzione	dei prodotti che debbono essere consegnati dai fornitori alle aziende	dei macchinari medici in uso
1883	_____ approva il bilancio di previsione di un'azienda sanitaria.	La regione	Il Ministero dell'economia	Il Direttore generale	Il Direttore collegiale
1884	Un'Azienda sanitaria è:	la struttura di gestione dei servizi sanitari di un determinato ambito del territorio regionale	un'azienda produttrice di articoli sanitari	costituita da strutture complesse e/o semplici omogenee, che perseguono comuni finalità e sono tra loro interdipendenti e sviluppano modelli organizzativi innovativi ed integrati	un ospedale sia pubblico che privato
1885	Le strutture sanitarie devono predisporre apposite distanze di cortesia nei casi in cui si mette in atto il trattamento di dati sanitari?	Sì, ad esempio, nelle operazioni di sportello, nel rispetto dei canoni di confidenzialità e della riservatezza dell'interessato	Sì, ma solo nelle strutture private	Sì, ma solo nelle strutture pubbliche	No, è tutto open space
1886	_____ possono essere iscritti nelle liste d'attesa per un trapianto.	Tutti i cittadini assistiti dal Servizio sanitario nazionale	Solo i residenti in alcune regioni italiane	Solo chi ha già compiuto i 25 anni d'età	Solo chi ha già compiuto i 18 anni di età
1887	Per farmaco si intende:	ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane	un'associazione di sostanze utilizzata per curare solo i sintomi influenzali	un rimedio di origine solo naturale per curare determinate malattie	una sostanza biologica che ha lo scopo di prevenire le malattie infettive attraverso la stimolazione del sistema immunitario
1888	Il SiVeAS è:	un organismo istituito presso il Ministero della salute con il compito di verificare che i finanziamenti siano tradotti in servizi per i cittadini, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza	un organismo istituito presso il Ministero della salute, con il compito di esprimere dei pareri sulla costituzionalità delle leggi in materia sanitaria	un organismo istituito presso l'Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali, con il compito di revisionare i bilanci delle aziende sanitarie	un organismo istituito presso la Presidenza del consiglio con il compito di revisionare i bilanci delle aziende sanitarie
1889	_____ il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono dichiarati decaduti dal proprio incarico.	Nei casi di manifesta violazione di leggi o regolamenti e del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione	Solo in caso di grave disavanzo economico	Solo in caso di violazione di legge	In nessun caso
1890	A norma della legge Lorenzin 3/2018, la Federazione nazionale dei Collegi Ispasvi è stata sostituita da:	la Fnopi, Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche	la Ispasvi	gli Irccs	FNO TSRM
1891	Nel _____ viene istituito il Ministero della salute.	1958	1946	1968	1978
1892	Il Distretto sanitario di base:	eroga, secondo quanto stabilito dalla legge regionale, i servizi di assistenza primaria (medico-generica, pediatrica, guardia medica, specialistica, sociosanitaria)	è un ospedale pubblico	è un ospedale privato	predispone ogni anno il piano delle attività e dell'utilizzazione delle risorse disponibili negoziato con la direzione generale nell'ambito della programmazione aziendale
1893	Il compito primario delle Aziende sanitarie locali è di:	assicurare i livelli essenziali di assistenza previsti dal Piano sanitario nazionale	nessuna delle altre risposte è corretta	fornire le linee-guida per la politica sanitaria nazionale	gestire l'attività regolatoria dei farmaci in Italia
1894	I prodotti solari sono considerati come:	prodotti cosmetici, disciplinati dal regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009	dispositivi medici	nessuna delle altre risposte è corretta	la verifica di un controllo di prevenzione delle infezioni in ospedale
1895	Per funzione di supervisione esercitata dall'infermiere si intende:	il controllo sulle attività svolte, la verifica della qualità dell'attività svolta e la possibilità di intervenire se si modifica la situazione	la verifica della qualità dell'attività svolta dall'Oss, in base a criteri scientifici ed esplicitati	nessuna delle altre risposte è corretta	la verifica di un protocollo di prevenzione delle infezioni in ospedale
1896	La Residenza sanitaria assistenziale (RSA) è una struttura:	socio-sanitaria residenziale che accoglie anziani non autosufficienti con elevati bisogni sanitari	socio-assistenziale residenziale per anziani non autosufficienti di grado lieve	distaccata dell'azienda ospedaliera	socio-sanitaria a carattere diurno destinata ad anziani con diverso grado di non autosufficienza
1897	Lo Stato italiano riconosce come professioni sanitarie quelle che:	in forza di un titolo abilitante, svolgono attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione	sono svolte senza titolo abilitante	nessuna delle altre risposte è corretta	svolgono solo attività di sostegno psicologico agli infermi
1898	Secondo l'attuale normativa l'utilizzo del defibrillatore semi-automatico è consentito a:	tutte le altre risposte sono corrette	solo ai medici	ai medici	agli infermieri
1899	L'esercizio abusivo della professione di infermiere comporta sanzioni a norma del:	codice penale	codice economico	codice civile	codice etico
1900	Ai sensi del D.lgs. N. 81/2008 e s.m.i., secondo le definizioni indicate all'art. 2, la definizione "il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno" si riferisce:	prevenzione primaria	formazione	valutazione dei rischi	prevenzione

1901	Ai sensi del D.lgs. N. 81/2008 e s.m.i., secondo le definizioni indicate all'art. 2, la definizione "valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza" si riferisce alla:	valutazione dei rischi	prevenzione	sorveglianza sanitaria	formazione
1902	Ai sensi del D.lgs. N. 81/2008 e s.m.i., secondo le definizioni indicate all'art. 2, la definizione "processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi" si riferisce alla:	formazione	valutazione dei rischi	prevenzione secondaria	sorveglianza sanitaria
1903	Ai sensi del D.lgs. N. 81/2008 e s.m.i., secondo le definizioni indicate all'art. 2, la definizione "complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro" si riferisce alla:	informazione	sorveglianza sanitaria	formazione	addestramento
1904	La responsabilità penale è:	strettamente personale ed individuale	sempre del coordinatore	sempre del medico	di tutta l'équipe assistenziale
1905	_____ erogano prestazioni di ricovero e cura.	Irccs	Iss	Assr	Ispesl
1906	Secondo il D.lgs. N. 502/1992 modificato dal D.lgs. N. 229/1999, il dirigente di struttura complessa di un reparto ospedaliero resta in carica per ____ anni.	5	10	2	3
1907	Il consenso informato deve essere:	in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare	espreso in presenza di un parente	espreso in presenza di un testimone	sempre espresso in forma scritta
1908	Il medico competente è il medico:	responsabile della sorveglianza sanitaria ai fini della sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro	responsabile del coordinamento delle attività socio-sanitarie nell'ambito del Distretto dell'azienda Ussl	nessuna delle altre risposte è corretta	curante degli ospiti all'interno della casa di riposo
1909	Nei confronti dell'Oss si può parlare di delega da parte dell'infermiere?	No, l'infermiere può solo trasferire o assegnare prestazioni all'Oss	Sì, per le prestazioni che l'infermiere ritiene possibili per le competenze di un Oss specifico	Sì, ma solo per quanto concerne l'assistenza di base	No, solo un Oss può delegare un altro Oss
1910	La responsabilità civile comporta il risarcimento:	dei danni eventualmente arrecati all'assistito a seguito di un'azione dell'Oss che sia diretta causa del danno stesso	dei danni morali arrecati all'assistito a seguito di un'azione dell'Oss	per i disagi eventualmente arrecati all'assistito a seguito di un'azione dell'Oss che sia diretta causa del disagio stesso	dei soli danni esistenziali arrecati all'assistito a seguito di un'azione dell'Oss
1911	L'Oss può incorrere nel reato di esercizio abusivo della professione:	Sì, se effettua prestazioni tipiche/esclusive di un professionista	No, perché in ambito sanitario e sociale non esistono prestazioni esclusive dell'uno o altro professionista	No, perché il codice deontologico non lo prevede	Sì, se effettua prestazioni infermieristiche
1912	L'Oss, in ambito sanitario, agisce:	all'interno di équipe multidisciplinari in un rapporto di collaborazione	in autonomia	con autonomia e discrezionalità sotto la supervisione dell'infermiere	sotto la diretta responsabilità dell'infermiere
1913	L'Ufficio relazioni con il pubblico si occupa di:	informare, accogliere, tutelare, partecipare	informare, denunciare, tutelare, partecipare	tutelare, partecipare, dichiarare, assicurare	accogliere i reclami e le lamentele dei cittadini e non dei pazienti che invece dovranno rivolgersi al tribunale per i diritti del malato
1914	Per l'attuazione di un Trattamento sanitario obbligatorio è necessaria la:	autorizzazione del sindaco	autorizzazione del prefetto	autorizzazione del direttore generale dell'azienda sanitaria locale	convalida del servizio di salute mentale
1915	Il possesso dell'attestato di formazione complementare in assistenza sanitaria consente all'operatore sociosanitario di:	collaborare con l'infermiere e l'ostetrica per svolgere alcune attività assistenziali	effettuare sistematicamente e autonomamente alcune attività assistenziali	effettuare sistematicamente e autonomamente qualsiasi tipo di attività assistenziale	collaborare con l'infermiere e l'ostetrica per svolgere qualsiasi tipo di attività assistenziale
1916	_____ deve autorizzare gli stabilimenti termali ai sensi della L. n. 323/2000 e successive modificazioni e integrazioni.	La Regione	Il Consiglio superiore di sanità	Il Comune	La Provincia
1917	Ai sensi della L. n. 833/1978 e s.m.i., la Usl provvede alla erogazione di prestazioni di riabilitazione?	Sì	No	Sì, ma solo per infortuni sul lavoro	Sì, ma solo se assicurati
1918	Con il D.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 viene approvata la c.d.:	riforma sanitaria ter	buona riforma sanitaria	riforma sanitaria bis	riforma sanitaria

1919	L'accreditamento istituzionale è:	il riconoscimento della possibilità che un soggetto, già autorizzato all'erogazione di prestazioni sanitarie, possa svolgere la propria attività per conto del Servizio sanitario nazionale	un percorso facoltativo per le strutture sanitarie pubbliche per svolgere la propria attività	nessuna delle altre risposte è corretta	il riconoscimento dei soli centri di cura privati
1920	Il rilascio dell'accreditamento istituzionale spetta:	alla Regione	allo Stato	alle Province	al Comune
1921	Il controllo sullo stato di malattia del lavoratore viene eseguito:	dai medici delle Asl o dai medici dell'Istituto previdenziale	dai medici competenti	dei soli medici dell'istituto previdenziale	degli ispettori del lavoro
1922	La donazione di sangue e dei suoi componenti:	è volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita	non garantire l'anonimato del donatore	è a pagamento e obbligatoria per tutti i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età	è decisa dal datore di lavoro
1923	Gli insetticidi, in base alla legislazione vigente italiana, soggiacciono:	alla disciplina dei presidi medico-chirurgici e a quella dei biocidi	alla disciplina infermieristica	soltanto alla disciplina dei presidi medico chirurgici	alla disciplina dei biocidi a quella dei dispositivi medici
1924	I presidi medico-chirurgici, per poter essere immessi in commercio sul mercato italiano, devono essere autorizzati:	dal Ministero della salute	dall'Istituto superiore di sanità	dal Ministero dell'interno	dall'Aifa
1925	Il decreto-legge è un atto normativo:	emanato dal Governo, poi convertito in legge dal Parlamento	emanato dal Presidente della repubblica	emanato da una Regione	emanato dal Parlamento
1926	Gli operatori delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche svolgono assistenza:	con autonomia professionale e utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi	senza potere decisionale	con autonomia professionale limitata ed espletando le funzioni previste dagli specifici codici deontologici	con autonomia professionale ma senza potere decisionale, utilizzando metodologie di valutazione multidisciplinari
1927	Secondo la normativa vigente, l'uso del defibrillatore semiautomatico è consentito:	ai medici, agli infermieri ed al personale non sanitario qualificato	solo al personale sanitario che lavora in ospedale	solo ai medici	ai medici ed agli infermieri
1928	Ai sensi del T.U. CCNL, la "mobilità interna" si distingue in:	mobilità di urgenza, mobilità ordinaria a domanda e mobilità d'ufficio	mobilità di fatto, mobilità di diritto e mobilità di risultato	mobilità diretta, mobilità trasversale e mobilità a scavalco	mobilità diretta e mobilità a scavalco
1929	Il Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie è un organismo operativo:	presso il Ministero della salute	presso la Provincia	nessuna delle altre risposte è corretta	presso il Comune
1930	La telemedicina deve rispettare tutti gli obblighi e i diritti propri di qualsiasi altro atto sanitario?	Sì	Solo in caso la telemedicina riguardi casi di Covid 19	Solo in caso la telemedicina riguardi casi di malattie infantili	Solo in caso la telemedicina riguardi casi di infezioni batteriche
1931	_____ va inoltrata l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie.	Al Comune territorialmente competente	Alla Provincia di appartenenza	Alla Regione di appartenenza	Nessuna delle altre risposte è corretta
1932	Secondo la Costituzione italiana, _____ può essere eletto senatore della Repubblica.	ogni cittadino italiano che abbia compiuto quarant'anni di età e goda dei diritti civili e politici	ogni cittadino italiano che abbia compiuto diciotto anni di età e goda dei diritti civili e politici	ogni cittadino italiano che abbia compiuto venticinque anni di età e goda dei diritti civili e politici	ogni cittadino laureato
1933	In Italia, il referendum è uno strumento di esercizio della sovranità popolare; il suo principio è sancito:	nella Costituzione della repubblica italiana	nel codice del processo amministrativo	nel codice di procedura civile	nel codice di procedura penale
1934	Ai sensi del D.lgs. N. 229/1999, il complesso delle funzioni e delle attività dei servizi sanitari regionali e degli enti ed istituzioni di rilievo nazionale è detto:	Servizio sanitario nazionale	Piano attuativo locale	Piano attuativo regionale	Programma delle attività territoriali
1935	Le aziende sanitarie locali (Asl) sono una vera e propria azienda pubblica dotata di autonomia:	organizzativa, patrimoniale e amministrativa	solo organizzativa	organizzativa, disgiuntiva e amministrativa	solo organizzativa e patrimoniale
1936	La croce rossa italiana fu costituita nel:	1864	1912	1964	1890
1937	_____ spetta la risoluzione del contratto con il Direttore generale delle aziende sanitarie in caso di grave disavanzo, di violazione di legge o dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione.	Alla Regione	Al Ministero della salute	Alla Corte dei conti	Al Collegio sindacale
1938	Con la _____ si dettano le disposizioni finalizzate alla tutela della salute dei non fumatori ponendo il divieto di fumo nei locali chiusi.	L. n. 3 del 16 gennaio 2003	L. n. 40 del 19 febbraio 2004	L. n. 43 del 1 febbraio 2006	L. n. 119 del 3 aprile 2001
1939	Per DRG (Diagnosis Related Groups) si intende:	un metodo per tariffare e rilevare le degenze ospedaliere	una metodologia per il controllo dell'efficienza dei piccoli presidi ospedalieri	una metodologia per il controllo dell'efficacia dei piccoli presidi ospedalieri	nessuna delle altre risposte è corretta
1940	Il consenso informato è:	l'adesione che il malato fornisce ai medici curanti riguardo alle proposte diagnostiche che vengono formulate in merito alla sua patologia	nessuna delle altre risposte è corretta	l'adesione che viene firmata dal paziente in vita riguardo all'espianto dei propri organi dopo la morte	l'atto riassuntivo del processo di informazione con il quale vengono forniti i dati relativi alle prestazioni erogate, alle tariffe praticate e alle modalità di accesso ai servizi sanitari di ciascuna Asl
1941	Ai sensi del d.lgs. 229/1999 e s.m.i., le strutture che erogano prestazioni sanitarie a carico del Ssn stipulano con le Regioni competenti:	accordi contrattuali	intese programmatiche	pre-accordi	protocolli operativi
1942	In una Azienda Sanitaria pubblica, il ruolo di Datore di Lavoro è ricoperto dal:	Direttore Generale	Direttore Amministrativo	Direttore Sanitario	Dirigente individuato per adempiere a tutti gli obblighi inerenti la tutela della salute dei lavoratori
1943	Le spese per le visite mediche, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, sono a carico del:	Datore di lavoro	Lavoratore	Medico competente	Coordinatore

1944	Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, dove va conservato il documento contenente la valutazione dei rischi per il lavoro e la sicurezza del lavoratore?	Presso l'abitazione del datore di lavoro	Presso la Regione	Presso l'Azienda Sanitaria Locale	Presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi
1945	Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, indicare quale di questi è un obbligo del datore di lavoro:	Non modificare le protezioni e utilizzarle correttamente	Effettuare la supervisione durante i lavori a rischio	Tenere un registro degli incidenti	Nessuna delle altre risposte è corretta
1946	Secondo il D.Lgs. 81/2008 le uscite di emergenza devono essere:	Evidenziate da un'apposita segnaletica	Aprirsi in maniera automatica	Blindate	Sempre aperte
1947	Nelle prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza contenute nel D.Lgs. 81/2008, ai segnali di avvertimento viene associato il colore:	Giallo	Verde	Azzurro	Rosso
1948	Per "_____" si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.	DPI	DPC	DPP	PIC
1949	Il datore di lavoro, nel caso sia necessario adottare un DPI:	Tutte le altre risposte sono corrette	Verifica le condizioni di igiene dei DPI e assicura il loro mantenimento e la sostituzione eventuale	Individua le caratteristiche necessarie dei DPI e aggiorna la scelta ogni qual volta intervenga una variazione significativa	Istruisce i lavoratori all'uso dei DPI, prevede l'addestramento per quelli di terza categoria e ne controlla il corretto uso
1950	Requisiti dei DPI sono:	Tutte le altre risposte sono corrette	Tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore, poter essere adattati all'utilizzatore	Essere adeguati ai rischi da prevenire e adeguati alle condizioni del luogo di lavoro	Essere adeguati alle condizioni economiche
1951	I DPI di semplice progettazione, destinati a salvaguardare da rischi di danni fisici di lieve entità, sono:	DPI di prima categoria	DPI non classificati	DPI di base	DPI di quarta categoria
1952	"_____" elabora le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali.	Il Servizio prevenzione e protezione dei rischi	Il Responsabile dei lavoratori per la sicurezza	Il Medico competente	Il Direttore sanitario
1953	La scheda di sicurezza di una sostanza o di un preparato impiegato in azienda deve essere portata a conoscenza del lavoratore:	Sempre, ogni qual volta si avvii un processo produttivo che introduce una nuova sostanza o preparato	In nessun caso, se sussistono motivi di riservatezza e di segreto industriale; è comunque obbligo da parte del datore di lavoro attuare le necessarie misure di sicurezza	Solo dopo aver consultato il medico competente	Sempre in caso di incidente nel quale la sostanza o preparato è direttamente coinvolta
1954	Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, articolo 224, il datore di lavoro per ridurre i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici deve:	Ridurre al minimo il numero dei lavoratori che sono esposti	Aumentare il numero dei lavoratori in modo da ridurre le ore di esposizione per ognuno di loro	Mandare in licenza i lavoratori esposti	Nessuna delle altre risposte è corretta
1955	I corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione vengono organizzati:	Dalle Università	Dalle Questure	Dall'ASL	Dalle Aziende ospedaliere
1956	I lavoratori che sono addetti ad attività con alto rischio per la salute devono essere:	Sottoposti a vigilanza sanitaria	Posti in quarantena	Segnalati al Ministero della salute	Segnalati al Ministero del lavoro
1957	Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, in caso di ferimento di un lavoratore:	Bisogna prestare cure immediate al ferito, inclusa la profilassi post-esposizione e gli esami medici necessari e, se de caso, l'assistenza psicologica	Egli va allontanato dal luogo di lavoro	Il datore di lavoro non è tenuto a prestare alcuna assistenza	Nessuna delle altre risposte è corretta
1958	Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è:	La persona designata dal datore di lavoro in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 8-bis	La persona designata dai lavoratori, interna all'azienda, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 8-bis	La persona designata dal datore di lavoro e dal medico competente all'esterno dell'azienda in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 8-bis	Il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38
1959	Il funzionario non avente qualifica dirigenziale può essere considerato datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008:	Se risulta preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale	In nessun caso	Se risulta preposto in base a una specifica determinazione del dirigente	Sempre
1960	Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il medico competente:	Può essere un dipendente del datore di lavoro	Non può mai essere un dipendente del datore di lavoro	E' sempre un dipendente del datore di lavoro	E' il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore
1961	Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, nell'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione il datore di lavoro:	Può avvalersi di persone esterne all'azienda, salva la designazione all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva di una o più persona	Non può avvalersi di persone esterne all'azienda	Deve avvalersi di persone esterne all'azienda	Nessuna delle altre risposte è corretta
1962	Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta:	Dall'Unità Sanitaria Locale	Dalle rappresentanza sindacali aziendali	Dal Ministero della salute di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale	Dal Prefetto

1963	Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il servizio di prevenzione e protezione è:	L'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva	L'insieme dei sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva	Il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno	Nessuna delle altre risposte è corretta
1964	Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il documento contenente la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute durante il lavoro è elaborato dal:	Datore di lavoro e custodito presso l'azienda	Datore di lavoro ed inviato all'Azienda sanitaria locale competente	Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e custodito presso l'azienda	Medico competente
1965	Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, ciascun lavoratore deve:	Prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quelle delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni ed ai messi forniti dal datore di lavoro	Prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quelle delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni ed ai messi forniti dal medico competente	Prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quelle delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni ed ai messi forniti dal rappresentante della sicurezza	Valutare e documentare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui presta la propria attività
1966	Una delle principali differenze tra malattia professionale e infortunio sul lavoro è:	che nell'infortunio l'evento scatenante è improvviso e violento, mentre le cause che provocano la malattia professionale sono lente e diluite nel tempo	che nella malattia professionale la persona ha una sensazione dolorosa senza postumi apprezzabili	nessuna delle altre risposte è corretta	che nella malattia professionale l'evento scatenante è improvviso e violento, mentre le cause che provocano l'infortunio sono lente e diluite nel tempo
1967	Indicare l'affermazione corretta sul piano di assistenza individuale (PAI).	È dinamico, flessibile, modificabile e quindi mai definitivo	Deve essere seguito rigidamente in quanto mai modificabile	È modificabile solo dal redattore originario	È uno strumento sempre definitivo in quanto multidisciplinare
1968	La nomina del Direttore sanitario di un'azienda ospedaliera universitaria compete:	al Direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria	al Presidente del consiglio	al Presidente della provincia	al Presidente della regione
1969	Il cartello giallo di forma triangolare con fiamma nera rappresenta la presenza:	del combustibile, del comburente, di una sorgente di calore	di corrente elettrica, di un conduttore elettrico, di un determinato voltaggio	del combustibile, del comburente, di amuchina	di corrente elettrica, presenza del combustibile
1970	A quale articolo della Costituzione della Repubblica italiana viene sancito il diritto alla retribuzione?	36	32	38	3
1971	Il trattamento economico dei pubblici dipendenti è definito dal:	Contratto collettivo nazionale di lavoro	Ministero della funzione pubblica	Piano sanitario nazionale	Consiglio dei ministri
1972	Dalla definizione di salute formulata dall'OMS si ricavano i seguenti concetti eccetto:	salute come assenza di tutte le forme morbose	salute come bene individuale e collettivo	salute come processo dinamico	salute come globalità fisica, psichica e sociale
1973	In base alla Legge n. 24 del 2017, quando il professionista sanitario non risponde penalmente per colpa lieve durante lo svolgimento della propria attività?	Se si è attenuto a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica	Se ha osservato i regolamenti aziendali e le disposizioni impartite dal proprio responsabile	Mai	Sempre
1974	DPI significa:	Dispositivi di protezione individuale	Dispositivi di protezione indistruttibili	Dispositivi di protezione illimitata	Dispositivi di protezione indefinita
1975	L'operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria trova il principale riferimento regolamentativo:	Nel provvedimento della Conferenza Stato-Regioni del 16 gennaio 2003	Nel provvedimento della Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001	Nella legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale	Nella Legge 8 gennaio 2002, n. 1
1976	Nel linguaggio dell'organizzazione aziendale applicata ai sistemi sanitari, per _____ si intende il confronto tra i risultati finali e gli obiettivi stabiliti	Efficacia	Qualità	Appropriatezza	Efficienza
1977	L'organo di vigilanza per eccellenza in materia di prevenzione nei luoghi di lavoro è ...	L'ASL	La Direzione Provinciale del Lavoro	L'INPS	L'INDAP
1978	L'INAIL assicura il lavoratore contro i danni ...	Fisici ed economici derivanti da infortuni sul lavoro e malattie professionali	Fisici derivanti da infortuni e malattie	Patrimoniali subiti dal lavoratore per un infortunio anche estraneo alla prestazione lavorativa	Nessuna delle altre risposte è corretta
1979	_____ è contenuta la frase " Nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario, se non per disposizione per legge"	Nella Costituzione	Nel codice civile	Nel codice penale	Nel Codice Deontologico
1980	La cartella clinica è conservabile ...	Anche solo in forma digitale , anche dalle strutture private accreditate	Solo dalle strutture private in forma digitale	Solo dalle strutture pubbliche in forma cartacea	Anche solo in forma digitale, ma esclusivamente dalle strutture pubbliche
1981	Le USCA (Unità speciali di continuità assistenziale)sono state istituite ...	Dalle Regione	Dalle Città metropolitane	Dai Comuni	Dalle Province
1982	Una lavoratrice ...	Non può essere licenziata dall'inizio della gravidanza fino a tutto il periodo di interdizione dal lavoro prescritto dalla legge ...	Non può essere licenziata dalla fine della gravidanza fino al completamento dei due anni del bambino	Non può essere mai licenziata	Non può essere licenziata dalla fine della gravidanza fino al completamento dei 14 anni del bambino
1983	Il periodo di tempo giornaliero che, nell'ambito dell'orario di servizio, costituisce la fascia orario di accesso ai servizi da parte dell'utenza viene detto ...	Orario di apertura al pubblico	Orario di lavoro	Orario flessibile	Orario di servizio
1984	L'OSS ha sostituito le figure ...	OTA e ADEST	OSA e ASA	OSA e OSSS	OSSS
1985	La sorveglianza sanitaria in azienda è effettuata ...	Dal medico competente	Dal medico curante	Dal datore di lavoro	Dall'infermiere

1986	Per LEA si intendono ...	Le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che il Servizio Sanitario Nazionale assicura ai cittadini gratuitamente o in compartecipazione	Le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che il SSN assicura ai cittadini solo dietro pagamento	Le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che il SSN assicura ai cittadini gratuitamente	Le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che il SSN non assicura ai cittadini
1987	La norma attuale che regola la sicurezza sul lavoro è ...	Il d.lgs. n. 81/2008	Il d.lgs. n. 626/1994	LA l. n. 46/1990	LA l. n. 241/1990
1988	L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la "salute " come ...	Stato di completo benessere fisico, psichico e sociale	Assenza o mancanza di malattia o infermità	Stato di completo benessere fisico	Stato di autonomia/autosufficienza
1989	La "Carta dei Servizi " può definirsi un documento che ...	Descrive finalità, modi, criteri e strutture mediante cui il servizio viene attuato, diritti e i doveri, modalità e tempi di partecipazione, nonché procedure di controllo che il cittadino ha a disposizione	Descrivere le prestazioni erogate e le modalità di accesso ai servizi	Elenca i diritti e i doveri del cittadino che accede ai servizi	Indica i requisiti per l'accesso ai servizi e le tariffe delle singole prestazioni
1990	Le norme sul " segreto professionale ", inteso quale obbligo di mantenere il segreto su tutto ciò di cui si viene a conoscenza per ragione del proprio lavoro o professione rinvenibile ...	Nerl codice penale	Nelle "carte dei servizi" delle diverse istituzioni	Nei codici deontologici delle diverse professioni	Nella normativa regionale in materia di servizi sociali e sanità
1991	In ambito socio-sanitario con l'acronimo PAI si intende ...	Piano assistenziale individualizzato	Progetto anziani in comunità	Programma anziani istituzionalizzati	Piano anziani in convenzione
1992	I ticket sanitari sono ...	Tasse	Imposte indirette	Contributi	Imposte dirette
1993	La nomina dell'RSPP per la sicurezza sui luoghi di lavoro spetta ...	Al datore di lavoro	Al Dirigente	Al Direttore sanitario	Al Direttore amministrativo
1994	Con l'acronimo TFR si intende ...	Il trattamento di fine rapporto in ambito lavorativo	Il tratto ferroviario ad alta velocità Firenze- Roma	Il trattamento di formazione regolata in ambito lavorativo	La tassazione di fine rapporto in ambito lavorativo
1995	In caso di mancato recupero del ritardo sull'orario di ingresso al lavoro, il CCNL comparto sanità, prevede ...	La proporzionale decurtazione della retribuzione e del trattamento economico accessorio	L'immediato licenziamento	La messa in aspettativa in d'ufficio	Nessuna delle altre risposte è corretta
1996	Le strutture riabilitative per portatori di menomazioni psichiche e sensoriali fanno parte ...	Delle residenze extraospedaliere	Delle residenze assistenziali	Delle residenze sanitarie assistenziali	Delle IPAB
1997	Per OSSS si intende ...	Operatoire socio-sanitario specializzato con formazione complementare	Operatore socio-sanitario semplice	Operatore socio-sanitario superiore	Nessuna delle altre risposte è corretta
1998	Rifiuti sanitari : la classificazione	Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo, rifiuti sanitari non pericolosi, rifiuti sanitari assimilabili ai rifiuti urbani, rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento	Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo, rifiuti sanitari non pericolosi	Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo, rifiuti sanitari non pericolosi, rifiuti che provengono da ambienti con alto rischio di trasmissione	Nessuna delle altre risposte è corretta
1999	_____ sono esposti a rischio biologico	Tutti gli operatori che svolgono procedure assistenziali che comportano contatto con materiale biologico, manipolazione e trattamento di strumenti ed attrezzature	Tutti gli operatori che eseguono attività e movimenti che implicano trasporto e sostegno di un carico animato o inanimato	Tutti gli operatori che eseguono attività di tipo amministrativo	Nessuna delle altre risposte è corretta
2000	In ospedale, i rifiuti quali pasti non provenienti da reparti infettivi, vetro, carta, plastica, metalli, imballaggi, giardinaggio, gessi, sono compresi ...	Nei rifiuti sanitari assimilabili ai rifiuti urbani	Nei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo	Nei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo	Nessuna delle altre risposte è corretta
2001	Nella struttura dedicata alla alla week surgery ...	Non vi è necessità di copertura assistenziale nel fine settimana	I pazienti rimangono in attesa al massimo una settimana	Non vi è copertura assistenziale di notte	Nessuna delle altre risposte è corretta
2002	Da chi è istituito il Fascicolo Sanitario Elettronico?	Dalle regioni e dalle province autonome	Dai Comuni	Dalle ASL/ASP	Dallo Stato
2003	Il Fascicolo Sanitario Elettronico è stato istituito:	Nel 2012	Nel 2005	Nel 2001	Nel 1995
2004	L'orizzonte temporale di riferimento del Fascicolo Sanitario Elettronico è:	L'intera vita di un cittadino	Gli ultimi anni di vita di un cittadino	I primi due anni di vita di un cittadino	I primi dieci anni di vita di un cittadino
2005	Il servizio di telemedicina può essere rivolto:	Ai detenuti	A coloro i quali sono ricoverati in strutture private	A coloro i quali abitano vicino ad una struttura ospedaliera	A coloro i quali sono ricoverati in strutture pubbliche
2006	Con il termine "firma digitale" si indica:	Un dispositivo informatico per rendere sicuri i documenti elettronici	La scansione della firma degli utenti che accedono a servizi di crittografia	La firma che garantisce l'autenticità di un software	Nessuna della altre risposte è corretta
2007	La firma digitale è:	L'equivalente informatico di una tradizionale firma uatografa apposta su carta	Una firma apposta su un documento cartaceo che è stato successivamente scansionato	Un sistema di pagamento online	Un sistema di pagamento contact-less
2008	Per Agenda Digitale Italiana si intende:	L'insieme di azioni e norme per lo sviluppo delle tecnologie, dell'innovazione e dell'economia degitale	Un portale da cui il cittadino può richiedere ed ottenere documenti senza recarsi presso i Pubblici uffici	Un protocollo internazionale per la standardizzazione dei formati di trasmissione dati tra pubbliche amministrazioni	Nessuna della altre risposte è corretta
2009	Per Sanità Digitale si intende:	L'uso delle tecnologie informatiche e della comunicazione a vantaggio della salute umana	La trasmissione telematica dei referti e la telemedicina	La completa dematerializzazione delle ricette mediche e dei referti	La digitalizzazione dei processi amministrativi in sanità

2010	Il Fascicolo Sanitario Elettronico:	Non può essere attivato senza il consenso esplicito dell'assistito	Può essere attivato d'ufficio, anche senza l'assenso dell'assistito, ma non può essere visto da altri senza autorizzazione	E' un obbligo per il cittadino assistito e per il Sistema Sanitario Nazionale ed è indipendente dalle decisioni dell'uno o dell'altro	Deve essere attivato dai diversi Sistemi Sanitari Regionali, ma solo dopo la completa digitalizzazione delle cartelle cliniche
2011	La strategia per la crescita digitale 2014-2020 approvata dal Governo prevede per la Sanità Digitale:	Il Fascicolo Sanitario Elettronico, la dematerializzazione delle ricette e le prenotazioni online	Il Fascicolo Sanitario Elettronico, la telemedicina e la dematerializzazione delle ricette	La dematerializzazione delle ricette, le prenotazioni online e l'uso del sito internet per le comunicazioni tra aziende e cittadini	Le prenotazioni online, il Fascicolo Sanitario Elettronico e l'invio dei referti attraverso la posta elettronica certificata
2012	La trasformazione delle ricette cartacee in prescrizioni elettroniche permette specialmente:	Un miglior controllo dell'appropriatezza delle prescrizioni	Il risparmio di carta	Il monitoraggio della spesa	Nessuna delle altre risposte è corretta
2013	Il CUP, Centro Unificato di Prenotazione:	E' il sistema centralizzato informatizzato di prenotazione delle prestazioni sanitarie, deputato a gestire l'intera offerta	E' il sistema di revisione dei costi delle visite specialistiche	E' il numero di telefono per accedere all'azienda sanitaria di appartenenza	E' il servizio nazionale che permette la prenotazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie su tutto il territorio nazionale
2014	Per "Connected Care" si intende:	La presa in carico globale del paziente, realizzata grazie alla condivisione di informazioni, dati clinici e strategie tra tutti i soggetti coinvolti	La realizzazione di una connessione telematica costante tra l'ospedale e le case dei pazienti cronici dimessi	La gestione integrata e connessa del sistema informativo di un'azienda sanitaria o di un ospedale	Il collegamento via internet di tutte le strutture territoriali di un'azienda sanitaria locale
2015	La telemedicina è:	Una modalità di erogazione di servizi di assistenza sanitaria, tramite il ricorso a tecnologie innovative, in situazioni in cui il professionista della salute e il paziente (o due professionisti) non si trovano nella stessa località	La diffusione di pubblicità progresso su temi di sensibilizzazione sanitaria pubblica	Una nuova tecnica medica di cura per telepatia	La diffusione di trasmissioni televisive che trattano temi della medicina
2016	La telemedicina si adopera quando:	I servizi di assistenza sanitaria vengono erogati attraverso ICT in situazioni in cui il professionista della salute e il paziente non si trovano nella stessa località	In una situazione di emergenza-urgenza gli operatori sanitari accedono al Fascicolo Sanitario Elettronico del paziente	I servizi di assistenza sanitaria vengono erogati inizialmente al telefono durante l'arrivo degli operatori sanitari sul posto	La spesa sanitaria viene contenuta grazie alla digitalizzazione delle ricette e le prenotazioni dei servizi online
2017	La telemedicina opera con l'obiettivo di attuare una "prevenzione secondaria" che è:	L'insieme dei servizi dedicati alle categorie di persone già classificate a rischio o persone già affette da patologie che devono sottoporsi a un costante monitoraggio	L'insieme degli esami clinici da svolgere periodicamente per prevenire le patologie più diffuse	L'insieme dei servizi di monitoraggio dedicati alle persone disabili e deboli (come anziani e bambini) per evitare che incorrano nell'acuzie delle loro patologie	L'insieme dei centri sul territorio dove è possibile recarsi per patologie meno gravi anziché recarsi nelle aziende ospedaliere
2018	In caso di errore nell'immissione di un dato in una cartella clinica elettronica:	E' possibile aggiungere una nota di modifica del dato errato, che comunque rimane memorizzato	E' possibile cancellare e reinserire il dato	Non è possibile operare correzioni	E' possibile cancellare e reinserire il dato se si accede con una password da amministratore di sistema
2019	Ai sensi dell'articolo 3-bis del Codice dell'amministrazione digitale, al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini è:	Facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, quale suo domicilio digitale	Dovere di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione ogni variazione e cancellazione del proprio indirizzo di posta elettronica	Dovere di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, quale suo domicilio digitale	Dovere di ogni cittadino possedere un proprio indirizzo di posta elettronica, da comunicare entro 60 giorni all'ANPR
2020	Secondo l'articolo 1 del Codice dell'amministrazione digitale, per carta d'identità elettronica si intende:	Il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare	Il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni	Il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi	La rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, destinati alla registrazione e segnatura del protocollo
2021	Il "documento digitale unificato" è:	L'unificazione su un unico supporto della tessera sanitaria e della carta d'identità elettronica	L'unificazione su un unico supporto della tessera sanitaria e della patente	L'unificazione su un unico supporto della tessera sanitaria e del ticket	Nessuna delle altre risposte è corretta
2022	Il Fascicolo Sanitario Elettronico è:	La raccolta online di dati e informazioni sanitarie che costituiscono la storia clinica e di salute di una persona	La lista dei farmaci che possono essere somministrati ad un paziente	La raccolta delle norme igieniche a cui sono tenuti gli operatori socio-sanitari	La raccolta delle norme igieniche a cui sono tenuti i fisioterapisti durante le proprie attività
2023	La ricevuta di accettazione della PEC è generata dopo che il punto di:	Accesso ha raccolto il messaggio	Accoglienza ha raccolto il messaggio	Smistamento ha raccolto il messaggio	Controllo ha ricevuto o messaggio
2024	Nella PEC, tutte le comunicazioni risultano:	Firmate digitalmente e crittografate dal gestore del dominio certificato	Firmate digitalmente da un conservatore accreditato	Firmate digitalmente e crittografate dal mittente	Crittografate e archiviate presso un conservatore accreditato
2025	Il contenuto di un messaggio inviato per PEC:	Diviene certo e non modificabile	Diventa autentico e non ripudiabile	Diventa autentico e certo, grazie al riferimento temporale associato	Diviene certo, autentico e non ripudiabile
2026	La cartella clinica rappresenta ...	Il curriculum del malato in quel ricovero	La diagnosi definitiva e prognosi	Il documento dove riportare generalità del paziente e dei suoi familiari e anamnesi delle malattie pregresse	L'assicurazione del malato contro eventuali incidenti ed infortuni
2027	Le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private hanno l'obbligo di trasparenza?	Si, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196	No, non c'è nessuna norma in materia	Si, ma non vige nessun obbligo, è facoltativo delle strutture	Si, è facoltativo delle strutture private
2028	Rispetto al segreto professionale, un medico può collaborare alla costituzione di banche di dati sanitari o pubblicazioni scientifiche di dati clinici?	Si, purchè sia assicurata la non identificabilità delle persone ed esistano garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita privata delle stesse	No, in nessun caso	Solo se la persona portata come caso clinico è deceduta	Solo, se la direzione generale dell'azienda in cui lavora il medico è d'accordo

2029	L'articolo 622 del codice penale sancisce ...	L'obbligo del segreto professionale	L'obbligo del referto	L'obbligo di redigere la cartella infermieristica	L'abuso di professione
2030	Indicare tra i seguenti casi quale configura una violazione del segreto professionale	Il rivelare notizie sanitarie ad un congiunto del paziente senza il consenso di quest'ultimo	Il rivelare notizie sanitarie al genitore di un paziente minore	Il rivelare notizie sanitarie al tutore del paziente interdetto	Nessuna delle altre risposte è corretta
2031	La legislazione prevede delle giuste cause che possono giustificare la divulgazione di informazioni coperte da segreto professionale?	Si, come ad esempio nelle consulenze	Solo se il paziente è deceduto	Solo se il paziente ha fratelli	No, in nessun caso
2032	L'articolo 72 del Codice di protezione dei dati sancisce che ...	Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili	I dati giudiziari possono essere diffusi	Il trattamento di dati giudiziari da parte di enti pubblici economici è tassativamente vietato; nessuna disposizione di legge o autorizzazione del Garante possono derogare al divieto	Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati è tassativamente vietato; nessuna disposizione di legge o autorizzazione del Garante possono derogare al divieto
2033	Per "dato sensibile" si intende un dato ...	Idoneo a rivelare, tra gli altri, lo stato di salute, la vita sessuale, le convinzioni politiche	Nessuna delle altre risposte è corretta	Che rivela il codice fiscale di una persona	Che consente di stabilire l'identità di una persona
2034	Il responsabile della protezione dei dati è designato ...	In funzione delle qualità professionali, della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati	Previa verifica del titolo di studio di laurea in scienze informatiche	Previa verifica dell'acquisizione di un master in protezione dei dati	Nessuna delle altre risposte è corretta
2035	Il Garante per la protezione dei dati personali ...	Ha il compito di controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile, anche in caso di loro cessazione e con riferimento alla conservazione dei dati di traffico	Ha solo il compito di controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e in conformità alla notificazione	E' un organo rappresentativo che ha esclusivamente il compito di predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione del codice	E' un organo monocratico nominato dalla Presidenza della Repubblica
2036	Per "interessato" si intende ...	La persona fisica cui si riferiscono i dati personali	L'organo di controllo sulla privacy	L'organo di polizia postale	La persona fisica che ha interesse ad accedere ai dati
2037	Per "accountability" si intende ...	La responsabilizzazione del titolare dei dati in merito al trattamento degli stessi	La misurabilità dei dati effettivamente coinvolti nel processo di trattamento	La pianificazione dei rischi che potrebbe comportare uno specifico trattamento dei dati	La creazione di account telematici per la protezione dei dati personali durante un trattamento
2038	Il Garante è l'organo ...	Che collabora con le altre autorità di controllo e presta assistenza reciproca al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione coerente del regolamento	Che ha il compito di approvare la nomina dei titolari del trattamento dei dati	Che sostituisce il DPO nel caso non sia stato nominato	Che ha redatto il GDPR
2039	Per consenso informato si intende ...	Una manifestazione libera e consapevole del paziente maggiorenne e capace di intendere e di volere rispetto alle cure ed all'assistenza sanitaria	Un diritto del paziente maggiorenne capace di intendere e di volere che deve essere tutelato da ogni professionista sanitario	Un dovere dell'operatore sanitario prima di un intervento sul paziente maggiorenne e capace di intendere e di volere	Un diritto del paziente maggiorenne e capace di intendere e di volere che deve essere tutelato dal medico
2040	L'obbligo di non rivelare il segreto professionale è ...	Giuridico e deontologico	Solo giuridico	Giuridico e professionale	Solo deontologico
2041	Se i dati personali sono raccolti direttamente presso l'interessato, l'informativa deve essere data ...	Contestualmente alla raccolta	Entro 30 giorni dalla raccolta	In forma telematica entro un tempo ragionevole	Esclusivamente in forma scritta
2042	Secondo la normativa in materia di privacy per "dati personali" si intende qualunque ...	Informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente	Informazione relativa a persona fisica o persona giuridica	Dato idoneo a rilevare l'origine razziale, etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, le adesioni a partiti, sindacati, associazioni e i dati sullo stato della salute o la vita sessuale	Informativa relativa a ente o associazione
2043	Quando l'interesse _____ si verifica una situazione di conflitto di interessi	Privato del dipendente contrasta, anche potenzialmente, con l'interesse, non solo economico, dell'azienda	Privato del dipendente contrasta con l'interesse economico dell'azienda	Economico del dipendente e/o di un suo familiare contrasta con l'interesse economico dell'azienda	Nessuna delle altre risposte è corretta
2044	Per "dati sensibili" si intendono ...	I dati inerenti ai valori più intimi della persona umana idonei a rivelare l'origine razziale, etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, le adesioni ai partiti, sindacati, associazioni e i dati sullo stato di salute o la vita sessuale	Solo i dati inerenti allo stato di salute	I dati inerenti alla vita sessuale	Le credenziali per l'accesso alla propria mail aziendale
2045	I "dati identificativi" sono ...	I dati che permettono l'identificazione diretta all'interessato	I dati che riguardano le opinioni politiche e le adesioni ai sindacati	Qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile	I dati che riguardano la vita sessuale
2046	"Il titolare dei dati" è ...	La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali	La persona fisica o giuridica a cui si riferiscono i dati trattati	La persona fisica, giuridica, ente o associazione incaricata di trattare i dati e compiere tutte le operazioni	Nessuna delle altre risposte è corretta
2047	Il titolare del trattamento dei dati in un'azienda sanitaria è il ...	Direttore generale	Dirigente responsabile della privacy	Direttore amministrativo	Funzionario incaricato della custodia dei dati sensibili

2048	A norma di quanto dispone l'articolo 152 del Codice di protezione dei dati personali _____ è deputata/o conoscere tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del Codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione	L'autorità giudiziaria ordinaria	Solo la Corte di Cassazione	Solo il TAR del Lazio	Solo il Consiglio di Stato
2049	_____ rappresentano l'articolazione territoriale del Servizio sanitario regionale.	Le Aziende sanitarie	Le Unità di sviluppo	I Collegi di residenza	I Comitati paritetici
2050	Le Aziende sanitarie rappresentano _____ del Servizio sanitario regionale.	l'articolazione territoriale	l'articolazione etica	l'articolazione ad anello	un modello ormai non più in uso
2051	L'assetto organizzativo e le modalità di funzionamento delle Aziende sanitarie sono definite _____, così come prevede l'atto aziendale.	con atto del Direttore generale	con atto di natura penale	con atto del Collegio di revisione	con atto del Tar localmente responsabile